Ozn.mesta		gazdi-	površ-	OPIS	Osnovni taksacioni elementi						visi	deb.	Broj stabla po hektaru							G	Zapremina po		
ode-	od-	nska	ina		vrsta	sme	obr	sta-	sred.stablo		nski			Vrsta drveta						po		Vrsta drv	
ljenje	sek	klasa	ha		drveća	sa	ast	rost	Ds	Hs	step.	st.	1	2	3	4	5	6	svg.	ha	1	2	3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
				Šuma - nalazi se na strani i na srednje strmom terenu (nagiba od 6° do	1. SrLip	0,6		71	21	17,0	8	7,5	155	13		7		7	181	0,8	4,3	0,3	
				10°) - nagib ujednacen. Nadmorska visina 330 do 370m. Ekspozicija 1	2. Klen	0,2			29	19,2	10	12,5	7			13			20	0,2	0,5		
				zapadna. Mrtvi pokrivac srednje zastupljen - povoljan proces	3. Kit	0,2			38	20,8	10	17,5	23	7		13			43	1,0	3,5	1,6	
				humifikacije. Srednje gusta prizemna vegetacija. Srednje gusto žbunje.	4. Bag				17	15,5	16	22,5			7	7			13	0,5			1,7
				Srednja zakorovljenost. tip šume kitnjaka (Quercetum montanum	5. Jav				28	18,9	10	27,5	39	7		7	7		59	3,5	23,0	3,0	
				cariecetosum pilosae) na gajnjaci do lesiviranoj gajnjaci..	6. Tre				8	9,2	13	32,5	56		7				63	5,2	44,1		4,7
												37,5		7	7				13	1,5		7,9	7,3
				Izdanacka mešovita šuma lipa (izdanacka šuma lipa i kitnjaka) -								42,5	23	23					46	6,5	33,5	30,2	
				jednodobna (u optimalnoj fazi). Ocuvana sastojina. Mešovita sastojina								47,5	16		16				33	5,8	27,2		36,0
				(smeša stablimicna) gustog sklopa (0.8 - 0.9). u celini zdravstveno								57,5	7						7	1,7	17,5		
				stanje sastojine je dobro. po kvalitetu malo vredna sastojina (ima do 20%								UKUP.	326	56	36	46	7	7	477	26,8	153,7	43,0	49,7
				tehnickog drveta). Srednja ugroženost od insekata. Srednja ugroženost od																			
				fitopatoloških oboljenja-oboljenja lista. srednje negovana sastojina.																			
				Stabla srebrna lipa su zakrivljena i sa srednjim padom precnika (srednja																			
				punodrvnost), sa srednje dugim krošnjama (dužine izmedu 1/3 i 1/2 visine																			
				stabala) i ekscentricnim krošnjama, zdravstveno stanje stabala ove vrste																			
				drveca je dobro. Stabla kitnjaka su zakrivljena i sa srednjim padom																			
				precnika (srednja punodrvnost), sa srednje dugim krošnjama (dužine izmedu																			
				1/3 i 1/2 visine stabala) i normalno razvijenim krošnjama, do 10%																			
				oštecenih stabala od insekata i fitopatoloških obolenja, suvih i																			
				suhovrhih stabala ima do 10%, zdravstveno stanje stabala ove vrste																			
1	a	59288484	1,40	drveca je dobro.																			
				Šuma - nalazi se na strani i na srednje strmom terenu (nagiba od 6° do	1. SrLip	0,5		70	20	14,1	7	7,5	87		57	30		24	198	0,9	2,4		1,6
				10°) - nagib ujednacen. Nadmorska visina 300 do 335m. Ekspozicija 1	2. Kit	0,3			29	19,3	9	12,5	57		30			4	91	1,1	4,8		2,8
				zapadna. Mrtvi pokrivac srednje zastupljen - povoljan proces	3. Gr	0,1			14	9,9	9	17,5	24	4	14	10	10	4	65	1,6	4,8	0,9	3,0
				humifikacije. Retka prizemna vegetacija. Srednje gusto žbunje. Nema	4. Klen	0,1			19	13,7	9	22,5	38	14	4	10			65	2,6	13,4	5,3	1,1
				zakorovljenosti. tip šuma kitnjaka i graba sa lazarkinjom (Querco -	5. OTL				22	15,3	9	27,5	24	71	10				105	6,2	13,7	38,9	6,6
				Carpinetum asperulosum) na gajnjaci do lesiviranoj gajnjaci i lesiviranom	6. Cjas				9	6,3	9	32,5	24	24	10		4		61	5,1	18,0	21,9	7,1
				smedem zemljištu na serpentinitu ..								37,5	14	12					26	2,8	14,9	14,1	
												47,5		4					4	0,7		7,8	
				Izdanacka mešovita šuma lipa (izdanacka šuma lipa i kitnjaka) -								52,5				10			10	2,1			
				jednodobna (u optimalnoj fazi). Ocuvana sastojina. Mešovita sastojina								87,5	10						10	5,9	68,0		
				(smeša stablimicna) gustog sklopa (0.8 - 0.9). u celini zdravstveno								UKUP.	276	129	125	59	14	32	634	29,0	139,8	88,9	22,1
				stanje sastojine je dobro. po kvalitetu malo vredna sastojina (ima do 20%																			
				tehnickog drveta). Srednja ugroženost od insekata. Srednja ugroženost od																			
				fitopatoloških oboljenja-oboljenja lista. srednje negovana sastojina.																			
				Stabla srebrna lipa su zakrivljena i sa srednjim padom precnika (srednja																			
				punodrvnost), sa srednje dugim krošnjama (dužine izmedu 1/3 i 1/2 visine																			
				stabala) i ekscentricnim krošnjama, zdravstveno stanje stabala ove vrste																			
				drveca je dobro. Stabla kitnjaka su zakrivljena i sa srednjim padom																			
				precnika (srednja punodrvnost), sa srednje dugim krošnjama (dužine izmedu																			
				1/3 i 1/2 visine stabala) i normalno razvijenim krošnjama, do 10%																			
				oštecenih stabala od insekata i fitopatoloških obolenja, suvih i																			
				suhovrhih stabala ima do 10%, zdravstveno stanje stabala ove vrste																			
1	b	59288261	5,40	drveca je dobro.																			
				Šuma - nalazi se na strani i na vrlo strmom terenu(nagiba od 16° do	1. Kit			7																
				20°) - nagib ujednacen. Nadmorska visina 275 do 310m. Ekspozicija 1																			
				zapadna. Mrtvi pokrivac srednje zastupljen - povoljan proces																			

ОПИС СТАНИШТА И САСТОЈИНА

Ozn.mesta		gazdi-	površ-	OPIS	Osnovni taksacioni elementi						visi	deb.	Broj stabala po hektaru							G	Zapremina po		
ode-	od-	nska	ina		vrsta	sme	obr	sta-	sred.stablo		nski			Vrsta drveta						po		Vrsta drv	
ljenje	sek	klasa	ha		drveća	sa	ast	rost	Ds	Hs	step.	st.	1	2	3	4	5	6	svg.	ha	1	2	3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
				humifikacije. Srednje gusta prizemna vegetacija. Srednje gusto žbunje.																			
				Srednja zakorovljenost. tip šume lužnjaka, graba i cera sa lipama u																			
				dolinama vecih nadmorskih visina (Tilio-Carpino-Quercetum robori-cerris																			
				collinum) na delivijumu..																			
				Izdanacka mešovita šuma kitnjaka - jednodobna (u fazi razgradnje).																			
				Razredjena sastojina. Mešovita sastojina (smeša stablimicna) nepotpunog																			
				sklopa (0.5-0.6). u celini zdravstveno stanje sastojine je osrednje. po																			
				kvalitetu malo vredna sastojina (ima do 20% tehnickog drveta). Srednja																			
				ugroženost od insekata. Srednja ugroženost od fitopatoloških																			
1	c	59307144	2,95	oboljenja-oboljenja lista. pogrešno negovana sastojina.																			

Ozn.mesta		gazdi-	površ-	OPIS	Osnovni taksacioni elementi						visi	deb.	Broj stabala po hektaru							G	Zapremina po		
					vrsta	sme	obr	sta-	sred.stablo		nski		Vrsta drveta							po	Vrsta drv		
ode-ljenje	od-sek	nska klasa	ina ha		drveća	sa	ast	rost	Ds	Hs	step.	st.	1	2	3	4	5	6	svg.	ha	1	2	3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
				Šuma - nalazi se na strani i na strmom terenu (nagiba od 11° do 15°) -	1. Kit	0,4		91	39	20,2	11	7,5		71			13	36	120	0,5		1,2	
				nagib ujednacen. Nadmorska visina 275 do 300m. Ekspozicija 1 istok -	2. SrLip	0,4			23	15,6	10	12,5		20			23	16	59	0,7		1,6	
				severoistok. Mrtvi pokrivac srednje zastupljen - povoljan proces	3. Tre	0,1			45	20,2	14	17,5	7	20		16	7		49	1,2	1,2	2,7	
				humifikacije. Retka prizemna vegetacija. Srednje gusto žbunje. Srednja	4. Cjas	0,1			23	15,9	11	22,5	7	13		16			36	1,4	1,6	4,0	
				zakorovljenost. tip šume kitnjaka (Quercetum montanum cariecetosum	5. OTL				12	10,9	11	27,5	13	39		16			68	4,1	7,1	16,0	
				pilosae) na gajnjaci do lesiviranoj gajnjaci..	6. Jel				9	8,9	15	32,5	7						7	0,5	5,6		
												37,5	13	7	7				26	2,9	14,3	6,7	6,8
				Izdanacka mešovita šuma kitnjaka (izdanacka šuma kitnjaka i lipe) -								42,5		33					33	4,6		42,4	
				jednodobna (u fazi razgradnje). Razredjena sastojina. Mešovita sastojina								47,5	26		16				42	7,5	52,8		31,7
				(smeša stablimicna) nepotpunog sklopa (0.5-0.6). u celini zdravstveno								52,5	19	16					36	7,7	50,6	34,2	
				stanje sastojine je osrednje. po kvalitetu malo vredna sastojina (ima do								UKUP.	91	218	23	49	42	52	475	31,1	133,2	108,8	38,5
				20% tehnickog drveta). Srednja ugroženost od insekata. Srednja ugroženost																			
				od fitopatoloških oboljenja-oboljenja lista. pogrešno negovana sastojina.																			
				Stabla srebrna lipa su zakrivljena i sa srednjim padom precnika (srednja																			
				punodrvnost), sa srednje dugim krošnjama (dužine izmedu 1/3 i 1/2 visine																			
				stabala) i ekscentricnim krošnjama, zdravstveno stanje stabala ove vrste																			
				drveca je dobro. Stabla kitnjaka su zakrivljena i sa srednjim padom																			
				precnika (srednja punodrvnost), sa srednje dugim krošnjama (dužine izmedu																			
				1/3 i 1/2 visine stabala) i normalno razvijenim krošnjama, od 11-25%																			
				oštecenih stabala od insekata i fitopatoloških obolenja, suvih i																			
				sihovrhih stabala ima od 11-25%, zdravstveno stanje stabala ove vrste																			
1	d	59307484	0,87	drveca je osrednje.																			
				Šuma - nalazi se na strani i na strmom terenu (nagiba od 11° do 15°) -	1. Kit	0,6		101	60	22,5	2	12,5		49	39				88	1,1		4,0	2,4
				nagib ujednacen. Nadmorska visina 285 do 305m. Ekspozicija 1 severna.	2. Jel	0,2			22	15,8	14	17,5		69				7	75	1,8		14,8	
				Mrtvi pokrivac obilno zastupljen (tanak sloj) - povoljan proces	3. SrLip	0,1			22	15,9	10	22,5		72	16				88	3,5		23,0	5,8
				humifikacije. Retka prizemna vegetacija. Srednje gusto žbunje. Nema	4. Cer				58	22,3	18	27,5		43	16				59	3,5		24,6	7,0
				zakorovljenosti. tip šume lužnjaka, graba i cera sa lipama u dolinama	5. Smr				53	21,8	18	32,5		7				7	13	1,1		6,2	
				vecih nadmorskih visina (Tilio-Carpino-Quercetum robori-cerris collinum)	6. Cjas				25	16,8	11	37,5		13					13	1,4		15,4	
				na delivijumu..								42,5	7						7	0,9	8,3		
												47,5	20	7					26	4,6	36,7	13,2	
				Visoka šuma kitnjaka - jednodobna (dozrevajuca) sastojina. Razredjena								52,5					7		7	1,4			
				sastojina. Mešovita sastojina (smeša stablimicna) nepotpunog sklopa								57,5				7			7	1,7			
				(0.5-0.6). u celini zdravstveno stanje sastojine je osrednje. po								62,5	16						16	5,0	50,1		
				kvalitetu malo vredna sastojina (ima do 20% tehnickog drveta). Srednja								67,5	20		7				26	9,3	72,8		24,2
				ugroženost od insekata. Srednja ugroženost od fitopatoloških								72,5	16						16	6,8	74,7		
				oboljenja-oboljenja lista. pogrešno negovana sastojina. Stabla kitnjaka								UKUP.	78	258	78	7	7	13	440	42,1	242,5	101,2	39,3
				su zakrivljena i sa srednjim padom precnika (srednja punodrvnost), sa																			
				srednje dugim krošnjama (dužine izmedu 1/3 i 1/2 visine stabala) i																			
				normalno razvijenim krošnjama, od 11-25% oštecenih stabala od insekata i																			
				fitopatoloških obolenja, suvih i sihovrhih stabala ima od 11-25%,																			
				zdravstveno stanje stabala ove vrste drveca je osrednje. Stabla jele su																			
				prava i sa velikim padom precnika (mala punodrvnost), sa srednje dugim																			
				krošnjama (dužine izmedu 1/3 i 1/2 visine stabala) i normalno razvijenim																			
				krošnjama, od 11-25% oštecenih stabala od insekata i fitopatoloških																			
				obolenja, suvih i sihovrhih stabala ima od 11-25%, zdravstveno stanje																			
1	e	59301144	0,68	stabala ove vrste drveca je osrednje.																			
				Šuma - nalazi se na strani i na srednje strmom terenu (nagiba od 6° do	1. CB	0,6		105	44	20,3	14	12,5		73	4	13	2	2	95	1,2		5,9	0,4
				10°) - nagib ujednacen. Nadmorska visina 300 do 339m. Ekspozicija 1	2. SrLip	0,3			21	15,6	8	17,5		53	7	10			69	1,7		10,0	1,1

ОПИС СТАНИШТА И САСТОЈИНА

Ozn.mesta		gazdi-	površ-	OPIS	Osnovni taksacioni elementi						visi	deb.	Broj stabala po hektaru							G	Zapremina po		
ode-	od-	nska	ina		vrsta	sme	obr	sta-	sred.stablo		nski			Vrsta drveta						po		Vrsta drv	
ljenje	sek	klasa	ha		drveća	sa	ast	rost	Ds	Hs	step.	st.	1	2	3	4	5	6	svg.	ha	1	2	3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
				zapad - jugozapad. Mrtvi pokrivac obilno zastupljen (tanak sloj) -	3. Kit	0,1			29	18,0	2	22,5		65					65	2,6		19,5	
				povoljan proces humifikacije. Srednje gusta prizemna vegetacija. Srednje	4. Tre				21	15,8	6	27,5		42	2	4			48	2,9		21,5	1,0
				gusto žbunje. Jaka zakorovljenost. tip šume kitnjaka (Quercetum montanum	5. Cjas				13	11,9	11	32,5	7	24					31	2,6	5,1	18,0	
				cariecetosum pilosae) na gajnjaci do lesiviranoj gajnjaci..	6. Klen				13	11,9	11	37,5	22						22	2,4	23,6		
												42,5	37	2	2	6			47	6,7	53,8	2,8	3,0
				Veštacki podignuta mešovita sastojina crnog bora - dvospratna								47,5	28						28	4,9	52,7		
				(dozrevajuca) sastojina. Razredjena sastojina. Mešovita sastojina (smeša								52,5	7						7	1,4	15,1		
				stablimicna) nepotpunog sklopa (0.5-0.6). u celini zdravstveno stanje								57,5	2		4				7	1,7	6,4		12,3
				sastojine je osrednje. po kvalitetu srednjevredna sastojina (ima od								62,5	2						2	0,7	8,2		
				21-40% tehnickog drveta). Srednja ugroženost od insekata. Srednja								UKUP.	105	259	20	33	2	2	420	28,7	164,8	77,7	17,8
				ugroženost od požara. pogrešno negovana sastojina. Stabla srebrna lipa																			
				su zakrivljena i sa srednjim padom precnika (srednja punodrvnost), sa																			
				srednje dugim krošnjama (dužine izmedu 1/3 i 1/2 visine stabala) i																			
				ekscentricnim krošnjama, zdravstveno stanje stabala ove vrste drveca je																			
				osrednje. Stabla crni bor su prava i sa velikim padom precnika (mala																			
				punodrvnost), sa dugim krošnjama (dužine izmedu 1/2 i 2/3 visine stabala)																			
				i preširokim krošnjama, od 11-25% oštecenih stabala od insekata, suvih i																			
				sihovrhih stabala ima od 11-25%, zdravstveno stanje stabala ove vrste																			
1	f	59476484	8,11	drveca je osrednje.																			

ОПИС СТАНИШТА И САСТОЈИНА

Ozn.mesta		gazdi-	površ-	OPIS	Osnovni taksacioni elementi						visi	deb.	Broj stabala po hektaru							G	Zapremina po		
ode-	od-	nska	ina		vrsta	sme	obr	sta-	sred.stablo		nski			Vrsta drveta						po		Vrsta drv	
ljenje	sek	klasa	ha		drveća	sa	ast	rost	Ds	Hs	step.	st.	1	2	3	4	5	6	svg.	ha	1	2	3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
				Šuma - nalazi se na strani i na blago nagnutom terenu (nagiba do 5°) -	1. Bag	0,8		44	24	17,8	15	7,5	25	210	12				247	1,1	0,4	5,3	0,4
				nagib ujednacen. Nadmorska visina 315 do 335m. Ekspozicija 1 zapadna.	2. Klen	0,2			12	10,6	9	12,5	50	161	12				223	2,7	5,2	15,8	0,7
				Mrtvi pokrivac srednje zastupljen - povoljan proces humifikacije. Retka	3. PBr				12	11,1	8	17,5	62	124	12	12			211	5,1	9,6	22,3	1,7
				prizemna vegetacija. Srednje gusto žbunje. Nema zakorovljenosti. tip šume	4. SrLip				18	14,6	6	22,5	149	12					161	6,4	54,3	4,9	
				kitnjaka (Quercetum montanum cariecetosum pilosae) na gajnjaci do								27,5	112						112	6,6	65,1		
				lesiviranoj gajnjaci..								32,5	49						49	4,1	45,2		
												37,5	50						50	5,5	61,9		
				Izdanacka mešovita šuma bagrema - jednodobna (u fazi razgradnje). Ocuvana								UKUP.	496	508	37	12			1053	31,5	241,9	48,3	2,8
				sastojina. Mešovita sastojina (smeša stablimicna) vrlo gustog sklopa																			
				(1.0). u celini zdravstveno stanje sastojine je dobro. po kvalitetu																			
				sastojina bez vrednosti (bez ucešca tehnickog drveta). Srednja ugroženost																			
				od insekata. Srednja ugroženost od drugih štetnih uticaja. srednje																			
				negovana sastojina. Stabla srebrna lipa su zakrivljena i sa srednjim																			
				padom precnika (srednja punodrvnost), sa kratkim krošnjama (dužine izmedu																			
				1/4 i1/3 visine stabala) i uskim krošnjama, zdravstveno stanje stabala																			
				ove vrste drveca je dobro. Stabla bagrema su zakrivljena i sa srednjim																			
				padom precnika (srednja punodrvnost), sa kratkim krošnjama (dužine izmedu																			
				1/4 i1/3 visine stabala) i uskim krošnjama, zdravstveno stanje stabala																			
1	g	59326484	1,85	ove vrste drveca je dobro.																			
				Šuma - nalazi se na strani i na blago nagnutom terenu (nagiba do 5°) -	1. Bag	0,3		20	9	9,2	17	7,5	850		129	99	130	65	1273	5,6	16,4		3,3
				nagib ujednacen. Nadmorska visina 285 do 320m. Ekspozicija 1 istok -	2. Kop	0,3			30	15,6	10	12,5	427		65	130	32		654	8,0	28,1		4,3
				jugoistok. Mrtvi pokrivac srednje zastupljen - povoljan proces	3. Cjas	0,2			12	10,7	12	17,5	33		97		32		162	3,9	4,1		16,7
				humifikacije. Nema prizemne vegetacije. Srednje gusto žbunje. Nema	4. OTL	0,2			12	10,6	12	22,5				33			33	1,3			
				zakorovljenosti. tip šume kitnjaka (Quercetum montanum cariecetosum	5. PBr	0,1			10	9,6	12	27,5		33					33	2,0		16,7	
				pilosae) na gajnjaci do lesiviranoj gajnjaci..	6. Tre				8	7,8	15	32,5		33					33	2,7		22,8	
												UKUP.	1310	66	291	262	195	65	2189	23,6	48,6	39,5	24,3
				Izdanacka mešovita šuma bagrema - jednodobna (u fazi izgradnje). Ocuvana																			
				sastojina. Mešovita sastojina (smeša i grupimicna i stablimicna) vrlo																			
				gustog sklopa (1.0). u celini zdravstveno stanje sastojine je dobro. po																			
				kvalitetu sastojina bez vrednosti (bez ucešca tehnickog drveta). Srednja																			
				ugroženost od insekata. Srednja ugroženost od drugih štetnih uticaja.																			
				nenegovana sastojina. Stabla bagrema su zakrivljena i sa srednjim padom																			
				precnika (srednja punodrvnost), sa dugim krošnjama (dužine izmedu 1/2 i																			
				2/3 visine stabala) i uskim krošnjama, suvih i suhovrhih stabala ima do																			
1	h	60326484	0,82	10%, zdravstveno stanje stabala ove vrste drveca je dobro.																			
				Šuma - nalazi se na strani i na blago nagnutom terenu (nagiba do 5°) -	1. Bag	1,0		20	9	8,5	15	7,5	1181	33	65	33			1311	5,8	26,6		1,4
				nagib ujednacen. Nadmorska visina 290 do 320m. Ekspozicija 1 istok -	2. Orah				13			12,5	363	97					460	5,6	30,9		
				jugoistok. Mrtvi pokrivac srednje zastupljen - povoljan proces	3. Klen				8	7,2	11	17,5	33	33					66	1,6	5,6		
				humifikacije. Retka prizemna vegetacija. Srednje gusto žbunje. Nema	4. Cjas				8	7,9	12												
				zakorovljenosti. tip šume kitnjaka (Quercetum montanum cariecetosum								UKUP.	1577	162	65	33			1837	13,0	63,1		1,4
				pilosae) na gajnjaci do lesiviranoj gajnjaci..																			
				Izdanacka šuma bagrema - jednodobna (u fazi izgradnje). Razredjena																			
				sastojina. Cista sastojina (smeša i grupimicna i stablimicna) nepotpunog																			
				sklopa (0.5-0.6). u celini zdravstveno stanje sastojine je osrednje. po																			
				kvalitetu sastojina bez vrednosti (bez ucešca tehnickog drveta). Srednja																			
				ugroženost od insekata. Srednja ugroženost od drugih štetnih uticaja.																			
				nenegovana sastojina. Stabla bagrema su zakrivljena i sa srednjim padom																			

ОПИС СТАНИШТА И САСТОЈИНА

Ozn.mesta		gazdi-	površ-	OPIS	Osnovni taksacioni elementi						visi	deb.	Broj stabala po hektaru							G	Zapremina po		
ode-	od-	nska	ina		vrsta	sme	obr	sta-	sred.stablo		nski			Vrsta drveta						po		Vrsta drv	
ljenje	sek	klasa	ha		drveća	sa	ast	rost	Ds	Hs	step.	st.	1	2	3	4	5	6	svg.	ha	1	2	3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
				precnika (srednja punodrvnost), sa dugim krošnjama (dužine izmedu 1/2 i																			
				2/3 visine stabala) i uskim krošnjama, suvih i suhovrhih stabala ima do																			
1	i	60325484	1,28	10%, zdravstveno stanje stabala ove vrste drveca je dobro.																			
				Šuma - nalazi se na strani i na blago nagnutom terenu (nagiba do 5°) -	1. Klen	0,4		35	25	14,2	12	7,5		288			96	48	433	1,9		6,2	
				nagib ujednacen. Nadmorska visina 290 do 320m. Ekspozicija 1 istok -	2. Bag	0,3			11	11,7	16	12,5		144		96	48		288	3,5		9,4	
				jugoistok. Mrtvi pokrivac srednje zastupljen - povoljan proces	3. Tre	0,2			20	13,7	14	17,5		96	48				144	3,5		15,1	9,0
				humifikacije. Retka prizemna vegetacija. Srednje gusto žbunje. Nema	4. Orah	0,1			13	12,3	10	22,5	48		48				96	3,8	12,9		13,3
				zakorovljenosti. tip šume kitnjaka (Quercetum montanum cariecetosum	5. PlBr				9	11,1	11	27,5	48						48	2,9	27,3		
				pilosae) na gajnjaci do lesiviranoj gajnjaci..	6. OTL				8	10,3	11												
												UKUP.	96	529	96	96	144	48	1009	15,6	40,2	30,6	22,3
				Izdanacka mešovita šuma bagrema - jednodobna (u optimalnoj fazi). Ocuvana																			
				sastojina. Mešovita sastojina (smeša i grupimicna i stablimicna) vrlo																			
				gustog sklopa (1.0). u celini zdravstveno stanje sastojine je dobro. po																			
				kvalitetu sastojina bez vrednosti (bez ucešca tehnickog drveta). Srednja																			
				ugroženost od insekata. Srednja ugroženost od drugih štetnih uticaja.																			
				nenegovana sastojina. Stabla bagrema su zakrivljena i sa srednjim padom																			
				precnika (srednja punodrvnost), sa dugim krošnjama (dužine izmedu 1/2 i																			
				2/3 visine stabala) i uskim krošnjama, suvih i suhovrhih stabala ima do																			
1	j	60326484	1,32	10%, zdravstveno stanje stabala ove vrste drveca je dobro.																			
				Put.																			
1	1	59	0,16																				

ОПИС СТАНИШТА И САСТОЈИНА

Ozn.mesta		gazdi-	površ-	OPIS	Osnovni taksacioni elementi						visi	deb.	Broj stabala po hektaru							G	Zapremina po		
ode-	od-	nska	ina		vrsta	sme	obr	sta-	sred.stablo		nski			Vrsta drveta						po		Vrsta drv	
ljenje	sek	klasa	ha		drveća	sa	ast	rost	Ds	Hs	step.	st.	1	2	3	4	5	6	svg.	ha	1	2	3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
				Šuma - nalazi se na strani i na srednje strmom terenu (nagiba od 6° do	1. Kit			15																
				10°) - nagib valovit. Nadmorska visina 290 do 400m. Ekspozicija 1																			
				zapadna. Mrtvi pokrivac srednje zastupljen - povoljan proces																			
				humifikacije. Srednje gusta prizemna vegetacija. Retko žbunje. Srednja																			
				zakorovljenost. tip šume kitnjaka (Quercetum montanum cariecetosum																			
				pilosae) na gajnjaci do lesiviranoj gajnjaci..																			
				Visoka šuma kitnjaka - jednodobna (podmladak u ranom periodu - dobro																			
				obraslo). Ocuvana sastojina. Cista sastojina (smeša stablimicna) gustog																			
				sklopa (0.8 - 0.9). u celini zdravstveno stanje sastojine je dobro. po																			
				kvalitetu sastojina bez vrednosti (bez ucešca tehnickog drveta). Srednja																			
				ugroženost od insekata. Srednja ugroženost od fitopatoloških																			
				oboljenja-oboljenja lista. dobro negovana sastojina. Podmladak kitnjaka																			
				se javlja pod punim sklopom, starosti oko 15 god. i visine oko 400cm,																			
2	a	59301484	15,25	gust na citavoj površini odseka, dobrog kvaliteta, bez oštecenja .																			
				Šuma - nalazi se u uvali i na strmom terenu (nagiba od 11° do 15°) -	1. Kit	0,8		119	32	19,4	11	7,5	47	77	277	81	31	16	530	2,3	1,0	1,5	5,9
				nagib valovit. Nadmorska visina 320 do 345m. Ekspozicija 1 zapadna.	2. Bk	0,1			15	12,5	14	12,5		16	31	16	16		78	1,0		1,3	1,6
				Mrtvi pokrivac srednje zastupljen - povoljan proces humifikacije. Srednje	3. SrLip				8	7,1	9	17,5		31		16			47	1,1		4,0	
				gusta prizemna vegetacija. Srednje gusto žbunje. Srednja zakorovljenost.	4. Brk				10	8,6	10	27,5	32						32	1,9	17,4		
				tip šume bukve i kitnjaka (Querco-Fagetum typicum) na gajnjaci do	5. Cjas				9	8,2	10	32,5	47						47	3,9	36,4		
				lesiviranoj gajnjaci i eutricnim smedim do lesiviranim eutricnim smedjim	6. Tre				8	6,7	14	37,5	65						65	7,1	67,2		
				zemljištima..								42,5	47						47	6,6	67,7		
												47,5	33						33	5,8	59,0		
				Izdanacka mešovita šuma kitnjaka (izdanacka šuma kitnjaka i bukve) -								52,5		15					15	3,3		38,3	
				jednodobna (u fazi razgradnje). Ocuvana sastojina. Mešovita sastojina								UKUP.	270	139	308	114	47	16	893	33,1	248,7	45,1	7,5
				(smeša stablimicna) gustog sklopa (0.8 - 0.9). u celini zdravstveno																			
				stanje sastojine je osrednje. po kvalitetu malo vredna sastojina (ima do																			
				20% tehnickog drveta). Srednja ugroženost od insekata. Srednja ugroženost																			
				od fitopatoloških oboljenja-oboljenja lista. srednje negovana sastojina.																			
				Stabla srebrna lipa su zakrivljena i sa srednjim padom precnika (srednja																			
				punodrvnost), sa srednje dugim krošnjama (dužine izmedu 1/3 i 1/2 visine																			
				stabala) i ekscentricnim krošnjama, zdravstveno stanje stabala ove vrste																			
				drveca je dobro. Stabla kitnjaka su zakrivljena i sa velikim padom																			
				precnika (mala punodrvnost), sa vrlo dugim krošnjama (dužine preko 2/3																			
				visine stabala) i uskim krošnjama, zdravstveno stanje stabala ove vrste																			
				drveca je osrednje. Stabla bukve su zakrivljena i sa velikim padom																			
				precnika (mala punodrvnost), sa srednje dugim krošnjama (dužine izmedu																			
				1/3 i 1/2 visine stabala) i preširokim krošnjama, zdravstveno stanje																			
2	b	59307601	0,98	stabala ove vrste drveca je dobro.																			
				Šuma - nalazi se na strani i na strmom terenu (nagiba od 11° do 15°) -	1. SrLip			7																
				nagib ujednacen. Nadmorska visina 340 do 375m. Ekspozicija 1 zapadna.																			
				Mrtvi pokrivac srednje zastupljen - povoljan proces humifikacije. Srednje																			
				gusta prizemna vegetacija. Gusto žbunje. Slaba zakorovljenost. tip šume																			
				kitnjaka (Quercetum montanum cariecetosum pilosae) na gajnjaci do																			
				lesiviranoj gajnjaci..																			
				Izdanacka mešovita šuma lipa - jednodobna (u fazi izgradnje). Ocuvana																			
				sastojina. Mešovita sastojina (smeša stablimicna) gustog sklopa (0.8 -																			

ОПИС СТАНИШТА И САСТОЈИНА

Ozn.mesta		gazdi-	površ-	OPIS	Osnovni taksacioni elementi						visi	deb.	Broj stabala po hektaru							G	Zapremina po		
ode-	od-	nska	ina		vrsta	sme	obr	sta-	sred.stablo		nski			Vrsta drveta						po		Vrsta drv	
ljenje	sek	klasa	ha		drveća	sa	ast	rost	Ds	Hs	step.	st.	1	2	3	4	5	6	svg.	ha	1	2	3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
				0.9). u celini zdravstveno stanje sastojine je dobro. po kvalitetu malo																			
				vredna sastojina (ima do 20% tehnickog drveta). Srednja ugroženost od																			
				insekata. Srednja ugroženost od fitopatoloških oboljenja-oboljenja lista.																			
2	c	59288484	2,25	srednje negovana sastojina.																			

ОПИС СТАНИШТА И САСТОЈИНА

Ozn.mesta		gazdi-	površ-	OPIS	Osnovni taksacioni elementi						visi	deb.	Broj stabala po hektaru							G	Zapremina po		
ode-	od-	nska	ina		vrsta	sme	obr	sta-	sred.stablo		nski			Vrsta drveta						po		Vrsta drv	
ljenje	sek	klasa	ha		drveća	sa	ast	rost	Ds	Hs	step.	st.	1	2	3	4	5	6	svg.	ha	1	2	3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
				Šuma - nalazi se na strani i na strmom terenu (nagiba od 11° do 15°) -	1. Kit	0,8		119	30	16,7	12	7,5		320	252	95	93		760	3,4		7,5	4,6
				nagib ujednacen. Nadmorska visina 355 do 370m. Ekspozicija 1 zapadna.	2. SrLip	0,1			11	9,3	10	12,5		95	31	31		31	187	2,3		7,4	2,3
				Mrtvi pokrivac srednje zastupljen - povoljan proces humifikacije. Srednje	3. Cjas	0,1			10	9,1	12	17,5	33	62	31				126	3,0	3,8	8,0	5,1
				gusta prizemna vegetacija. Gusto žbunje. Srednja zakorovljenost. tip šume	4. Klen				9	8,0	12	22,5	63	32	33				127	5,1	18,8	7,2	12,0
				razlicitih hrastova sa crnim jasenom (Orno-Polyquercetum) na slabo	5. Brk				8	7,0	12	27,5	94						94	5,6	46,7		
				razvijenim zemljištima na krecnjacima i bazicnim silikatnim stenama..	6. Tre				13	10,6	15	32,5	64						64	5,3	51,8		
												37,5	64						64	7,0	66,2		
				Izdanacka mešovita šuma kitnjaka - jednodobna (u fazi razgradnje).								42,5	33						33	4,7	42,6		
				Ocuvana sastojina. Mešovita sastojina (smeša stablimicna) vrlo gustog								UKUP.	350	508	347	126	93	31	1455	36,3	229,9	30,2	24,0
				sklopa (1.0). u celini zdravstveno stanje sastojine je dobro. po																			
				kvalitetu malo vredna sastojina (ima do 20% tehnickog drveta). Srednja																			
				ugroženost od insekata. Srednja ugroženost od fitopatoloških																			
				oboljenja-oboljenja lista. srednje negovana sastojina. Podmladak kitnjaka																			
				se javlja pod proredjenim sklopom, starosti oko 16 god. i visine oko																			
				30cm, po brojnosti zadovoljava (nalazi se na oko 70-90% površine odseka),																			
				dobrog kvaliteta, neznatno oštecen . Stabla srebrna lipa su zakrivljena																			
				i sa srednjim padom precnika (srednja punodrvnost), sa srednje dugim																			
				krošnjama (dužine izmedu 1/3 i 1/2 visine stabala) i ekscentricnim																			
				krošnjama, zdravstveno stanje stabala ove vrste drveca je dobro. Stabla																			
				kitnjaka su zakrivljena i sa srednjim padom precnika (srednja																			
				punodrvnost), sa srednje dugim krošnjama (dužine izmedu 1/3 i 1/2 visine																			
				stabala) i normalno razvijenim krošnjama, do 10% oštecenih stabala od																			
				insekata i fitopatoloških obolenja, suvih i suhovrhih stabala ima do 10%,																			
2	d	59307371	0,81	zdravstveno stanje stabala ove vrste drveca je dobro.																			
				Šuma - nalazi se na strani i na srednje strmom terenu (nagiba od 6° do	1. SrLip	0,6		74	20	13,5	13	7,5	277			48	81	33	438	1,9	5,5		
				10°) - nagib ujednacen. Nadmorska visina 355 do 370m. Ekspozicija 1	2. Kit	0,2			36	14,4	15	12,5				33		16	49	0,6			
				zapadna. Mrtvi pokrivac slabo zastupljen - povoljan proces humifikacije.	3. Cer	0,2			68	15,0	14	17,5	16						16	0,4	1,9		
				Retka prizemna vegetacija. Srednje gusto žbunje. Nema zakorovljenosti.	4. Klen				13	12,6	15	22,5	32						32	1,3	9,2		
				tip šume kitnjaka i cera sa bogatim spratom žbunja (Quercetum	5. Vez				8	10,8	15	27,5	49	32					81	4,8	21,6	13,4	
				petraea-cerris galietosum) na rendiznama, pararendzinama, posmedenim	6. Cjas				9	11,5	15	32,5	114	16		16			146	12,1	64,7	10,2	
				pararendzinama, plitkim eutricnim smedjim zemljištima i gajnjacama..								37,5	65	16					81	9,0	50,8	14,6	
												42,5	16						16	2,3	18,0		
				Izdanacka mešovita šuma lipa - jednodobna (u optimalnoj fazi). Ocuvana								52,5		16					16	3,5		30,9	
				sastojina. Mešovita sastojina (smeša stablimicna) vrlo gustog sklopa								67,5			16				16	5,9			52,8
				(1.0). u celini zdravstveno stanje sastojine je osrednje. po kvalitetu								UKUP.	568	81	16	97	81	49	891	41,7	171,6	69,2	52,8
				malo vredna sastojina (ima do 20% tehnickog drveta). Srednja ugroženost																			
				od insekata. Srednja ugroženost od fitopatoloških oboljenja-oboljenja																			
				lista. srednje negovana sastojina. Stabla srebrna lipa su zakrivljena i																			
				sa srednjim padom precnika (srednja punodrvnost), sa srednje dugim																			
				krošnjama (dužine izmedu 1/3 i 1/2 visine stabala) i ekscentricnim																			
				krošnjama, zdravstveno stanje stabala ove vrste drveca je dobro. Stabla																			
				kitnjaka su zakrivljena i sa srednjim padom precnika (srednja																			
				punodrvnost), sa srednje dugim krošnjama (dužine izmedu 1/3 i 1/2 visine																			
				stabala) i normalno razvijenim krošnjama, od 11-25% oštecenih stabala od																			
				insekata i fitopatoloških obolenja, suvih i sihovrhih stabala ima od																			
2	e	59288461	0,68	11-25%, zdravstveno stanje stabala ove vrste drveca je osrednje.																			
				Šuma - nalazi se na strani i na blago nagnutom terenu (nagiba do 5°) -	1. Kit	0,5		74	28	19,7	8	7,5		244	30	26	50	40	389	1,7		6,1	0,6
				nagib ujednacen. Nadmorska visina 330 do 370m. Ekspozicija 1 zapadna.	2. SrLip	0,4			15	13,8	6	12,5		107	30		28		165	2,0		8,7	3,2

ОПИС СТАНИШТА И САСТОЈИНА

Ozn.mesta		gazdi-	površ-	OPIS	Osnovni taksacioni elementi						visi	deb.	Broj stabala po hektaru							G	Zapremina po		
ode-	od-	nska	ina		vrsta	sme	obr	sta-	sred.stablo		nski			Vrsta drveta						po		Vrsta drv	
ljenje	sek	klasa	ha		drveća	sa	ast	rost	Ds	Hs	step.	st.	1	2	3	4	5	6	svg.	ha	1	2	3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
				Mrtvi pokrivac srednje zastupljen - povoljan proces humifikacije. Srednje	3. Bag				13	12,2	14	17,5	44	44	10	20	10		127	3,1	8,7	9,9	2,4
				gusta prizemna vegetacija. Retko žbunje. Nema zakorovljenosti. tip šume	4. Gr				14	13,1	8	22,5	50	38	10	10			107	4,3	18,0	11,2	3,4
				kitnjaka (Quercetum montanum cariecetosum pilosae) na gajnjaci do	5. OTL				10	10,3	8	27,5	20	14					34	2,0	12,6	6,9	
				lesiviranoj gajnjaci..	6. Tre				8	7,7	11	32,5	18	63					81	6,7	17,7	54,5	
												37,5	32						32	3,5	43,7		
				Izdanacka mešovita šuma kitnjaka (izdanacka šuma kitnjaka i lipe) -								42,5	20						20	2,8	37,1		
				jednodobna (u optimalnoj fazi). Ocuvana sastojina. Mešovita sastojina								47,5		10					10	1,7		20,3	
				(smeša stablimicna) gustog sklopa (0.8 - 0.9). u celini zdravstveno								UKUP.	182	519	79	55	87	40	963	27,8	137,9	117,6	9,6
				stanje sastojine je dobro. po kvalitetu malo vredna sastojina (ima do 20%																			
				tehnickog drveta). Srednja ugroženost od insekata. Srednja ugroženost od																			
				fitopatoloških oboljenja-oboljenja lista. srednje negovana sastojina.																			
				Stabla srebrna lipa su zakrivljena i sa srednjim padom precnika (srednja																			
				punodrvnost), sa srednje dugim krošnjama (dužine izmedu 1/3 i 1/2 visine																			
				stabala) i ekscentricnim krošnjama, zdravstveno stanje stabala ove vrste																			
				drveca je dobro. Stabla kitnjaka su zakrivljena i sa srednjim padom																			
				precnika (srednja punodrvnost), sa srednje dugim krošnjama (dužine izmedu																			
				1/3 i 1/2 visine stabala) i normalno razvijenim krošnjama, do 10%																			
				oštecenih stabala od insekata i fitopatoloških obolenja, suvih i																			
				suhovrhih stabala ima do 10%, zdravstveno stanje stabala ove vrste																			
2	f	59307484	4,11	drveca je dobro.																			

Ozn.mesta		gazdi-	površ-	OPIS	Osnovni taksacioni elementi						visi	deb.	Broj stabala po hektaru							G	Zapremina po		
ode-	od-	nska	ina		vrsta	sme	obr	sta-	sred.stablo		nski			Vrsta drveta						po		Vrsta drv	
ljenje	sek	klasa	ha		drveća	sa	ast	rost	Ds	Hs	step.	st.	1	2	3	4	5	6	svg.	ha	1	2	3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
				Šuma - nalazi se u dolini i na blago nagnutom terenu (nagiba do 5°) -	1. SrLip	0,8		29	9	8,8	8	7,5	1237	69	100	99	80	79	1663	7,3	30,8	1,9	2,5
				nagib konkavan (ugnut). Nadmorska visina 290 do 355m. Ekspozicija 1	2. Tre	0,1			11	10,8	12	12,5	178		30	39	20		267	3,3	11,6		2,6
				jugozapadna. Mrtvi pokrivac srednje zastupljen - povoljan proces	3. Gr				9	8,7	9	17,5	30	40					69	1,7	4,8	5,3	
				humifikacije. Srednje gusta prizemna vegetacija. Gusto žbunje. Srednja	4. OTL				9	8,9	10	72,5	10						10	4,1	46,6		
				zakorovljenost. tip šume lužnjaka, graba i cera sa lipama u dolinama	5. Klen				8	8,5	9												
				vecih nadmorskih visina (Tilio-Carpino-Quercetum robori-cerris collinum)	6. Cjas				8	7,5	9												
				na delivijumu..								UKUP.	1455	109	129	138	100	79	2010	16,4	93,7	7,2	5,1
				Izdanacka mešovita šuma lipa - jednodobna (u fazi izgradnje). Ocuvana																			
				sastojina. Mešovita sastojina (smeša i grupimicna i stablimicna) vrlo																			
				gustog sklopa (1.0). u celini zdravstveno stanje sastojine je dobro. po																			
				kvalitetu sastojina bez vrednosti (bez ucešca tehnickog drveta). Srednja																			
				ugroženost od insekata. Srednja ugroženost od fitopatoloških																			
				oboljenja-oboljenja lista. nenegovana sastojina. Stabla srebrna lipa su																			
				zakrivljena i sa srednjim padom precnika (srednja punodrvnost), sa																			
				kratkim krošnjama (dužine izmedu 1/4 i1/3 visine stabala) i uskim																			
2	g	59288144	4,67	krošnjama, zdravstveno stanje stabala ove vrste drveca je dobro.																			
				Put.																			
2	1	59	0,36																				
				Šuma - nalazi se na strani i na strmom terenu (nagiba od 11° do 15°) -	1. Kit	0,7		119	35	18,6	11	7,5		268	28		84	12	391	1,7		6,0	0,6
				nagib ujednacen. Nadmorska visina 365 do 470m. Ekspozicija 1 zapadna.	2. SrLip	0,3			13	14,4	9	12,5		102	5	12		12	130	1,6		7,2	0,2
				Ne postoji ugroženost od erozije - stablian teren u prirodnim uslovima.	3. OTL				13	14,4	11	17,5		44					44	1,1		6,4	
				Mrtvi pokrivac srednje zastupljen - povoljan proces humifikacije. Srednje	4. Mle				18	15,9	11	22,5	16	40		12			68	2,7	5,9	10,8	
				gusta prizemna vegetacija. Srednje gusto žbunje. Srednja zakorovljenost.	5. Cjas				8	11,0	11	27,5	5						5	0,3	2,3		
				tip šume kitnjaka (Quercetum montanum cariecetosum pilosae) na gajnjaci	6. Klen				10	12,9	11	32,5	75	47					122	10,1	62,2	34,4	
				do lesiviranoj gajnjaci..								37,5	52						52	5,7	57,5		
												42,5	9						9	1,3	13,0		
				Izdanacka mešovita šuma kitnjaka (izdanacka šuma kitnjaka i lipe) -								47,5			5				5	0,8			8,5
				jednodobna (u fazi razgradnje). Ocuvana sastojina. Mešovita sastojina								52,5	12						12	2,5	28,2		
				(smeša stablimicna) gustog sklopa (0.8 - 0.9). u celini zdravstveno								UKUP.	168	501	37	24	84	24	837	27,8	169,1	64,8	9,3
				stanje sastojine je osrednje. po kvalitetu malo vredna sastojina (ima do																			
				20% tehnickog drveta). Srednja ugroženost od insekata. Srednja ugroženost																			
				od fitopatoloških oboljenja-oboljenja kore. srednje negovana sastojina.																			
				Stabla srebrna lipa su zakrivljena i sa srednjim padom precnika (srednja																			
				punodrvnost), sa srednje dugim krošnjama (dužine izmedu 1/3 i 1/2 visine																			
				stabala) i ekscentricnim krošnjama, do 10% oštecenih stabala od																			
				fitopatoloških obolenja, suvih i suhovrhih stabala ima do 10%,																			
				zdravstveno stanje stabala ove vrste drveca je dobro. Stabla kitnjaka su																			
				zakrivljena i sa srednjim padom precnika (srednja punodrvnost), sa																			
				srednje dugim krošnjama (dužine izmedu 1/3 i 1/2 visine stabala) i																			
				normalno razvijenim krošnjama, od 11-25% oštecenih stabala od insekata,																			
				od 11-25% oštecenih stabala od fitopatoloških obolenja, suvih i sihovrhih																			
				stabala ima od 11-25%, zdravstveno stanje stabala ove vrste drveca je																			
3	a	59307484	3,03	osrednje.																			
				Šuma - nalazi se na platou i na blago nagnutom terenu (nagiba do 5°) -	1. Kit	0,6		119	32	18,1	10	7,5		40					40	0,2		1,0	
				nagib ujednacen. Nadmorska visina 430 do 465m. Ekspozicija 1 južna.	2. SrLip	0,4			16	14,4	8	12,5		109	16				126	1,5		10,0	1,5

ОПИС СТАНИШТА И САСТОЈИНА

Ozn.mesta		gazdi-	površ-	OPIS	Osnovni taksacioni elementi						visi	deb.	Broj stabala po hektaru							G	Zapremina po		
ode-	od-	nska	ina		vrsta	sme	obr	sta-	sred.stablo		nski			Vrsta drveta						po		Vrsta drv	
ljenje	sek	klasa	ha		drveća	sa	ast	rost	Ds	Hs	step.	st.	1	2	3	4	5	6	svg.	ha	1	2	3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
				Mrtvi pokrivac srednje zastupljen - povoljan proces humifikacije. Srednje	3. Cjas				13	12,7	11	17,5		148					148	3,6		23,9	
				gusta prizemna vegetacija. Srednje gusto žbunje. Srednja zakorovljenost.								22,5	7	33					40	1,6	2,2	11,0	
				tip šume kitnjaka (Quercetum montanum typicum) na kiselom smedem i								27,5	40	13					53	3,1	22,5	6,5	
				lesiviranom kiselom smedjem zemljištu..								32,5	40	13					53	4,4	31,5	10,8	
												37,5	49						49	5,4	54,8		
				Izdanacka mešovita šuma kitnjaka (izdanacka šuma kitnjaka i lipe) -								UKUP.	135	357	16				509	19,8	111,0	63,2	1,5
				jednodobna (u fazi razgradnje). Ocuvana sastojina. Mešovita sastojina																			
				(smeša stablimicna) nepotpunog sklopa (0.5-0.6). u celini zdravstveno																			
				stanje sastojine je osrednje. po kvalitetu malo vredna sastojina (ima do																			
				20% tehnickog drveta). Srednja ugroženost od insekata. Srednja ugroženost																			
				od fitopatoloških oboljenja-oboljenja kore. srednje negovana sastojina.																			
				Stabla srebrna lipa su zakrivljena i sa srednjim padom precnika (srednja																			
				punodrvnost), sa srednje dugim krošnjama (dužine izmedu 1/3 i 1/2 visine																			
				stabala) i ekscentricnim krošnjama, zdravstveno stanje stabala ove vrste																			
3	b	59307482	1,16	drveca je dobro.																			

Ozn.mesta		gazdi-	površ-	OPIS	Osnovni taksacioni elementi						visi	deb.	Broj stabala po hektaru							G	Zapremina po		
ode-	od-	nska	ina		vrsta	sme	obr	sta-	sred.stablo		nski			Vrsta drveta						po		Vrsta drv	
ljenje	sek	klasa	ha		drveća	sa	ast	rost	Ds	Hs	step.	st.	1	2	3	4	5	6	svg.	ha	1	2	3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
				Šuma - nalazi se na strani i na srednje strmom terenu (nagiba od 6° do	1. SrLip	0,8		16	10	9,7	8	7,5	678	218	88	66	75	50	1176	5,2	17,7	6,2	1,9
				10°) - nagib ujednacen. Nadmorska visina 350 do 420m. Ekspozicija 1	2. Gr	0,1			9	7,9	11	12,5	204	60	30				293	3,6	16,6	3,3	1,8
				zapadna. Mrtvi pokrivac srednje zastupljen - povoljan proces	3. OTL	0,1			9	8,6	11	17,5	50		10				60	1,4	8,1		1,6
				humifikacije. Retka prizemna vegetacija. Srednje gusto žbunje. Srednja	4. Cjas				8	7,0	11	22,5	47						47	1,9	12,5		
				zakorovljenost. tip šume kitnjaka (Quercetum montanum typicum) na kiselom	5. Klen				8	7,0	11	27,5	38						38	2,3	17,5		
				smedem i lesiviranom kiselom smedjem zemljištu..	6. PlBr				8	7,0	11												
												UKUP.	1018	278	128	66	75	50	1614	14,4	72,4	9,4	5,3
				Izdanacka mešovita šuma lipa - jednodobna (u fazi izgradnje). Ocuvana																			
				sastojina. Mešovita sastojina (smeša i grupimicna i stablimicna) gustog																			
				sklopa (0.8 - 0.9). u celini zdravstveno stanje sastojine je dobro. po																			
				kvalitetu sastojina bez vrednosti (bez ucešca tehnickog drveta). Srednja																			
				ugroženost od insekata. Mala ugroženost od snega. nenegovana sastojina.																			
				Stabla srebrna lipa su zakrivljena i sa srednjim padom precnika (srednja																			
				punodrvnost), sa srednje dugim krošnjama (dužine izmedu 1/3 i 1/2 visine																			
				stabala) i ekscentricnim krošnjama, do 10% oštecenih stabala od insekata,																			
				do 10% oštecenih stabala od mraza, suvih i suhovrhih stabala ima do 10%,																			
3	c	59288482	3,61	zdravstveno stanje stabala ove vrste drveca je dobro.																			
				Šuma - nalazi se na strani i na srednje strmom terenu (nagiba od 6° do	1. Kit	0,8		119	40	23,0	9	7,5		195	2	10	10	2	220	1,0		5,0	
				10°) - nagib valovit. Nadmorska visina 330 do 412m. Ekspozicija 1	2. SrLip	0,2			14	12,8	8	12,5		83	10	12			106	1,3		6,4	0,8
				jugozapadna. Mrtvi pokrivac slabo zastupljen - povoljan proces	3. OTL				15	12,9	9	17,5		28					28	0,7		5,0	
				humifikacije. Srednje gusta prizemna vegetacija. Srednje gusto žbunje.	4. Cjas				11	9,6	9	22,5		24		1			25	1,0		7,9	
				Srednja zakorovljenost. tip šume kitnjaka (Quercetum montanum	5. Mle				8	6,5	9	27,5	12	28					40	2,4	7,1	13,2	
				cariecetosum pilosae) na gajnjaci do lesiviranoj gajnjaci..	6. Tre				8	6,5	12	32,5	43	25	1				69	5,7	40,9	19,0	1,0
												37,5	57	2	1				60	6,6	69,3	2,6	1,4
				Izdanacka mešovita šuma kitnjaka (izdanacka šuma kitnjaka i lipe) -								42,5	17	2					19	2,7	28,0	3,3	
				jednodobna (u fazi razgradnje). Ocuvana sastojina. Mešovita sastojina								47,5	25	7					32	5,7	55,5	12,8	
				(smeša stablimicna) gustog sklopa (0.8 - 0.9). u celini zdravstveno								52,5	19	1					20	4,4	50,6	2,5	
				stanje sastojine je osrednje. po kvalitetu malo vredna sastojina (ima do								57,5	1						1	0,3	3,9		
				20% tehnickog drveta). Srednja ugroženost od insekata. Srednja ugroženost								62,5	5						5	1,6	19,5		
				od fitopatoloških oboljenja-oboljenja kore. srednje negovana sastojina.								UKUP.	179	396	15	24	10	2	626	33,4	274,7	77,9	3,3
				Stabla srebrna lipa su zakrivljena i sa srednjim padom precnika (srednja																			
				punodrvnost), sa srednje dugim krošnjama (dužine izmedu 1/3 i 1/2 visine																			
				stabala) i ekscentricnim krošnjama, zdravstveno stanje stabala ove vrste																			
				drveca je osrednje. Stabla kitnjaka su zakrivljena i sa srednjim padom																			
				precnika (srednja punodrvnost), sa srednje dugim krošnjama (dužine izmedu																			
				1/3 i 1/2 visine stabala) i normalno razvijenim krošnjama, od 11-25%																			
				oštecenih stabala od insekata, od 11-25% oštecenih stabala od																			
				fitopatoloških obolenja, suvih i suhovrhih stabala ima do 10%,																			
3	d	59307484	9,81	zdravstveno stanje stabala ove vrste drveca je osrednje.																			
				Šuma - nalazi se na grebenu i na vrlo strmom terenu(nagiba od 16° do	1. Kit			3															
				20°) - nagib ujednacen. Nadmorska visina 335 do 390m. Ekspozicija 1																			
				jugozapadna. Mrtvi pokrivac srednje zastupljen - povoljan proces																			
				humifikacije. Vrlo gusta prizemna vegetacija. Retko žbunje. Jaka																			
				zakorovljenost. tip šume kitnjaka (Quercetum montanum cariecetosum																			
				pilosae) na gajnjaci do lesiviranoj gajnjaci..																			
				Visoka šuma kitnjaka (visoka šuma kitnjaka i cera) - jednodobna (površina																			
				u procesu obnavljanja). Ocuvana sastojina. Mešovita sastojina (smeša																			

ОПИС СТАНИШТА И САСТОЈИНА

Ozn.mesta		gazdi-	površ-	OPIS	Osnovni taksacioni elementi						visi	deb.	Broj stabala po hektaru							G	Zapremina po		
ode-	od-	nska	ina		vrsta	sme	obr	sta-	sred.stablo		nski			Vrsta drveta						po		Vrsta drv	
ljenje	sek	klasa	ha		drveća	sa	ast	rost	Ds	Hs	step.	st.	1	2	3	4	5	6	svg.	ha	1	2	3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
				stablimicna) potpunog sklopa (0.7). u celini zdravstveno stanje sastojine																			
				je dobro. po kvalitetu sastojina bez vrednosti (bez ucešca tehnickog																			
				drveta). Srednja ugroženost od drugih štetnih uticaja. dobro negovana																			
				sastojina. Podmladak kitnjaka, po brojnosti zadovoljava (nalazi se na oko																			
				70-90% površine odseka), dobrog kvaliteta, neznatno oštecen od insekata.																			
				Podmladak cera, po brojnosti zadovoljava (nalazi se na oko 70-90%																			
3	e	59301484	1,16	površine odseka), dobrog kvaliteta, neznatno oštecen od insekata.																			
				Površinski kop laporca.																			
3	1	60	0,42																				
				Površinski kop laporca.																			
3	2	60	0,15																				
				Put.																			
3	3	59	0,13																				

Ozn.mesta		gazdi-	površ-	OPIS	Osnovni taksacioni elementi						visi	deb.	Broj stabala po hektaru							G	Zapremina po		
ode-	od-	nska	ina		vrsta	sme	obr	sta-	sred.stablo		nski			Vrsta drveta						po		Vrsta drv	
ljenje	sek	klasa	ha		drveća	sa	ast	rost	Ds	Hs	step.	st.	1	2	3	4	5	6	svg.	ha	1	2	3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
				Šuma - nalazi se na strani i na strmom terenu (nagiba od 11° do 15°) -	1. Kit	0,6		104	29	18,3	11	7,5		80	99		86	13	277	1,2		2,1	2,9
				nagib ujednacen. Nadmorska visina 430 do 465m. Ekspozicija 1 jug -	2. SrLip	0,2			17	13,7	9	12,5	17	45	17		29		107	1,3	1,4	3,2	0,9
				jugozapad. Mrtvi pokrivac srednje zastupljen - povoljan proces	3. Gr	0,1			12	10,4	10	17,5		39	19				58	1,4		6,1	3,7
				humifikacije. Srednje gusta prizemna vegetacija. Srednje gusto žbunje.	4. Tre	0,1			28	17,8	14	22,5	35	45	17	17			113	4,5	9,5	11,4	5,0
				Slaba zakorovljenost. tip šume kitnjaka i graba sa klokocikom	5. Cjas				9	8,1	10	27,5	86	56	6				148	8,8	50,4	26,4	3,7
				(Querco-Carpinetum staphyletosum) na kiselom smedem do lesiviranom	6. Mle				8	7,0	11	32,5	70	6		17			92	7,7	58,5	3,9	
				kiselom smedjem zemljištu..								37,5	13						13	1,4	13,7		
												52,5	13						13	2,7	31,4		
				Izdanacka mešovita šuma kitnjaka (izdanacka šuma kitnjaka i lipe) -								UKUP.	232	271	157	33	114	13	820	28,9	164,9	53,1	16,1
				jednodobna (u fazi razgradnje). Ocuvana sastojina. Mešovita sastojina																			
				(smeša stablimicna) vrlo gustog sklopa (1.0). u celini zdravstveno stanje																			
				sastojine je osrednje. po kvalitetu malo vredna sastojina (ima do 20%																			
				tehnickog drveta). Srednja ugroženost od insekata. Srednja ugroženost od																			
				fitopatoloških oboljenja-oboljenja lista. srednje negovana sastojina.																			
				Stabla graba su zakrivljena i sa velikim padom precnika (mala																			
				punodrvnost), sa dugim krošnjama (dužine izmedu 1/2 i 2/3 visine stabala)																			
				i ekscentricnim krošnjama, zdravstveno stanje stabala ove vrste drveca																			
				je osrednje. Stabla srebrna lipa su zakrivljena i sa srednjim padom																			
				precnika (srednja punodrvnost), sa srednje dugim krošnjama (dužine izmedu																			
				1/3 i 1/2 visine stabala) i ekscentricnim krošnjama, zdravstveno stanje																			
				stabala ove vrste drveca je dobro. Stabla kitnjaka su zakrivljena i sa																			
				velikim padom precnika (mala punodrvnost), sa dugim krošnjama (dužine																			
				izmedu 1/2 i 2/3 visine stabala) i ekscentricnim krošnjama, do 10%																			
				oštecenih stabala od insekata i fitopatoloških obolenja, suvih i																			
				suhovrhih stabala ima do 10%, zdravstveno stanje stabala ove vrste																			
4	a	59307263	0,73	drveca je osrednje.																			
				Šuma - nalazi se na strani i na srednje strmom terenu (nagiba od 6° do	1. SrLip	0,7		104	24	17,4	9	7,5	159		46	6	24	33	268	1,2	3,0		0,8
				10°) - nagib ujednacen. Nadmorska visina 415 do 480m. Ekspozicija 1	2. Kit	0,2			36	20,1	11	12,5	11		28	2		7	49	0,6	0,6		2,7
				zapadna. Mrtvi pokrivac srednje zastupljen - povoljan proces	3. Gr	0,1			16	13,8	10	17,5	18		29				47	1,1	2,4		5,9
				humifikacije. Srednje gusta prizemna vegetacija. Retko žbunje. Slaba	4. Bk	0,1			28	18,4	13	22,5	18		39	2	5		64	2,5	5,4		13,3
				zakorovljenost. tip šume bukve i kitnjaka (Querco-Fagetum typicum) na	5. OTL				10	9,9	11	27,5	26	12					39	2,3	12,9	6,1	
				kiselom smedem i lesiviranom kiselom smedjem zemljištu..	6. PBr				8	8,5	11	32,5	13	18	4	4			39	3,3	9,6	15,0	3,4
												37,5	34	11	6				50	5,5	35,2	12,3	6,3
				Izdanacka mešovita šuma lipa - jednodobna (u fazi razgradnje). Ocuvana								42,5	24	10					33	4,7	31,6	14,8	
				sastojina. Mešovita sastojina (smeša stablimicna) gustog sklopa (0.8 -								47,5	22	6		2			30	5,2	39,3	11,0	
				0.9). u celini zdravstveno stanje sastojine je osrednje. po kvalitetu								52,5	14			4			18	3,9	30,9		
				malo vredna sastojina (ima do 20% tehnickog drveta). Srednja ugroženost .								57,5	15						15	3,8	39,6		
				Srednja ugroženost od fitopatoloških oboljenja-oboljenja lista. srednje								62,5	15						15	4,5	47,3		
				negovana sastojina. Stabla srebrna lipa su zakrivljena i sa srednjim								UKUP.	368	56	151	20	29	41	664	38,6	257,9	59,2	32,4
				padom precnika (srednja punodrvnost), sa srednje dugim krošnjama (dužine																			
				izmedu 1/3 i 1/2 visine stabala) i ekscentricnim krošnjama, do 10%																			
				oštecenih stabala od guljenja kore, suvih i suhovrhih stabala ima do 10%,																			
				zdravstveno stanje stabala ove vrste drveca je osrednje. Stabla kitnjaka																			
				su zakrivljena i sa srednjim padom precnika (srednja punodrvnost), sa																			
				srednje dugim krošnjama (dužine izmedu 1/3 i 1/2 visine stabala) i																			
				normalno razvijenim krošnjama, od 11-25% oštecenih stabala od guljenja																			
				kore, suvih i sihovrhih stabala ima od 11-25%, zdravstveno stanje																			
4	b	59288602	4,40	stabala ove vrste drveca je osrednje.																			

ОПИС СТАНИШТА И САСТОЈИНА

Ozn.mesta		gazdi-	površ-	OPIS	Osnovni taksacioni elementi						visi	deb.	Broj stabala po hektaru							G	Zapremina po		
ode-	od-	nska	ina		vrsta	sme	obr	sta-	sred.stablo		nski			Vrsta drveta						po		Vrsta drv	
ljenje	sek	klasa	ha		drveća	sa	ast	rost	Ds	Hs	step.	st.	1	2	3	4	5	6	svg.	ha	1	2	3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
				Šuma - nalazi se u nizi i na vrlo strmom terenu(nagiba od 16° do 20°) -	1. SrLip	0,9		104	17	13,5	8	7,5	333	63		30			426	1,9	7,2	0,8	
				nagib konveksan (ispupcen). Nadmorska visina 420 do 484m. Ekspozicija 1	2. Cjas	0,1			15	12,3	11	12,5	187	30	32				249	3,1	13,1	2,3	2,8
				zapadna. Mrtvi pokrivac srednje zastupljen - povoljan proces	3. Tre				13	11,4	13	17,5	216	91					307	7,4	42,4	14,3	
				humifikacije. Srednje gusta prizemna vegetacija. Srednje gusto žbunje.	4. Mle				8	8,2	10	22,5	239	30					269	10,7	77,1	7,7	
				Srednja zakorovljenost. tip šume razlicitih hrastova sa crnim jasenom								27,5	154						154	9,1	74,8		
				(Orno-Polyquercetum) na slabo razvijenim zemljištima na krecnjacima i								32,5	60						60	5,0	43,8		
				bazicnim silikatnim stenama..								UKUP.	1189	214	32	30			1465	37,1	258,3	25,2	2,8
				Izdanacka mešovita šuma lipa - jednodobna (u fazi razgradnje). Ocuvana																			
				sastojina. Mešovita sastojina (smeša stablimicna) gustog sklopa (0.8 -																			
				0.9). u celini zdravstveno stanje sastojine je dobro. po kvalitetu malo																			
				vredna sastojina (ima do 20% tehnickog drveta). Srednja ugroženost od																			
				insekata. Srednja ugroženost od fitopatoloških oboljenja-oboljenja lista.																			
				srednje negovana sastojina. Stabla srebrna lipa su zakrivljena i sa																			
				srednjim padom precnika (srednja punodrvnost), sa srednje dugim krošnjama																			
				(dužine izmedu 1/3 i 1/2 visine stabala) i ekscentricnim krošnjama,																			
4	c	59288371	1,44	zdravstveno stanje stabala ove vrste drveca je dobro.																			
				Livada.																			
4	1	60	0,16																				

Ozn.mesta		gazdi-	površ-	OPIS	Osnovni taksacioni elementi						visi	deb.	Broj stabala po hektaru							G	Zapremina po		
					vrsta	sme	obr	sta-	sred.stablo		nski		Vrsta drveta							po	Vrsta drv		
ode-	od-	nska	ina		drveća	sa	ast	rost	Ds	Hs	step.	st.	1	2	3	4	5	6	svg.	ha	1	2	3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
				Put.																			
4	2	59	0,13																				
				Šuma - nalazi se na strani i na blago nagnutom terenu (nagiba do 5°) -	1. Kit	0,8		102	36	20,9	10	7,5		143	108	46	82	68	447	2,0		3,0	2,2
				nagib ujednacen. Nadmorska visina 430 do 485m. Ekspozicija 1 južna.	2. SrLip	0,1			14	9,0	8	12,5		26	26	41	26		119	1,5		1,5	1,5
				Mrtvi pokrivac obilno zastupljen (tanak sloj) - povoljan proces	3. OTL				11	7,0	10	17,5	14	19		7			40	1,0	2,4	2,8	
				humifikacije. Srednje gusta prizemna vegetacija. Srednje gusto žbunje.	4. Gr				11	7,2	10	22,5	19	7		7			33	1,3	6,1	2,4	
				Srednja zakorovljenost. tip šume kitnjaka i graba sa klokocikom	5. Cjas				9	5,2	10	27,5	19	7	7				33	2,0	10,8	3,3	3,4
				(Querco-Carpinetum staphyletosum) na kiselom smedem do lesiviranom	6. Tre				8	4,2	13	32,5	80	15					95	7,9	66,4	12,8	
				kiselom smedjem zemljištu..								37,5	50						50	5,5	56,9		
												42,5	26	10	7				43	6,1	42,1	13,5	10,1
				Izdanacka mešovita šuma kitnjaka (izdanacka šuma kitnjaka i lipe) -								47,5	26						26	4,6	53,6		
				jednodobna (u fazi razgradnje). Ocuvana sastojina. Mešovita sastojina								52,5	21	3					24	5,2	51,4	6,7	
				(smeša stablimicna) gustog sklopa (0.8 - 0.9). u celini zdravstveno								UKUP.	257	229	149	100	108	68	911	37,1	289,7	45,9	17,2
				stanje sastojine je osrednje. po kvalitetu malo vredna sastojina (ima do																			
				20% tehnickog drveta). Srednja ugroženost od insekata. Srednja ugroženost																			
				od fitopatoloških oboljenja-oboljenja lista. srednje negovana sastojina.																			
				Stabla srebrna lipa su zakrivljena i sa srednjim padom precnika (srednja																			
				punodrvnost), sa dugim krošnjama (dužine izmedu 1/2 i 2/3 visine stabala)																			
				i ekscentricnim krošnjama, suvih i sihovrhih stabala ima od 11-25%,																			
				zdravstveno stanje stabala ove vrste drveca je dobro. Stabla kitnjaka su																			
				zakrivljena i sa velikim padom precnika (mala punodrvnost), sa dugim																			
				krošnjama (dužine izmedu 1/2 i 2/3 visine stabala) i ekscentricnim																			
				krošnjama, suvih i suhovrhih stabala ima do 10%, zdravstveno stanje																			
5	a	59307263	4,06	stabala ove vrste drveca je osrednje.																			
				Šuma - nalazi se u dolini i na strmom terenu (nagiba od 11° do 15°) -	1. SrLip	0,7		102	32	18,0	11	7,5	82	35	33	16	38	74	277	1,2	1,3	0,7	0,7
				nagib valovit. Nadmorska visina 370 do 455m. Ekspozicija 1 južna. Mrtvi	2. Bk	0,1			21	17,3	15	12,5	4	7	4	4	13	26	59	0,7	0,3	0,4	0,3
				pokrivac obilno zastupljen (tanak sloj) - povoljan proces humifikacije.	3. OTL	0,1			25	17,9	12	17,5	12			10			22	0,5	1,5		
				Srednje gusta prizemna vegetacija. Srednje gusto žbunje. Srednja	4. Gr				16	16,4	11	22,5	5			5			10	0,4	1,3		
				zakorovljenost. tip šume bukve i kitnjaka (Querco-Fagetum typicum) na	5. Mle				12	15,1	12	27,5	7						7	0,4	3,1		
				kiselom smedem i lesiviranom kiselom smedjem zemljištu..	6. PBr				9	13,2	12	32,5	26			7			34	2,8	18,5		
												37,5	22	2	10				34	3,7	20,9	2,1	10,9
				Izdanacka mešovita šuma lipa - jednodobna (u fazi razgradnje). Ocuvana								42,5	35		14				49	6,9	41,8		20,8
				sastojina. Mešovita sastojina (smeša stablimicna) gustog sklopa (0.8 -								47,5	38				5		43	7,6	58,8		
				0.9). u celini zdravstveno stanje sastojine je dobro. po kvalitetu malo								52,5	18	4	2				24	5,2	35,9	9,9	5,4
				vredna sastojina (ima do 20% tehnickog drveta). Srednja ugroženost od								57,5	13	2					15	3,8	30,3	6,1	
				insekata. Srednja ugroženost od fitopatoloških oboljenja-oboljenja lista.								62,5	2	4	5				12	3,6	6,0	14,2	18,6
				srednje negovana sastojina. Stabla srebrna lipa su zakrivljena i sa								67,5	5	2					7	2,6	17,8	7,5	
				srednjim padom precnika (srednja punodrvnost), sa srednje dugim krošnjama								72,5	5						5	2,1	20,7		
				(dužine izmedu 1/3 i 1/2 visine stabala) i ekscentricnim krošnjama, bez								UKUP.	273	57	68	42	56	100	597	41,7	258,2	40,9	56,7
				suvih i suhovrhih stabala, zdravstveno stanje stabala ove vrste drveca																			
				je dobro. Stabla bukve su zakrivljena i sa srednjim padom precnika																			
				(srednja punodrvnost), sa dugim krošnjama (dužine izmedu 1/2 i 2/3 visine																			
				stabala) i ekscentricnim krošnjama, bez suvih i suhovrhih stabala,																			
5	b	59288602	7,29	zdravstveno stanje stabala ove vrste drveca je dobro.																			
				Šuma - nalazi se na strani i na srednje strmom terenu (nagiba od 6° do	1. SrLip	0,5		102	17	13,2	8	7,5	294		3	32	15		344	1,5	6,4		0,1
				10°) - nagib ujednacen. Nadmorska visina 380 do 460m. Ekspozicija 1	2. Kit	0,4			40	20,8	11	12,5	30		3	3	3		38	0,5	2,2		0,1

ОПИС СТАНИШТА И САСТОЈИНА

Ozn.mesta		gazdi-	površ-	OPIS	Osnovni taksacioni elementi						visi	deb.	Broj stabala po hektaru							G	Zapremina po		
ode-	od-	nska	ina		vrsta	sme	obr	sta-	sred.stablo		nski			Vrsta drveta						po		Vrsta drv	
ljenje	sek	klasa	ha		drveća	sa	ast	rost	Ds	Hs	step.	st.	1	2	3	4	5	6	svg.	ha	1	2	3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
				jugoistocna. Mrtvi pokrivac srednje zastupljen - povoljan proces	3. Bk	0,1			33	19,1	13	17,5	3						3	0,1	0,6		
				humifikacije. Srednje gusta prizemna vegetacija. Srednje gusto žbunje.	4. Cjas				8	6,7	10	22,5	30		3				33	1,3	10,2		0,9
				Srednja zakorovljenost. tip šume kitnjaka (Quercetum montanum	5. Gr				8	7,0	10	27,5	31	13					43	2,6	13,3	6,5	
				cariecetosum pilosae) na gajnjaci do lesiviranoj gajnjaci..								32,5	44	35					79	6,6	33,7	26,0	
												37,5	22	13					35	3,8	23,7	13,6	
				Izdanacka mešovita šuma kitnjaka - jednodobna (u fazi razgradnje).								42,5	27	16	3				46	6,5	36,3	25,7	4,9
				Ocuvana sastojina. Mešovita sastojina (smeša stablimicna) gustog sklopa								47,5	13		3				15	2,7	22,5		5,7
				(0.8 - 0.9). u celini zdravstveno stanje sastojine je dobro. po kvalitetu								52,5		10					10	2,1		23,1	
				malo vredna sastojina (ima do 20% tehnickog drveta). Srednja ugroženost								57,5		7					7	1,8		20,0	
				od insekata. Srednja ugroženost od fitopatoloških oboljenja-oboljenja								62,5		7	3				10	3,0		24,1	10,2
				lista. srednje negovana sastojina. Stabla srebrna lipa su zakrivljena i								UKUP.	493	101	17	34	18		662	32,4	148,9	139,0	21,9
				sa srednjim padom precnika (srednja punodrvnost), sa srednje dugim																			
				krošnjama (dužine izmedu 1/3 i 1/2 visine stabala) i ekscentricnim																			
				krošnjama, bez suvih i suhovrhih stabala, zdravstveno stanje stabala ove																			
				vrste drveca je dobro. Stabla kitnjaka su zakrivljena i sa srednjim padom																			
				precnika (srednja punodrvnost), sa srednje dugim krošnjama (dužine izmedu																			
				1/3 i 1/2 visine stabala) i normalno razvijenim krošnjama, do 10%																			
				oštecenih stabala od insekata i fitopatoloških obolenja, suvih i																			
				suhovrhih stabala ima do 10%, zdravstveno stanje stabala ove vrste																			
5	c	59307484	3,57	drveca je dobro.																			

Ozn.mesta		gazdi-	površ-	OPIS	Osnovni taksacioni elementi						visi	deb.	Broj stabala po hektaru							G	Zapremina po		
ode-	od-	nska	ina		vrsta	sme	obr	sta-	sred.stablo		nski			Vrsta drveta						po		Vrsta drv	
ljenje	sek	klasa	ha		drveća	sa	ast	rost	Ds	Hs	step.	st.	1	2	3	4	5	6	svg.	ha	1	2	3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
				Šuma - nalazi se na strani i na vrlo strmom terenu (nagiba od 21° do	1. Kit	0,7		105	33	21,1	9	7,5		124		15	15	27	180	0,8		3,5	
				25°) - nagib ujednacen. Nadmorska visina 375 do 430m. Ekspozicija 1	2. SrLip	0,2			16	13,6	6	12,5		19			44		63	0,8		1,7	
				zapadna. Mrtvi pokrivac srednje zastupljen - povoljan proces	3. Bk	0,1			33	21,0	11	17,5		27					27	0,6		4,6	
				humifikacije. Srednje gusta prizemna vegetacija. Srednje gusto žbunje.	4. OTL				20	16,1	9	27,5	36	15					51	3,0	23,7	6,9	
				Srednja zakorovljenost. tip šume kitnjaka (Quercetum montanum	5. Cjas				11	10,3	9	32,5	101	27	15	15			157	13,0	92,4	21,7	15,2
				cariecetosum pilosae) na gajnjaci do lesiviranoj gajnjaci..	6. Brk				8	6,8	9	37,5	44						44	4,9	57,8		
												42,5		15					15	2,1		21,3	
				Izdanacka mešovita šuma lipa - jednodobna (u fazi razgradnje). Ocuvana								UKUP.	181	226	15	29	59	27	537	25,2	173,9	59,7	15,2
				sastojina. Mešovita sastojina (smeša stablimicna) vrlo gustog sklopa																			
				(1.0). u celini zdravstveno stanje sastojine je osrednje. po kvalitetu																			
				malo vredna sastojina (ima do 20% tehnickog drveta). Srednja ugroženost																			
				od insekata. Srednja ugroženost od fitopatoloških oboljenja-oboljenja																			
				lista. srednje negovana sastojina. Stabla srebrna lipa su zakrivljena i																			
				sa srednjim padom precnika (srednja punodrvnost), sa srednje dugim																			
				krošnjama (dužine izmedu 1/3 i 1/2 visine stabala) i ekscentricnim																			
				krošnjama, bez suvih i suhovrhih stabala, zdravstveno stanje stabala ove																			
				vrste drveca je dobro. Stabla kitnjaka su zakrivljena i sa srednjim padom																			
				precnika (srednja punodrvnost), sa srednje dugim krošnjama (dužine izmedu																			
				1/3 i 1/2 visine stabala) i normalno razvijenim krošnjama, do 10%																			
				oštecenih stabala od insekata i fitopatoloških obolenja, suvih i																			
				suhovrhih stabala ima do 10%, zdravstveno stanje stabala ove vrste																			
5	d	59288484	0,97	drveca je osrednje.																			
				Put.																			
5	1	59	0,35																				
				Šuma - nalazi se na strani i na vrlo strmom terenu(nagiba od 16° do	1. Kit	0,6		104	34	19,0	10	7,5		310	30	15	16		372	1,6		6,8	1,2
				20°) - nagib ujednacen. Nadmorska visina 365 do 425m. Ekspozicija 1	2. SrLip	0,4			13	12,4	8	12,5		78					78	1,0		6,4	
				jugozapadna. Mrtvi pokrivac srednje zastupljen - povoljan proces	3. Cjas				8	8,2	10	17,5		45					45	1,1		7,4	
				humifikacije. Retka prizemna vegetacija. Gusto žbunje. Srednja	4. Mle				8	8,2	10	22,5		15					15	0,6		5,8	
				zakorovljenost. tip šume kitnjaka (Quercetum montanum cariecetosum	5. Gr				8	8,2	10	27,5	45	15					60	3,6	27,9	6,4	
				pilosae) na gajnjaci do lesiviranoj gajnjaci..								32,5	46						46	3,9	39,0		
												37,5	45	31					77	8,5	53,9	32,3	
				Izdanacka mešovita šuma kitnjaka (izdanacka šuma kitnjaka i lipe) -								42,5	16	16					33	4,6	23,3	20,6	
				jednodobna (u fazi razgradnje). Razredjena sastojina. Mešovita sastojina								UKUP.	153	511	30	15	16		726	24,8	144,1	85,7	1,2
				(smeša stablimicna) nepotpunog sklopa (0.5-0.6). u celini zdravstveno																			
				stanje sastojine je osrednje. po kvalitetu malo vredna sastojina (ima do																			
				20% tehnickog drveta). Srednja ugroženost od insekata. Srednja ugroženost																			
				od fitopatoloških oboljenja-oboljenja kore. pogrešno negovana sastojina.																			
				Stabla srebrna lipa su zakrivljena i sa srednjim padom precnika (srednja																			
				punodrvnost), sa srednje dugim krošnjama (dužine izmedu 1/3 i 1/2 visine																			
				stabala) i ekscentricnim krošnjama, zdravstveno stanje stabala ove vrste																			
				drveca je dobro. Stabla kitnjaka su zakrivljena i sa srednjim padom																			
				precnika (srednja punodrvnost), sa srednje dugim krošnjama (dužine izmedu																			
				1/3 i 1/2 visine stabala) i ekscentricnim krošnjama, od 11-25% oštecenih																			
				stabala od insekata, od 11-25% oštecenih stabala od fitopatoloških																			
				obolenja, suvih i suhovrhih stabala ima do 10%, zdravstveno stanje																			
6	a	59307484	1,35	stabala ove vrste drveca je osrednje.																			

ОПИС СТАНИШТА И САСТОЈИНА

Ozn.mesta		gazdi-	površ-	OPIS	Osnovni taksacioni elementi						visi	deb.	Broj stabala po hektaru							G	Zapremina po		
ode-	od-	nska	ina		vrsta	sme	obr	sta-	sred.stablo		nski			Vrsta drveta						po		Vrsta drv	
ljenje	sek	klasa	ha		drveća	sa	ast	rost	Ds	Hs	step.	st.	1	2	3	4	5	6	svg.	ha	1	2	3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
				Šuma - nalazi se u uvali i na strmom terenu (nagiba od 11° do 15°) -	1. Kit	0,6		104	39	20,4	11	7,5	5	159	48	58	4	20	295	1,3	0,1	3,6	0,9
				nagib valovit. Nadmorska visina 305 do 385m. Ekspozicija 1 jugozapadna.	2. SrLip	0,3			15	12,3	9	12,5		53	12	5	2		72	0,9		3,9	0,9
				Mrtvi pokrivac srednje zastupljen - povoljan proces humifikacije. Srednje	3. Gr	0,1			16	12,9	11	17,5	2	20	23		6		51	1,2	0,4	3,1	4,3
				gusta prizemna vegetacija. Srednje gusto žbunje. Slaba zakorovljenost.	4. OTL				11	9,5	11	22,5	2		9		2		14	0,5	0,7		3,3
				tip šume kitnjaka i graba sa klokocikom (Querco-Carpinetum staphyletosum)	5. Cjas				16	12,9	11	27,5	10	2	5	6	2		24	1,4	4,8	0,8	2,8
				na kiselom smedem do lesiviranom kiselom smedjem zemljištu..	6. Tre				8	6,8	14	32,5	15	5	5				25	2,1	11,7	4,4	3,9
												37,5	38	5	5				48	5,3	44,8	5,1	4,9
				Izdanacka mešovita šuma kitnjaka (izdanacka šuma kitnjaka i lipe) -								42,5	36	13	5				54	7,7	54,1	17,3	6,9
				jednodobna (u fazi razgradnje). Ocuvana sastojina. Mešovita sastojina								47,5	23	11					33	5,9	45,1	19,0	
				(smeša stablimicna) potpunog sklopa (0.7). u celini zdravstveno stanje								52,5	13	5		2			20	4,4	31,4	10,5	
				sastojine je osrednje. po kvalitetu malo vredna sastojina (ima do 20%								57,5		5					5	1,4		13,4	
				tehnickog drveta). Srednja ugroženost od insekata. Srednja ugroženost od								UKUP.	143	278	113	71	16	20	641	32,0	193,0	81,2	27,9
				fitopatoloških oboljenja-oboljenja kore. srednje negovana sastojina. 0.																			
				Stabla srebrna lipa su zakrivljena i sa srednjim padom precnika (srednja																			
				punodrvnost), sa srednje dugim krošnjama (dužine izmedu 1/3 i 1/2 visine																			
				stabala) i ekscentricnim krošnjama, zdravstveno stanje stabala ove vrste																			
				drveca je dobro. Stabla kitnjaka su zakrivljena i sa srednjim padom																			
				precnika (srednja punodrvnost), sa srednje dugim krošnjama (dužine izmedu																			
				1/3 i 1/2 visine stabala) i ekscentricnim krošnjama, do 10% oštecenih																			
				stabala od insekata, do 10% oštecenih stabala od fitopatoloških obolenja,																			
6	b	59307263	5,67	zdravstveno stanje stabala ove vrste drveca je osrednje.																			

Ozn.mesta		gazdi-	površ-	OPIS	Osnovni taksacioni elementi						visi	deb.	Broj stabala po hektaru							G	Zapremina po		
					vrsta	sme	obr	sta-	sred.stablo		nski			Vrsta drveta						po		Vrsta drv	
ode-	od-	nska	ina		drveća	sa	ast	rost	Ds	Hs	step.	st.	1	2	3	4	5	6	svg.	ha	1	2	3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
				Šuma - nalazi se na strani i na strmom terenu (nagiba od 11° do 15°) -	1. Kit	0,7		104	32	21,1	9	7,5	11	322	159	10	15	21	538	2,4	0,3	9,5	4,3
				nagib valovit. Nadmorska visina 325 do 405m. Ekspozicija 1 južna. Mrtvi	2. SrLip	0,2			11	10,1	6	12,5	10	78	20		5	5	119	1,5	0,8	7,3	1,8
				pokrivac srednje zastupljen - nepovoljan proces humifikacije. Srednje	3. Cjas				8	7,4	8	17,5	10	78			5		93	2,2	2,2	15,7	
				gusta prizemna vegetacija. Gusto žbunje. Srednja zakorovljenost. tip šume	4. OTL	0,1			25	18,2	9	22,5	15	10	5				31	1,2	4,7	3,1	2,0
				kitnjaka (Quercetum montanum cariecetosum pilosae) na gajnjaci do	5. Brk				11	9,3	8	27,5	21	11					31	1,9	12,7	6,7	
				lesiviranoj gajnjaci..	6. Tre				8	7,4	11	32,5	31	5		5			42	3,5	27,4	4,0	
												37,5	43	6		10			59	6,5	55,7	6,0	
				Izdanacka mešovita šuma kitnjaka (izdanacka šuma kitnjaka i lipe) -								42,5	26						26	3,7	40,7		
				jednodobna (u fazi razgradnje). Ocuvana sastojina. Mešovita sastojina								47,5	21	5					26	4,6	44,0	10,0	
				(smeša stablimicna) gustog sklopa (0.8 - 0.9). u celini zdravstveno								UKUP.	189	515	184	26	25	26	964	27,4	188,4	62,3	8,1
				stanje sastojine je osrednje. po kvalitetu sastojina bez vrednosti (bez																			
				ucešca tehnickog drveta). Srednja ugroženost od insekata. Srednja																			
				ugroženost od fitopatoloških oboljenja-oboljenja kore. srednje negovana																			
				sastojina. Stabla srebrna lipa su zakrivljena i sa srednjim padom																			
				precnika (srednja punodrvnost), sa srednje dugim krošnjama (dužine izmedu																			
				1/3 i 1/2 visine stabala) i ekscentricnim krošnjama, zdravstveno stanje																			
				stabala ove vrste drveca je dobro. Stabla kitnjaka su zakrivljena i sa																			
				srednjim padom precnika (srednja punodrvnost), sa srednje dugim krošnjama																			
				(dužine izmedu 1/3 i 1/2 visine stabala) i ekscentricnim krošnjama, od																			
				11-25% oštecenih stabala od insekata, od 11-25% oštecenih stabala od																			
				fitopatoloških obolenja, suvih i suhovrhih stabala ima do 10%,																			
6	c	59307484	4,56	zdravstveno stanje stabala ove vrste drveca je osrednje.																			
				Šuma - nalazi se na grebenu i na vrlo strmom terenu(nagiba od 16° do	1. Kit	0,5		104	30	17,4	11	7,5		170		75	117	17	379	1,7		5,7	
				20°) - nagib valovit. Nadmorska visina 305 do 355m. Ekspozicija 1	2. SrLip	0,2			13	11,4	6	12,5		64		12	33		108	1,3		5,0	
				južna. Mrtvi pokrivac srednje zastupljen - povoljan proces humifikacije.	3. Cer	0,2			41	19,4	10	17,5		18		4		4	26	0,6		3,5	
				Srednje gusta prizemna vegetacija. Srednje gusto žbunje. Slaba	4. Gr	0,1			12	10,2	11	22,5	28	18		13	4		62	2,5	10,1	7,2	
				zakorovljenost. tip šume razlicitih hrastova sa crnim jasenom	5. Cjas				10	8,9	11	27,5	42	18		9	9		78	4,6	22,9	9,1	
				(Orno-Polyquercetum) na slabo razvijenim zemljištima na krecnjacima i	6. OTL				9	8,4	11	32,5	27	18					44	3,7	22,9	15,7	
				bazicnim silikatnim stenama..								37,5	13		9				22	2,5	17,1		10,7
												42,5	10		18				27	3,9	13,7		26,4
				Izdanacka mešovita šuma kitnjaka (izdanacka šuma kitnjaka i lipe) -								UKUP.	119	305	27	112	162	21	746	20,7	86,7	46,0	37,1
				jednodobna (u fazi razgradnje). Ocuvana sastojina. Mešovita sastojina																			
				(smeša stablimicna) gustog sklopa (0.8 - 0.9). u celini zdravstveno																			
				stanje sastojine je osrednje. po kvalitetu sastojina bez vrednosti (bez																			
				ucešca tehnickog drveta). Srednja ugroženost od insekata. Srednja																			
				ugroženost od fitopatoloških oboljenja-oboljenja kore. srednje negovana																			
				sastojina. Stabla srebrna lipa su zakrivljena i sa srednjim padom																			
				precnika (srednja punodrvnost), sa srednje dugim krošnjama (dužine izmedu																			
				1/3 i 1/2 visine stabala) i ekscentricnim krošnjama, zdravstveno stanje																			
				stabala ove vrste drveca je dobro. Stabla kitnjaka su zakrivljena i sa																			
				srednjim padom precnika (srednja punodrvnost), sa srednje dugim krošnjama																			
				(dužine izmedu 1/3 i 1/2 visine stabala) i ekscentricnim krošnjama, od																			
				11-25% oštecenih stabala od insekata, od 11-25% oštecenih stabala od																			
				fitopatoloških obolenja, suvih i suhovrhih stabala ima do 10%,																			
6	d	59307371	2,33	zdravstveno stanje stabala ove vrste drveca je osrednje.																			
				Šuma - nalazi se na ravnom terenu. i na blago nagnutom terenu (nagiba do	1. SrLip	0,4		99	23	16,1	9	7,5	75		8	12	32	41	168	0,7	1,5		0,2
				5°) - nagib ujednacen. Nadmorska visina 285 do 310m. Ekspozicija 1 bez	2. Kit	0,3			48	22,1	11	12,5	28			4			32	0,4	2,0		
				jasno izražene ekspozicije. Mrtvi pokrivac srednje zastupljen - povoljan	3. Gr	0,1			24	16,6	10	17,5			12				12	0,3			2,5

ОПИС СТАНИШТА И САСТОЈИНА

Ozn.mesta		gazdi-	površ-	OPIS	Osnovni taksacioni elementi						visi	deb.	Broj stabala po hektaru							G	Zapremina po		
ode-	od-	nska	ina		vrsta	sme	obr	sta-	sred.stablo		nski			Vrsta drveta						po		Vrsta drv	
ljenje	sek	klasa	ha		drveća	sa	ast	rost	Ds	Hs	step.	st.	1	2	3	4	5	6	svg.	ha	1	2	3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
				proces humifikacije. Srednje gusta prizemna vegetacija. Retko žbunje.	4. OTL	0,1			23	16,1	11	22,5	4		10		20		34	1,3	1,1		3,3
				Slaba zakorovljenost. tip šume lužnjaka, graba i cera sa lipama u	5. Klen				16	12,4	10	27,5	4		12		10		26	1,5	2,1		5,7
				dolinama vecih nadmorskih visina (Tilio-Carpino-Quercetum robori-cerris	6. Tre				8	6,3	13	32,5	4	4	16				24	2,0	2,5	3,7	12,7
				collinum) na delivijumu..								37,5	16	4		4			24	2,6	15,6	5,1	
												42,5	22	8	4				34	4,8	30,1	12,5	5,2
				Izdanacka mešovita šuma lipa (izdanacka šuma lipa i kitnjaka) -								47,5	28	12					40	7,0	47,1	22,6	
				jednodobna (u fazi razgradnje). Ocuvana sastojina. Mešovita sastojina								52,5	4						4	0,9	8,3		
				(smeša stablimicna) potpunog sklopa (0.7). u celini zdravstveno stanje								57,5		8					8	2,1		26,3	
				sastojine je osrednje. po kvalitetu sastojina bez vrednosti (bez ucešca								67,5		4		4			8	2,8		16,1	
				tehnickog drveta). Srednja ugroženost od insekata. Mala ugroženost od								UKUP.	184	40	61	24	61	41	411	26,4	110,2	86,3	29,6
				vetra. srednje negovana sastojina. Stabla graba su kriva i sa velikim																			
				padom precnika (mala punodrvnost), sa dugim krošnjama (dužine izmedu 1/2																			
				i 2/3 visine stabala) i preširokim krošnjama, do 10% oštecenih stabala od																			
				vetra, snega i leda, zdravstveno stanje stabala ove vrste drveca je																			
				dobro. Stabla srebrna lipa su zakrivljena i sa srednjim padom precnika																			
				(srednja punodrvnost), sa srednje dugim krošnjama (dužine izmedu 1/3 i																			
				1/2 visine stabala) i ekscentricnim krošnjama, do 10% oštecenih stabala																			
				od vetra, snega i leda, zdravstveno stanje stabala ove vrste drveca je																			
				dobro. Stabla kitnjaka su zakrivljena i sa srednjim padom precnika																			
				(srednja punodrvnost), sa srednje dugim krošnjama (dužine izmedu 1/3 i																			
				1/2 visine stabala) i normalno razvijenim krošnjama, od 11-25% oštecenih																			
				stabala od insekata, od 11-25% oštecenih stabala od fitopatoloških																			
				obolenja, suvih i suhovrhih stabala ima do 10%, zdravstveno stanje																			
6	e	59288144	2,16	stabala ove vrste drveca je osrednje.																			

Ozn.mesta		gazdi-	površ-	OPIS	Osnovni taksacioni elementi						visi	deb.	Broj stabla po hektaru							G	Zapremina po		
ode-	od-	nska	ina		vrsta	sme	obr	sta-	sred.stablo		nski			Vrsta drveta						po		Vrsta drv	
ljenje	sek	klasa	ha		drveća	sa	ast	rost	Ds	Hs	step.	st.	1	2	3	4	5	6	svg.	ha	1	2	3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
				Šuma - nalazi se u uvali i na strmom terenu (nagiba od 11° do 15°) -	1. SrLip	0,5		119	22	14,6	8	7,5	93			17	9	21	140	0,6	1,6		
				nagib valovit. Nadmorska visina 285 do 325m. Ekspozicija 1 južna. Mrtvi	2. Kit	0,2			37	20,3	11	12,5	31			14	4	14	62	0,8	1,9		
				pokrivac srednje zastupljen - povoljan proces humifikacije. Retka	3. Cer	0,1			70	25,1	10	17,5	27	10		8			44	1,1	4,9	1,6	
				prizemna vegetacija. Retko žbunje. Srednja zakorovljenost. tip šume bukve	4. Gr				16	12,0	10	22,5	32			4	9		45	1,8	9,6		
				i kitnjaka (Querco-Fagetum typicum) na gajnjaci do lesiviranoj gajnjaci i	5. Cjas	0,1			21	14,7	10	27,5	8			12	13		33	2,0	3,5		
				eutricnim smedim do lesiviranim eutricnim smedjim zemljištima..	6. OTL				14	11,2	11	32,5	21	9			4	10	44	3,7	16,7	8,7	
												37,5	41						41	4,5	40,5		
				Izdanacka mešovita šuma lipa (izdanacka šuma lipa i kitnjaka) -								42,5	25	4					29	4,1	35,2	5,3	
				jednodobna (u fazi razgradnje). Ocuvana sastojina. Mešovita sastojina								47,5	8	8					15	2,7	14,5	14,4	
				(smeša stablimicna) nepotpunog sklopa (0.5-0.6). u celini zdravstveno								52,5		9					9	2,0		22,5	
				stanje sastojine je osrednje. po kvalitetu malo vredna sastojina (ima do								67,5			4				4	1,4			15,2
				20% tehnickog drveta). Srednja ugroženost od insekata. Mala ugroženost od								72,5			4				4	1,6			17,6
				vetra. srednje negovana sastojina. Stabla srebrna lipa su zakrivljena i								UKUP.	285	40	8	55	40	44	472	26,3	128,5	52,5	32,8
				sa srednjim padom precnika (srednja punodrvnost), sa srednje dugim																			
				krošnjama (dužine izmedu 1/3 i 1/2 visine stabala) i normalno razvijenim																			
				krošnjama, do 10% oštecenih stabala od vetra, snega i leda, zdravstveno																			
				stanje stabala ove vrste drveca je dobro. Stabla kitnjaka su zakrivljena																			
				i sa srednjim padom precnika (srednja punodrvnost), sa srednje dugim																			
				krošnjama (dužine izmedu 1/3 i 1/2 visine stabala) i normalno razvijenim																			
				krošnjama, do 10% oštecenih stabala od vetra, snega i leda, do 10%																			
				oštecenih stabala od insekata i fitopatoloških obolenja, zdravstveno																			
6	f	59288601	2,69	stanje stabala ove vrste drveca je osrednje.																			
				Šuma - nalazi se na strani i na strmom terenu (nagiba od 11° do 15°) -	1. SrLip	0,5		119	13	11,7	8	7,5	412			117	32	37	598	2,6	9,4		
				nagib valovit. Nadmorska visina 300 do 390m. Ekspozicija 1 jugozapadna.	2. Kit	0,4			28	17,3	11	12,5	170	10		24			204	2,5	13,8	1,0	
				Mrtvi pokrivac slabo zastupljen - povoljan proces humifikacije. Srednje	3. Cer	0,1			36	19,0	10	17,5	67	10		10			87	2,1	11,7	1,4	
				gusta prizemna vegetacija. Srednje gusto žbunje. Srednja zakorovljenost.	4. Cjas				10	9,3	11	22,5	61	40		15	21		137	5,4	19,3	12,7	
				tip šume razlicitih hrastova sa crnim jasenom (Orno-Polyquercetum) na	5. OTL				15	12,3	11	27,5	21	15	5		5		47	2,8	10,4	8,3	3,6
				slabo razvijenim zemljištima na krecnjacima i bazicnim silikatnim	6. Gr				8	7,0	11	32,5	21	37	5				63	5,2	15,2	29,5	4,4
				stenama..								37,5	16	16					32	3,5	17,1	18,3	
												42,5	11	11					21	3,0	14,6	18,0	
				Izdanacka mešovita šuma lipa (izdanacka šuma lipa i kitnjaka) -								47,5	5		5				10	1,8	9,3		8,6
				jednodobna (u fazi razgradnje). Ocuvana sastojina. Mešovita sastojina								UKUP.	785	138	15	166	58	37	1198	29,0	120,9	89,2	16,5
				(smeša stablimicna) gustog sklopa (0.8 - 0.9). u celini zdravstveno																			
				stanje sastojine je osrednje. po kvalitetu sastojina bez vrednosti (bez																			
				ucešca tehnickog drveta). Srednja ugroženost od insekata. Srednja																			
				ugroženost od fitopatoloških oboljenja-oboljenja kore. srednje negovana																			
				sastojina. Stabla srebrna lipa su zakrivljena i sa srednjim padom																			
				precnika (srednja punodrvnost), sa srednje dugim krošnjama (dužine izmedu																			
				1/3 i 1/2 visine stabala) i ekscentricnim krošnjama, zdravstveno stanje																			
				stabala ove vrste drveca je dobro. Stabla kitnjaka su zakrivljena i sa																			
				srednjim padom precnika (srednja punodrvnost), sa srednje dugim krošnjama																			
				(dužine izmedu 1/3 i 1/2 visine stabala) i normalno razvijenim krošnjama,																			
				do 10% oštecenih stabala od insekata, do 10% oštecenih stabala od																			
				fitopatoloških obolenja, zdravstveno stanje stabala ove vrste drveca je																			
6	g	59288371	5,15	osrednje.																			
				Šuma - nalazi se na strani i na srednje strmom terenu (nagiba od 6° do	1. Kit	0,6		119	37	19,2	11	7,5		343	16	16	37	38	450	2,0		7,4	0,3
				10°) - nagib ujednacen. Nadmorska visina 310 do 400m. Ekspozicija 1	2. SrLip	0,4			14	11,6	9	12,5		133	11				143	1,8		8,5	1,0
				zapadna. Mrtvi pokrivac srednje zastupljen - povoljan proces	3. OTL				13	10,4	11	17,5		59		5			64	1,5		9,7	

ОПИС СТАНИШТА И САСТОЈИНА

Ozn.mesta		gazdi-	površ-	OPIS	Osnovni taksacioni elementi						visi	deb.	Broj stabala po hektaru							G	Zapremina po		
ode-	od-	nska	ina		vrsta	sme	obr	sta-	sred.stablo		nski			Vrsta drveta						po		Vrsta drv	
ljenje	sek	klasa	ha		drveća	sa	ast	rost	Ds	Hs	step.	st.	1	2	3	4	5	6	svg.	ha	1	2	3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
				humifikacije. Retka prizemna vegetacija. Gusto žbunje. Srednja					10	8,1	11	22,5		11	11				22	0,9		3,3	3,4
				zakorovljenost. tip šume kitnjaka (Quercetum montanum cariecetosum	5. Gr				8	6,1	11	27,5	11	26					37	2,2	5,7	12,4	
				pilosae) na gajnjaci do lesiviranoj gajnjaci..	6. Mle				8	6,1	11	32,5	58	21					79	6,5	46,2	16,3	
												37,5	53	22					75	8,3	61,2	20,6	
				Izdanacka mešovita šuma kitnjaka (izdanacka šuma kitnjaka i lipe) -								42,5	16	16					32	4,5	24,2	22,0	
				jednodobna (u fazi razgradnje). Ocuvana sastojina. Mešovita sastojina								47,5	16						16	2,8	31,0		
				(smeša stablimicna) gustog sklopa (0.8 - 0.9). u celini zdravstveno								52,5	5	5					11	2,3	13,5	12,7	
				stanje sastojine je osrednje. po kvalitetu malo vredna sastojina (ima do								UKUP.	159	635	38	22	37	38	927	32,8	181,8	113,0	4,7
				20% tehnickog drveta). Srednja ugroženost od insekata. Srednja ugroženost																			
				od fitopatoloških oboljenja-oboljenja kore. srednje negovana sastojina.																			
				Stabla srebrna lipa su zakrivljena i sa srednjim padom precnika (srednja																			
				punodrvnost), sa srednje dugim krošnjama (dužine izmedu 1/3 i 1/2 visine																			
				stabala) i ekscentricnim krošnjama, zdravstveno stanje stabala ove vrste																			
				drveca je dobro. Stabla kitnjaka su zakrivljena i sa srednjim padom																			
				precnika (srednja punodrvnost), sa srednje dugim krošnjama (dužine izmedu																			
				1/3 i 1/2 visine stabala) i normalno razvijenim krošnjama, do 10%																			
				oštecenih stabala od insekata, do 10% oštecenih stabala od fitopatoloških																			
6	h	59307484	5,87	obolenja, zdravstveno stanje stabala ove vrste drveca je osrednje.																			
				Put.																			
6	1	59	0,35																				

Ozn.mesta		gazdi-	površ-	OPIS	Osnovni taksacioni elementi						visi	deb.	Broj stabala po hektaru							G	Zapremina po		
ode-	od-	nska	ina		vrsta	sme	obr	sta-	sred.stablo		nski			Vrsta drveta						po		Vrsta drv	
ljenje	sek	klasa	ha		drveća	sa	ast	rost	Ds	Hs	step.	st.	1	2	3	4	5	6	svg.	ha	1	2	3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
				Šuma - nalazi se na strani i na srednje strmom terenu (nagiba od 6° do	1. Kit	0,4		74	28	20,5	8	7,5		114	21	41	11	21	209	0,9		2,3	0,4
				10°) - nagib ujednacen. Nadmorska visina 285 do 330m. Ekspozicija 1	2. SrLip	0,4			18	14,9	5	12,5		17			48		64	0,8		1,4	
				jugozapadna. Mrtvi pokrivac srednje zastupljen - povoljan proces	3. OTL	0,2			23	18,7	8	17,5	11	34	12	23	24	5	109	2,6	1,6	5,4	2,0
				humifikacije. Srednje gusta prizemna vegetacija. Srednje gusto žbunje.	4. Gr				14	13,6	8	22,5	54	27	12			12	106	4,2	23,2	9,6	3,5
				Nema zakorovljenosti. tip šume kitnjaka (Quercetum montanum cariecetosum	5. Klen				13	13,3	8	27,5	10	34	12	12			68	4,1	4,9	20,3	6,0
				pilosae) na gajnjaci do lesiviranoj gajnjaci..	6. Cjas				14	13,5	8	32,5	38	11					49	4,1	33,6	9,0	
												37,5	12	11					23	2,5	14,0	11,9	
				Izdanacka mešovita šuma kitnjaka (izdanacka šuma kitnjaka i lipe) -								42,5	12	11	12				36	5,0	20,3	17,0	21,5
				jednodobna (u optimalnoj fazi). Ocuvana sastojina. Mešovita sastojina								47,5		11	5				16	2,9		23,1	11,9
				(smeša stablimicna) vrlo gustog sklopa (1.0). u celini zdravstveno stanje								UKUP.	137	271	75	75	83	39	680	27,1	97,5	100,0	45,2
				sastojine je osrednje. po kvalitetu malo vredna sastojina (ima do 20%																			
				tehnickog drveta). Srednja ugroženost od insekata. Srednja ugroženost od																			
				fitopatoloških oboljenja-oboljenja lista. srednje negovana sastojina.																			
				Stabla srebrna lipa su zakrivljena i sa srednjim padom precnika (srednja																			
				punodrvnost), sa srednje dugim krošnjama (dužine izmedu 1/3 i 1/2 visine																			
				stabala) i ekscentricnim krošnjama, zdravstveno stanje stabala ove vrste																			
				drveca je dobro. Stabla kitnjaka su zakrivljena i sa srednjim padom																			
				precnika (srednja punodrvnost), sa srednje dugim krošnjama (dužine izmedu																			
				1/3 i 1/2 visine stabala) i normalno razvijenim krošnjama, do 10%																			
				oštecenih stabala od insekata i fitopatoloških obolenja, suvih i																			
				suhovrhih stabala ima do 10%, zdravstveno stanje stabala ove vrste																			
7	a	59307484	1,85	drveca je osrednje.																			
				Šuma - nalazi se u uvali i na blago nagnutom terenu (nagiba do 5°) -	1. SrLip	0,5		74	25	17,2	10	7,5	78		76	9	11		174	0,8	1,1		1,6
				nagib valovit. Nadmorska visina 265 do 300m. Ekspozicija 1 jugoistocna.	2. Kit	0,2			36	19,2	11	12,5	13		60	2		2	78	1,0	1,1		5,4
				Mrtvi pokrivac srednje zastupljen - povoljan proces humifikacije. Srednje	3. Gr	0,2			17	13,2	10	17,5	11	2	60				73	1,7	1,5	0,4	11,7
				gusta prizemna vegetacija. Srednje gusto žbunje. Nema zakorovljenosti.	4. Bk				20	14,4	14	22,5	6	10	68		6	5	93	3,7	1,3	3,0	23,3
				tip šume lužnjaka, graba i cera sa lipama u dolinama vecih nadmorskih	5. OTL				22	15,1	11	27,5	20	10	48				78	4,6	9,4	5,1	23,1
				visina (Tilio-Carpino-Quercetum robori-cerris collinum) na delivijumu..	6. Klen				19	14,2	11	32,5	45	6	6	2			58	4,8	31,9	3,7	4,7
												37,5	55	13	6	2			76	8,4	56,3	13,7	5,6
				Izdanacka mešovita šuma lipa - jednodobna (u optimalnoj fazi). Ocuvana								42,5	16	15					32	4,5	20,5	23,6	
				sastojina. Mešovita sastojina (smeša stablimicna) gustog sklopa (0.8 -								47,5	10	8		2	6		26	4,5	17,3	13,8	
				0.9). u celini zdravstveno stanje sastojine je osrednje. po kvalitetu								52,5	6	6					11	2,4	11,0	13,6	
				malo vredna sastojina (ima do 20% tehnickog drveta). Srednja ugroženost								UKUP.	260	69	323	17	21	7	697	36,3	151,4	77,0	75,4
				od insekata. Srednja ugroženost od vetra. srednje negovana sastojina.																			
				Stabla graba su zakrivljena i sa malim padom precnika (velika																			
				punodrvnost), sa dugim krošnjama (dužine izmedu 1/2 i 2/3 visine stabala)																			
				i preširokim krošnjama, do 10% oštecenih stabala od vetra, snega i leda,																			
				zdravstveno stanje stabala ove vrste drveca je dobro. Stabla srebrna lipa																			
				su zakrivljena i sa srednjim padom precnika (srednja punodrvnost), sa																			
				srednje dugim krošnjama (dužine izmedu 1/3 i 1/2 visine stabala) i																			
				ekscentricnim krošnjama, do 10% oštecenih stabala od vetra, snega i leda,																			
				suvih i suhovrhih stabala ima do 10%, zdravstveno stanje stabala ove																			
				vrste drveca je dobro. Stabla kitnjaka su zakrivljena i sa srednjim padom																			
				precnika (srednja punodrvnost), sa srednje dugim krošnjama (dužine izmedu																			
				1/3 i 1/2 visine stabala) i normalno razvijenim krošnjama, do 10%																			
				oštecenih stabala od vetra, snega i leda, do 10% oštecenih stabala od																			
				insekata i fitopatoloških obolenja, suvih i suhovrhih stabala ima do 10%,																			
7	b	59288144	5,00	zdravstveno stanje stabala ove vrste drveca je osrednje.																			

ОПИС СТАНИШТА И САСТОЈИНА

Ozn.mesta		gazdi-	površ-	OPIS	Osnovni taksacioni elementi						visi	deb.	Broj stabala po hektaru							G	Zapremina po		
ode-	od-	nska	ina		vrsta	sme	obr	sta-	sred.stablo		nski			Vrsta drveta						po		Vrsta drv	
ljenje	sek	klasa	ha		drveća	sa	ast	rost	Ds	Hs	step.	st.	1	2	3	4	5	6	svg.	ha	1	2	3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
				Šuma - nalazi se na strani i na srednje strmom terenu (nagiba od 6° do	1. SrLip	0,4		75	21	16,5	8	7,5	114		49	114		17	293	1,3	1,7		0,6
				10°) - nagib ujednacen. Nadmorska visina 275 do 300m. Ekspozicija 1	2. Kit	0,3			33	19,4	11	12,5	17			65	16		98	1,2	0,9		
				istocna. Mrtvi pokrivac obilno zastupljen (tanak sloj) - povoljan proces	3. OTL	0,2			22	16,8	11	17,5				82	17		98	2,4			
				humifikacije. Gusta prizemna vegetacija. Srednje gusto žbunje. Nema	4. Gr	0,1			14	13,2	10	22,5	33	33		33			98	3,9	12,0	11,5	
				zakorovljenosti. tip šume lužnjaka, graba i cera sa lipama u dolinama	5. Klen				15	13,8	10	27,5	33			17			49	2,9	19,0		
				vecih nadmorskih visina (Tilio-Carpino-Quercetum robori-cerris collinum)	6. Cjas				8	8,3	10	32,5	16	33					49	4,1	10,7	25,1	
				na delivijumu..								37,5	82		16				98	10,8	90,4		18,2
												42,5		17					17	2,3		28,1	
				Izdanacka mešovita šuma lipa (izdanacka šuma lipa i kitnjaka) -								47,5		16					16	2,9		30,5	
				jednodobna (u optimalnoj fazi). Ocuvana sastojina. Mešovita sastojina								52,5			16				16	3,5			43,8
				(smeša stablimicna) gustog sklopa (0.8 - 0.9). u celini zdravstveno								UKUP.	294	98	81	310	33	17	833	35,3	134,7	95,3	62,5
				stanje sastojine je osrednje. po kvalitetu malo vredna sastojina (ima do																			
				20% tehnickog drveta). Srednja ugroženost od insekata. Srednja ugroženost																			
				od vetra. srednje negovana sastojina. Stabla srebrna lipa su zakrivljena																			
				i sa srednjim padom precnika (srednja punodrvnost), sa srednje dugim																			
				krošnjama (dužine izmedu 1/3 i 1/2 visine stabala) i ekscentricnim																			
				krošnjama, do 10% oštecenih stabala od vetra, snega i leda, suvih i																			
				suhovrhih stabala ima do 10%, zdravstveno stanje stabala ove vrste																			
				drveca je dobro. Stabla kitnjaka su zakrivljena i sa srednjim padom																			
				precnika (srednja punodrvnost), sa srednje dugim krošnjama (dužine izmedu																			
				1/3 i 1/2 visine stabala) i normalno razvijenim krošnjama, do 10%																			
				oštecenih stabala od vetra, snega i leda, do 10% oštecenih stabala od																			
				insekata i fitopatoloških obolenja, suvih i suhovrhih stabala ima do 10%,																			
7	c	59288144	0,76	zdravstveno stanje stabala ove vrste drveca je osrednje.																			

ОПИС СТАНИШТА И САСТОЈИНА

Ozn.mesta		gazdi-	površ-	OPIS	Osnovni taksacioni elementi						visi	deb.	Broj stabala po hektaru							G	Zapremina po		
ode-	od-	nska	ina		vrsta	sme	obr	sta-	sred.stablo		nski			Vrsta drveta						po		Vrsta drv	
ljenje	sek	klasa	ha		drveća	sa	ast	rost	Ds	Hs	step.	st.	1	2	3	4	5	6	svg.	ha	1	2	3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
				Šuma - nalazi se na strani i na blago nagnutom terenu (nagiba do 5°) -	1. SrLip	0,5		84	25	16,7	7	7,5	79		34	85	8	5	211	0,9	1,5		1,0
				nagib ujednacen. Nadmorska visina 270 do 330m. Ekspozicija 1 zapadna.	2. Kit	0,2			35	21,9	9	12,5	12		24	13		4	53	0,6	1,3		2,4
				Mrtvi pokrivac srednje zastupljen - povoljan proces humifikacije. Srednje	3. Gr	0,1			17	12,0	9	17,5	29		29	5	2	6	72	1,7	5,2		5,6
				gusta prizemna vegetacija. Srednje gusto žbunje. Nema zakorovljenosti.	4. Bk	0,1			14	10,7	12	22,5	12		12			5	29	1,2	4,0		4,1
				tip šuma kitnjaka i graba sa lazarkinjom (Querco - Carpinetum	5. OTL				25	17,6	9	27,5	25	13	22	5			65	3,9	14,4	8,2	11,7
				asperulosum) na gajnjaci do lesiviranoj gajnjaci i lesiviranom smedem	6. Klen				15	11,5	9	32,5	25	25	2				52	4,3	19,8	21,5	1,9
				zemljištu na serpentinitu ..								37,5	42	8	4	5			60	6,6	48,3	10,7	4,5
												42,5	34	4					38	5,4	49,8	6,6	
				Izdanacka mešovita šuma lipa (izdanacka šuma lipa i kitnjaka) -								47,5	15	2		11			28	5,0	29,4	4,8	
				jednodobna (u optimalnoj fazi). Ocuvana sastojina. Mešovita sastojina								52,5		6			6		11	2,4		15,1	
				(smeša stablimicna) gustog sklopa (0.8 - 0.9). u celini zdravstveno								UKUP.	273	57	126	125	15	21	617	31,9	173,7	66,8	31,2
				stanje sastojine je osrednje. po kvalitetu malo vredna sastojina (ima do																			
				20% tehnickog drveta). Srednja ugroženost od insekata. Srednja ugroženost																			
				od fitopatoloških oboljenja-oboljenja lista. srednje negovana sastojina.																			
				Stabla graba su zakrivljena i sa srednjim padom precnika (srednja																			
				punodrvnost), sa srednje dugim krošnjama (dužine izmedu 1/3 i 1/2 visine																			
				stabala), zdravstveno stanje stabala ove vrste drveca je dobro. Stabla																			
				srebrna lipa su zakrivljena i sa srednjim padom precnika (srednja																			
				punodrvnost), sa srednje dugim krošnjama (dužine izmedu 1/3 i 1/2 visine																			
				stabala) i ekscentricnim krošnjama, zdravstveno stanje stabala ove vrste																			
				drveca je dobro. Stabla kitnjaka su zakrivljena i sa srednjim padom																			
				precnika (srednja punodrvnost), sa srednje dugim krošnjama (dužine izmedu																			
				1/3 i 1/2 visine stabala) i normalno razvijenim krošnjama, do 10%																			
				oštecenih stabala od insekata i fitopatoloških obolenja, suvih i																			
				suhovrhih stabala ima do 10%, zdravstveno stanje stabala ove vrste																			
7	d	59288261	6,11	drveca je osrednje.																			
				Šuma - nalazi se na strani i na strmom terenu (nagiba od 11° do 15°) -	1. SrLip	0,6		74	13	10,4	8	7,5	605	46	185				836	3,7	15,6	0,6	3,0
				nagib ujednacen. Nadmorska visina 320 do 335m. Ekspozicija 1 zapadna.	2. Jav	0,2			19	14,4	10	12,5	94		46				140	1,7	5,7		3,8
				Mrtvi pokrivac srednje zastupljen - povoljan proces humifikacije. Gusta	3. Cjas	0,1			11	9,5	10	17,5	47		93				140	3,4	10,6		17,1
				prizemna vegetacija. Retko žbunje. Nema zakorovljenosti. tip šume	4. Cer	0,1			28	17,6	9	22,5	94	46					140	5,6	31,4	18,7	
				razlicitih hrastova sa crnim jasenom (Orno-Polyquercetum) na slabo								27,5	141	46		46			233	13,8	72,3	27,5	
				razvijenim zemljištima na krecnjacima i bazicnim silikatnim stenama..								UKUP.	981	138	324	46			1489	28,2	135,6	46,9	23,9
				Izdanacka mešovita šuma lipa - jednodobna (u optimalnoj fazi). Ocuvana																			
				sastojina. Mešovita sastojina (smeša stablimicna) gustog sklopa (0.8 -																			
				0.9). u celini zdravstveno stanje sastojine je osrednje. po kvalitetu																			
				malo vredna sastojina (ima do 20% tehnickog drveta). Srednja ugroženost																			
				od insekata. Srednja ugroženost od fitopatoloških oboljenja-oboljenja																			
				lista. srednje negovana sastojina. Stabla srebrna lipa su zakrivljena i																			
				sa srednjim padom precnika (srednja punodrvnost), sa srednje dugim																			
				krošnjama (dužine izmedu 1/3 i 1/2 visine stabala) i ekscentricnim																			
				krošnjama, do 10% oštecenih stabala od insekata, zdravstveno stanje																			
7	e	59288371	0,38	stabala ove vrste drveca je dobro.																			
				Šuma - nalazi se na strani i na srednje strmom terenu (nagiba od 6° do	1. Kit	0,8		84	35	21,5	9	7,5		231	93	27	49	27	428	1,9		6,1	1,7
				10°) - nagib ujednacen. Nadmorska visina 275 do 335m. Ekspozicija 1	2. SrLip	0,2			12	10,8	6	12,5		71		6			77	0,9		5,9	
				zapadna. Mrtvi pokrivac srednje zastupljen - povoljan proces	3. Gr				9	8,8	9	17,5		22	11	6			38	0,9		4,1	2,1
				humifikacije. Srednje gusta prizemna vegetacija. Srednje gusto žbunje.	4. OTL				10	9,1	9	22,5	16	5	6				27	1,1	6,3	2,3	2,0
				Nema zakorovljenosti. tip šume kitnjaka (Quercetum montanum cariecetosum	5. Cjas				8	7,0	9	27,5	11	6					16	1,0	6,0	3,3	

ОПИС СТАНИШТА И САСТОЈИНА

Ozn.mesta		gazdi-	površ-	OPIS	Osnovni taksacioni elementi						visi	deb.	Broj stabala po hektaru							G	Zapremina po		
ode-	od-	nska	ina		vrsta	sme	obr	sta-	sred.stablo		nski			Vrsta drveta						po		Vrsta drv	
ljenje	sek	klasa	ha		drveća	sa	ast	rost	Ds	Hs	step.	st.	1	2	3	4	5	6	svg.	ha	1	2	3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
				pilosae) na gajnjaci do lesiviranoj gajnjaci..	6. Klen				8	7,0	9	32,5	66	6					71	5,9	58,7	4,2	
												37,5	88	11					99	10,9	109,5	13,4	
				Izdanacka mešovita šuma kitnjaka - jednodobna (u optimalnoj fazi).								42,5	44						44	6,2	70,2		
				Ocuvana sastojina. Mešovita sastojina (smeša stablimicna) vrlo gustog								47,5		6					6	1,0		11,3	
				sklopa (1.0). u celini zdravstveno stanje sastojine je osrednje. po								UKUP.	225	357	109	38	49	27	806	29,8	250,6	50,6	5,8
				kvalitetu malo vredna sastojina (ima do 20% tehnickog drveta). Srednja																			
				ugroženost od insekata. Srednja ugroženost od fitopatoloških																			
				oboljenja-oboljenja lista. srednje negovana sastojina. Stabla srebrna																			
				lipa su zakrivljena i sa srednjim padom precnika (srednja punodrvnost),																			
				sa srednje dugim krošnjama (dužine izmedu 1/3 i 1/2 visine stabala) i																			
				ekscentricnim krošnjama, zdravstveno stanje stabala ove vrste drveca je																			
				dobro. Stabla kitnjaka su zakrivljena i sa srednjim padom precnika																			
				(srednja punodrvnost), sa srednje dugim krošnjama (dužine izmedu 1/3 i																			
				1/2 visine stabala) i normalno razvijenim krošnjama, do 10% oštecenih																			
				stabala od insekata i fitopatoloških obolenja, suvih i suhovrhih stabala																			
7	f	59307484	11,09	ima do 10%, zdravstveno stanje stabala ove vrste drveca je osrednje.																			

Ozn.mesta		gazdi-	površ-	OPIS	Osnovni taksacioni elementi						visi	deb.	Broj stabla po hektaru							G	Zapremina po		
ode-	od-	nska	ina		vrsta	sme	obr	sta-	sred.stablo		nski			Vrsta drveta						po		Vrsta drv	
ljenje	sek	klasa	ha		drveća	sa	ast	rost	Ds	Hs	step.	st.	1	2	3	4	5	6	svg.	ha	1	2	3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
				Šuma - nalazi se na strani i na srednje strmom terenu (nagiba od 6° do	1. SrLip	0,4		84	21	14,7	7	7,5	107		131	25	28	18	308	1,4	2,0		3,7
				10°) - nagib ujednacen. Nadmorska visina 270 do 300m. Ekspozicija 1	2. Kit	0,5			34	21,3	9	12,5	24		33	8			66	0,8	1,7		2,7
				zapadna. Mrtvi pokrivac srednje zastupljen - povoljan proces	3. Gr	0,1			13	9,1	9	17,5	24		28				52	1,3	4,7		4,5
				humifikacije. Gusta prizemna vegetacija. Srednje gusto žbunje. Nema	4. Cjas				9	5,4	9	22,5	17	33	10				59	2,3	4,4	12,9	3,0
				zakorovljenosti. tip šuma kitnjaka i graba sa lazarkinjom (Querco -	5. OTL				8	4,4	9	27,5	15	8	8				31	1,8	8,2	5,0	4,3
				Carpinetum asperulosum) na gajnjaci do lesiviranoj gajnjaci i lesiviranom	6. PBr				8	4,4	9	32,5	43	57	12				111	9,2	32,6	52,6	9,5
				smedem zemljištu na serpentinitu ..								37,5	30	36					66	7,3	35,5	46,0	
												42,5	18	25	8				51	7,2	27,0	38,6	11,9
				Izdanacka mešovita šuma kitnjaka (izdanacka šuma kitnjaka i lipe) -								47,5	12	8					20	3,5	20,2	16,3	
				jednodobna (u optimalnoj fazi). Ocuvana sastojina. Mešovita sastojina								UKUP.	289	167	230	33	28	18	764	34,8	136,3	171,4	39,8
				(smeša stablimicna) gustog sklopa (0.8 - 0.9). u celini zdravstveno																			
				stanje sastojine je dobro. po kvalitetu malo vredna sastojina (ima do 20%																			
				tehnickog drveta). Srednja ugroženost od insekata. Srednja ugroženost od																			
				fitopatoloških oboljenja-oboljenja lista. srednje negovana sastojina.																			
				Stabla graba su zakrivljena i sa velikim padom precnika (mala																			
				punodrvnost), sa dugim krošnjama (dužine izmedu 1/2 i 2/3 visine stabala)																			
				i preširokim krošnjama, zdravstveno stanje stabala ove vrste drveca je																			
				dobro. Stabla srebrna lipa su zakrivljena i sa srednjim padom precnika																			
				(srednja punodrvnost), sa srednje dugim krošnjama (dužine izmedu 1/3 i																			
				1/2 visine stabala) i ekscentricnim krošnjama, zdravstveno stanje																			
				stabala ove vrste drveca je dobro. Stabla kitnjaka su zakrivljena i sa																			
				srednjim padom precnika (srednja punodrvnost), sa srednje dugim krošnjama																			
				(dužine izmedu 1/3 i 1/2 visine stabala) i normalno razvijenim krošnjama,																			
				do 10% oštecenih stabala od insekata i fitopatoloških obolenja, suvih i																			
				suhovrhih stabala ima do 10%, zdravstveno stanje stabala ove vrste																			
7	g	59307261	2,23	drveca je dobro.																			
				Put.																			
7	1	59	0,37																				
				Šuma - nalazi se na strani i na srednje strmom terenu (nagiba od 6° do	1. SrLip	0,3		99	17	14,4	8	7,5	139			46	59	50	293	1,3	3,5		
				10°) - nagib ujednacen. Nadmorska visina 260 do 290m. Ekspozicija 1	2. Kit	0,3			32	19,0	10	12,5	10			29		9	48	0,6	0,9		
				južna. Ne postoji ugroženost od erozije - stablian teren u prirodnim	3. Cer	0,4			45	20,6	10	17,5	4	10					14	0,3	0,6	2,2	
				uslovima. Mrtvi pokrivac srednje zastupljen - povoljan proces	4. OTL				9	10,5	11	22,5		10			10		19	0,8		3,2	
				humifikacije. Srednje gusta prizemna vegetacija. Srednje gusto žbunje.	5. Gr				10	10,6	11	27,5	10	10					20	1,2	5,5	4,4	
				Slaba zakorovljenost. tip šume kitnjaka (Quercetum montanum cariecetosum	6. Cjas				8	9,5	11	32,5	8	42	9				59	4,9	6,3	31,8	8,1
				pilosae) na gajnjaci do lesiviranoj gajnjaci..								37,5	14	47	9				69	7,7	12,7	54,2	12,0
												42,5	10		28				37	5,3	12,3		40,3
				Izdanacka mešovita šuma cera (izdanacka šuma cera i kitnjaka) -								47,5	23		9				33	5,8	42,4		18,1
				jednodobna (u fazi razgradnje). Ocuvana sastojina. Mešovita sastojina								67,5			10				10	3,5			37,4
				(smeša stablimicna) gustog sklopa (0.8 - 0.9). u celini zdravstveno								UKUP.	217	118	65	75	68	59	602	31,2	84,2	95,8	115,9
				stanje sastojine je dobro. po kvalitetu malo vredna sastojina (ima do 20%																			
				tehnickog drveta). Srednja ugroženost od insekata. Srednja ugroženost od																			
				fitopatoloških oboljenja-oboljenja kore. srednje negovana sastojina.																			
				Stabla srebrna lipa su zakrivljena i sa srednjim padom precnika (srednja																			
				punodrvnost), sa srednje dugim krošnjama (dužine izmedu 1/3 i 1/2 visine																			
				stabala) i ekscentricnim krošnjama, zdravstveno stanje stabala ove vrste																			
				drveca je dobro. Stabla kitnjaka su zakrivljena i sa srednjim padom																			

ОПИС СТАНИШТА И САСТОЈИНА

Ozn.mesta		gazdi-	površ-	OPIS	Osnovni taksacioni elementi						visi	deb.	Broj stabala po hektaru							G	Zapremina po		
ode-	od-	nska	ina		vrsta	sme	obr	sta-	sred.stablo		nski			Vrsta drveta						po		Vrsta drv	
ljenje	sek	klasa	ha		drveća	sa	ast	rost	Ds	Hs	step.	st.	1	2	3	4	5	6	svg.	ha	1	2	3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
				precnika (srednja punodrvnost), sa srednje dugim krošnjama (dužine izmedu																			
				1/3 i 1/2 visine stabala) i normalno razvijenim krošnjama, do 10%																			
				oštecenih stabala od insekata, do 10% oštecenih stabala od fitopatoloških																			
				obolenja, suvih i suhovrhih stabala ima do 10%, zdravstveno stanje																			
8	a	59196484	2,55	stabala ove vrste drveca je dobro.																			

Ozn.mesta		gazdi-	površ-	OPIS	Osnovni taksacioni elementi						visi	deb.	Broj stabala po hektaru							G	Zapremina po		
ode-	od-	nska	ina		vrsta	sme	obr	sta-	sred.stablo		nski			Vrsta drveta						po		Vrsta drv	
ljenje	sek	klasa	ha		drveća	sa	ast	rost	Ds	Hs	step.	st.	1	2	3	4	5	6	svg.	ha	1	2	3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
				Šuma - nalazi se u uvali i na blago nagnutom terenu (nagiba do 5°) -	1. Gr	0,3		99	18	16,0	7	7,5	53	2	68		19	7	148	0,7	1,1		1,8
				nagib ujednacen. Nadmorska visina 250 do 285m. Ekspozicija 1 bez jasno	2. Kit	0,3			38	24,3	8	12,5	63		8			10	81	1,0	6,7		0,6
				izražene ekspozicije. Mrtvi pokrivac srednje zastupljen - povoljan proces	3. SrLip	0,2			19	16,7	5	17,5	58		2			15	75	1,8	11,5		0,5
				humifikacije. Srednje gusta prizemna vegetacija. Srednje gusto žbunje.	4. Cer	0,1			44	25,5	6	22,5	45		4		2	2	54	2,1	16,9		1,7
				Slaba zakorovljenost. tip šume lužnjaka, graba i cera sa lipama u	5. OTL	0,1			24	19,4	8	27,5	19	6	9				33	1,9	11,0	3,3	5,3
				dolinama vecih nadmorskih visina (Tilio-Carpino-Quercetum robori-cerris	6. Klen				16	14,9	7	32,5	15	11	14	6	7		53	4,4	14,1	10,0	13,4
				collinum) na delivijumu..								37,5	17	10	14		7	2	51	5,6	20,4	11,8	17,3
												42,5		12	4	6			22	3,1		20,6	7,0
				Izdanacka mešovita šuma graba (izdanacka šuma graba i kitnjaka) -								47,5		9	4	4			18	3,1		20,7	9,6
				jednodobna (u fazi razgradnje). Ocuvana sastojina. Mešovita sastojina								52,5		2			6		8	1,7		5,8	
				(smeša stablimicna) potpunog sklopa (0.7). u celini zdravstveno stanje								57,5		2					2	0,6		7,7	
				sastojine je dobro. po kvalitetu malo vredna sastojina (ima do 20%								67,5				2			2	0,8			
				tehnickog drveta). Srednja ugroženost od insekata. Srednja ugroženost od								UKUP.	270	54	128	18	40	36	545	26,7	81,7	79,9	57,2
				vetra. srednje negovana sastojina. Stabla srebrna lipa su zakrivljena i																			
				sa srednjim padom precnika (srednja punodrvnost), sa srednje dugim																			
				krošnjama (dužine izmedu 1/3 i 1/2 visine stabala) i ekscentricnim																			
				krošnjama, zdravstveno stanje stabala ove vrste drveca je dobro. Stabla																			
				kitnjaka su zakrivljena i sa srednjim padom precnika (srednja																			
				punodrvnost), sa srednje dugim krošnjama (dužine izmedu 1/3 i 1/2 visine																			
				stabala) i normalno razvijenim krošnjama, do 10% oštecenih stabala od																			
				insekata, do 10% oštecenih stabala od fitopatoloških obolenja, suvih i																			
				suhovrhih stabala ima do 10%, zdravstveno stanje stabala ove vrste																			
8	b	59176144	5,71	drveca je dobro.																			
				Šuma - nalazi se na strani i na blago nagnutom terenu (nagiba do 5°) -	1. SrLip	0,3		119	18	14,1	9	7,5	146	1	15	69	52	26	309	1,4	3,2		0,4
				nagib valovit. Nadmorska visina 260 do 330m. Ekspozicija 1 zapadna.	2. Kit	0,5			37	22,6	8	12,5	32		3	13	17	1	66	0,8	2,3		0,2
				Mrtvi pokrivac srednje zastupljen - povoljan proces humifikacije. Retka	3. OTL	0,2			29	18,7	10	17,5	15	4	6	1	6		32	0,8	2,3	0,8	0,9
				prizemna vegetacija. Gusto žbunje. Slaba zakorovljenost. tip šume	4. Gr				11	9,7	9	22,5	23	7	3	7	6		46	1,8	6,6	2,8	1,1
				kitnjaka (Quercetum montanum cariecetosum pilosae) na gajnjaci do	5. Klen				10	9,0	9	27,5	23	10					33	1,9	11,7	6,4	
				lesiviranoj gajnjaci..	6. Cjas				8	6,5	9	32,5	17	18	4	1			41	3,4	12,4	16,9	4,0
												37,5	27	31	9	4			71	7,8	26,6	40,3	10,7
				Izdanacka mešovita šuma kitnjaka (izdanacka šuma kitnjaka i lipe) -								42,5	24	22	3	1			49	7,0	32,1	37,0	5,0
				jednodobna (u fazi razgradnje). Ocuvana sastojina. Mešovita sastojina								47,5		15	6				21	3,7		33,0	13,0
				(smeša stablimicna) gustog sklopa (0.8 - 0.9). u celini zdravstveno								52,5	1	3	4				9	1,9	3,0	9,5	11,2
				stanje sastojine je dobro. po kvalitetu malo vredna sastojina (ima do 20%								57,5		3	3				6	1,6		9,9	10,8
				tehnickog drveta). Srednja ugroženost od insekata. Srednja ugroženost od								UKUP.	307	114	58	96	81	27	681	32,1	100,1	156,7	57,3
				fitopatoloških oboljenja-oboljenja kore. srednje negovana sastojina.																			
				Stabla srebrna lipa su zakrivljena i sa srednjim padom precnika (srednja																			
				punodrvnost), sa srednje dugim krošnjama (dužine izmedu 1/3 i 1/2 visine																			
				stabala) i ekscentricnim krošnjama, zdravstveno stanje stabala ove vrste																			
				drveca je dobro. Stabla kitnjaka su zakrivljena i sa srednjim padom																			
				precnika (srednja punodrvnost), sa srednje dugim krošnjama (dužine izmedu																			
				1/3 i 1/2 visine stabala) i normalno razvijenim krošnjama, do 10%																			
				oštecenih stabala od insekata, do 10% oštecenih stabala od fitopatoloških																			
				obolenja, suvih i suhovrhih stabala ima do 10%, zdravstveno stanje																			
8	c	59307484	20,12	stabala ove vrste drveca je dobro.																			
				Šuma - nalazi se u uvali i na blago nagnutom terenu (nagiba do 5°) -	1. SrLip	0,4		99	26	18,2	8	7,5	48		59		16	39	161	0,7	0,9		1,1
				nagib ujednacen. Nadmorska visina 280 do 305m. Ekspozicija 1 bez jasno	2. Kit	0,3			44	22,0	10	12,5	14		8			10	31	0,4	1,4		0,8
				izražene ekspozicije. Mrtvi pokrivac srednje zastupljen - povoljan proces	3. Gr	0,1			17	14,3	10	17,5	4		40				43	1,0	0,6		6,9

ОПИС СТАНИШТА И САСТОЈИНА

Ozn.mesta		gazdi-	površ-	OPIS	Osnovni taksacioni elementi						visi	deb.	Broj stabala po hektaru							G	Zapremina po		
ode-	od-	nska	ina		vrsta	sme	obr	sta-	sred.stablo		nski			Vrsta drveta						po		Vrsta drv	
ljenje	sek	klasa	ha		drveća	sa	ast	rost	Ds	Hs	step.	st.	1	2	3	4	5	6	svg.	ha	1	2	3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
				humifikacije. Srednje gusta prizemna vegetacija. Srednje gusto žbunje.	4. Cer	0,2			40	21,4	9	22,5	8		4				12	0,5	2,8		1,2
				Slaba zakorovljenost. tip šume lužnjaka, graba i cera sa lipama u	5. OTL				15	13,3	10	27,5	18		12	4	4		38	2,2	9,3		6,7
				dolinama vecih nadmorskih visina (Tilio-Carpino-Quercetum robori-cerris	6. Klen				9	8,4	10	32,5	18	4	8		4		34	2,8	14,1	2,8	7,2
				collinum) na delivijumu..								37,5	12	8	8	14			42	4,6	12,1	8,2	8,1
												42,5	12	8		4			24	3,4	15,9	12,7	
				Izdanacka mešovita šuma lipa (izdanacka šuma lipa i kitnjaka) -								47,5		27	4	10			41	7,3		57,0	6,7
				jednodobna (u fazi razgradnje). Ocuvana sastojina. Mešovita sastojina								52,5	8						8	1,7	19,4		
				(smeša stablimicna) gustog sklopa (0.8 - 0.9). u celini zdravstveno								57,5	12						12	3,1	32,2		
				stanje sastojine je dobro. po kvalitetu malo vredna sastojina (ima do 20%								62,5	4						4	1,2	12,2		
				tehnickog drveta). Srednja ugroženost od insekata. Srednja ugroženost od								UKUP.	156	47	142	32	24	49	449	28,9	120,9	80,7	38,7
				fitopatoloških oboljenja-oboljenja kore. srednje negovana sastojina.																			
				Stabla srebrna lipa su zakrivljena i sa srednjim padom precnika (srednja																			
				punodrvnost), sa srednje dugim krošnjama (dužine izmedu 1/3 i 1/2 visine																			
				stabala) i ekscentricnim krošnjama, zdravstveno stanje stabala ove vrste																			
				drveca je dobro. Stabla kitnjaka su zakrivljena i sa srednjim padom																			
				precnika (srednja punodrvnost), sa srednje dugim krošnjama (dužine izmedu																			
				1/3 i 1/2 visine stabala) i normalno razvijenim krošnjama, do 10%																			
				oštecenih stabala od insekata, do 10% oštecenih stabala od fitopatoloških																			
				obolenja, suvih i suhovrhih stabala ima do 10%, zdravstveno stanje																			
8	d	59288144	2,30	stabala ove vrste drveca je dobro.																			
				Put.																			
8	1	59	0,54																				

Ozn.mesta		gazdi-	površ-	OPIS	Osnovni taksacioni elementi						visi	deb.	Broj stabala po hektaru							G	Zapremina po		
ode-	od-	nska	ina		vrsta	sme	obr	sta-	sred.stablo		nski			Vrsta drveta						po		Vrsta drv	
ljenje	sek	klasa	ha		drveća	sa	ast	rost	Ds	Hs	step.	st.	1	2	3	4	5	6	svg.	ha	1	2	3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
				Šuma - nalazi se na ravnom terenu. i na blago nagnutom terenu (nagiba do	1. SrLip	0,4		99	28	20,3	6	7,5	26		44	9	26	17	121	0,5	0,8		1,1
				5°) - nagib ujednacen. Nadmorska visina 275 do 290m. Ekspozicija 1	2. Kit	0,4			38	24,8	8	12,5	17		6		7	6	36	0,4	1,4		0,3
				zapadna. Mrtvi pokrivac srednje zastupljen - povoljan proces	3. Gr	0,1			20	12,5	12	17,5	13		17		1		31	0,8	2,4		3,2
				humifikacije. Srednje gusta prizemna vegetacija. Srednje gusto žbunje.	4. OTL	0,1			25	18,3	9	22,5	3		10		1		14	0,6	1,1		3,0
				Slaba zakorovljenost. tip šume razlicitih hrastova i graba	5. Klen				9	8,4	8	27,5	4	13	11				29	1,7	2,5	7,9	6,1
				(Carpino-Polyquercetum typicum) na intervalu zemljišta od duboke	6. PBr				9	7,7	9	32,5	3	24	19	3			48	4,0	2,5	23,1	12,8
				pararendzine na lesu do lesivirane gajnjace..								37,5	7	13	11				31	3,5	8,7	17,9	10,4
												42,5	11	4		3			19	2,6	16,9	8,1	
				Izdanacka mešovita šuma kitnjaka (izdanacka šuma kitnjaka i lipe) -								47,5	9	6	3				17	3,0	17,4	11,9	4,9
				jednodobna (u fazi razgradnje). Ocuvana sastojina. Mešovita sastojina								52,5	17	3		3			23	4,9	43,0	7,9	
				(smeša stablimicna) gustog sklopa (0.8 - 0.9). u celini zdravstveno								57,5		6					6	1,5		20,8	
				stanje sastojine je dobro. po kvalitetu malo vredna sastojina (ima do 20%								62,5	4						4	1,3	14,9		
				tehnickog drveta). Srednja ugroženost od insekata. Srednja ugroženost od								67,5		3					3	1,0		15,3	
				fitopatoloških oboljenja-oboljenja lista. srednje negovana sastojina.								UKUP.	114	71	121	17	36	23	381	25,8	111,7	112,9	41,8
				Stabla graba su zakrivljena i sa velikim padom precnika (mala																			
				punodrvnost), sa srednje dugim krošnjama (dužine izmedu 1/3 i 1/2 visine																			
				stabala) i normalno razvijenim krošnjama, zdravstveno stanje stabala ove																			
				vrste drveca je dobro. Stabla srebrna lipa su zakrivljena i sa srednjim																			
				padom precnika (srednja punodrvnost), sa srednje dugim krošnjama (dužine																			
				izmedu 1/3 i 1/2 visine stabala) i ekscentricnim krošnjama, zdravstveno																			
				stanje stabala ove vrste drveca je dobro. Stabla kitnjaka su zakrivljena																			
				i sa srednjim padom precnika (srednja punodrvnost), sa srednje dugim																			
				krošnjama (dužine izmedu 1/3 i 1/2 visine stabala) i preširokim																			
				krošnjama, do 10% oštecenih stabala od insekata i fitopatoloških																			
				obolenja, suvih i suhovrhih stabala ima do 10%, zdravstveno stanje																			
9	a	60307201	5,67	stabala ove vrste drveca je dobro.																			
				Šuma - nalazi se na strani i na blago nagnutom terenu (nagiba do 5°) -	1. Kit	0,7		99	36	21,9	9	7,5		172	56	54	73	17	372	1,6		5,2	1,6
				nagib ujednacen. Nadmorska visina 275 do 320m. Ekspozicija 1 zapadna.	2. SrLip	0,2			14	12,4	6	12,5		54	35	6	2	8	104	1,3		4,6	2,8
				Mrtvi pokrivac srednje zastupljen - povoljan proces humifikacije. Srednje	3. Klen				9	9,2	9	17,5	2	35		17	6	5	65	1,6	0,5	6,4	
				gusta prizemna vegetacija. Srednje gusto žbunje. Slaba zakorovljenost.	4. OTL				10	9,8	9	22,5	12	19					31	1,2	3,6	6,4	
				tip šume kitnjaka (Quercetum montanum cariecetosum pilosae) na gajnjaci	5. Gr				8	8,1	9	27,5	40	13					54	3,2	24,3	8,2	
				do lesiviranoj gajnjaci..	6. Cjas				11	10,2	9	32,5	20	6					25	2,1	16,1	5,3	
												37,5	15						15	1,7	19,2		
				Izdanacka mešovita šuma kitnjaka (izdanacka šuma kitnjaka i lipe) -								42,5	45	6					51	7,2	73,1	8,1	
				jednodobna (u fazi razgradnje). Ocuvana sastojina. Mešovita sastojina								47,5	11	6					17	2,9	25,9	9,9	
				(smeša stablimicna) gustog sklopa (0.8 - 0.9). u celini zdravstveno								52,5	13	6					19	4,0	35,7	12,4	
				stanje sastojine je dobro. po kvalitetu malo vredna sastojina (ima do 20%								UKUP.	159	315	91	76	81	31	751	26,8	198,3	66,5	4,4
				tehnickog drveta). Srednja ugroženost od insekata. Srednja ugroženost od																			
				fitopatoloških oboljenja-oboljenja lista. srednje negovana sastojina.																			
				Stabla srebrna lipa su zakrivljena i sa srednjim padom precnika (srednja																			
				punodrvnost), sa srednje dugim krošnjama (dužine izmedu 1/3 i 1/2 visine																			
				stabala) i ekscentricnim krošnjama, zdravstveno stanje stabala ove vrste																			
				drveca je dobro. Stabla kitnjaka su zakrivljena i sa srednjim padom																			
				precnika (srednja punodrvnost), sa srednje dugim krošnjama (dužine izmedu																			
				1/3 i 1/2 visine stabala) i normalno razvijenim krošnjama, do 10%																			
				oštecenih stabala od insekata i fitopatoloških obolenja, suvih i																			
				suhovrhih stabala ima do 10%, zdravstveno stanje stabala ove vrste																			
9	b	60307484	7,86	drveca je dobro.																			

ОПИС СТАНИШТА И САСТОЈИНА

Ozn.mesta		gazdi-	površ-	OPIS	Osnovni taksacioni elementi						visi	deb.	Broj stabala po hektaru							G	Zapremina po		
ode-	od-	nska	ina		vrsta	sme	obr	sta-	sred.stablo		nski			Vrsta drveta						po		Vrsta drv	
ljenje	sek	klasa	ha		drveća	sa	ast	rost	Ds	Hs	step.	st.	1	2	3	4	5	6	svg.	ha	1	2	3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
				Šuma - nalazi se na strani i na srednje strmom terenu (nagiba od 6° do	1. Kit	0,4		99	32	15,5	14	7,5		145	29	49	79	54	356	1,6		3,5	0,4
				10°) - nagib ujednacen. Nadmorska visina 300 do 320m. Ekspozicija 1	2. SrLip	0,4			15	11,2	12	12,5		46	24	10	10	34	123	1,5		2,9	1,5
				zapadna. Mrtvi pokrivac srednje zastupljen - povoljan proces	3. OTL	0,2			19	12,8	14	17,5	10	34	10		10		63	1,5	1,4	4,6	1,4
				humifikacije. Srednje gusta prizemna vegetacija. Srednje gusto žbunje.	4. Brk				12	9,8	14	22,5					10		10	0,4			
				Nema zakorovljenosti. tip šume kitnjaka i cera sa bogatim spratom žbunja	5. Cjas				10	8,9	14	27,5	16						16	0,9	7,9		
				(Quercetum petraea-cerris galietosum) na rendiznama, pararendzinama,	6. Klen				9	8,4	14	32,5	41			10			51	4,3	29,2		
				posmedenim pararendzinama, plitkim eutricnim smedjim zemljištima i								37,5	28						28	3,1	26,8		
				gajnjacama..								42,5	4		10				14	1,9	4,6		12,0
												47,5		20	10				30	5,2		32,4	16,7
				Izdanacka mešovita šuma kitnjaka (izdanacka šuma kitnjaka i lipe) -								52,5		10					10	2,2		20,7	
				jednodobna (u fazi razgradnje). Ocuvana sastojina. Mešovita sastojina								UKUP.	99	254	83	69	109	87	700	22,6	69,9	64,1	31,9
				(smeša stablimicna) gustog sklopa (0.8 - 0.9). u celini zdravstveno																			
				stanje sastojine je dobro. po kvalitetu malo vredna sastojina (ima do 20%																			
				tehnickog drveta). Srednja ugroženost od insekata. Srednja ugroženost od																			
				fitopatoloških oboljenja-oboljenja lista. srednje negovana sastojina.																			
				Stabla srebrna lipa su zakrivljena i sa srednjim padom precnika (srednja																			
				punodrvnost), sa srednje dugim krošnjama (dužine izmedu 1/3 i 1/2 visine																			
				stabala) i ekscentricnim krošnjama, zdravstveno stanje stabala ove vrste																			
				drveca je dobro. Stabla kitnjaka su zakrivljena i sa srednjim padom																			
				precnika (srednja punodrvnost), sa srednje dugim krošnjama (dužine izmedu																			
				1/3 i 1/2 visine stabala) i normalno razvijenim krošnjama, do 10%																			
				oštecenih stabala od insekata i fitopatoloških obolenja, suvih i																			
				suhovrhih stabala ima do 10%, zdravstveno stanje stabala ove vrste																			
9	c	60307461	3,22	drveca je dobro.																			

Ozn.mesta		gazdi-	površ-	OPIS	Osnovni taksacioni elementi						visi	deb.	Broj stabala po hektaru							G	Zapremina po		
ode-	od-	nska	ina		vrsta	sme	obr	sta-	sred.stablo		nski			Vrsta drveta						po		Vrsta drv	
ljenje	sek	klasa	ha		drveća	sa	ast	rost	Ds	Hs	step.	st.	1	2	3	4	5	6	svg.	ha	1	2	3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
				Livada.																			
9	1	60	0,38																				
				Put.																			
9	2	59	0,33																				
				Šuma - nalazi se na strani i na blago nagnutom terenu (nagiba do 5°) -	1. Kit	0,5		92	45	17,2	14	7,5		114	7	137	72	36	366	1,6		1,3	0,1
				nagib ujednacen. Nadmorska visina 240 do 255m. Ekspozicija 1 istok -	2. Gr	0,2			17	12,0	13	12,5		16			7		23	0,3		1,1	
				jugoistok. Mrtvi pokrivac slabo zastupljen - povoljan proces	3. OTL	0,3			51	17,7	14	22,5		7					7	0,3		2,1	
				humifikacije. Srednje gusta prizemna vegetacija. Srednje gusto žbunje.	4. Klen				8	6,9	13	32,5	16	16					33	2,7	11,8	9,4	
				Srednja zakorovljenost. tip šuma kitnjaka i graba sa lazarkinjom (Querco	5. SrLip				8	7,2	12	42,5	33	16					49	6,9	43,6	20,1	
				- Carpinetum asperulosum) na gajnjaci do lesiviranoj gajnjaci i	6. Cjas				8	6,9	13	47,5	39	13					52	9,3	64,9	21,4	
				lesiviranom smedem zemljištu na serpentinitu ..								52,5	13						13	2,8	28,0		
												57,5	7		16				23	5,9	18,5		44,1
				Izdanacka mešovita šuma kitnjaka - jednodobna (u fazi razgradnje).								62,5			16				16	5,0			49,3
				Razredjena sastojina. Mešovita sastojina (smeša stablimicna) nepotpunog								UKUP.	108	183	39	137	78	36	581	34,8	166,8	55,3	93,5
				sklopa (0.5-0.6). u celini zdravstveno stanje sastojine je osrednje. po																			
				kvalitetu malo vredna sastojina (ima do 20% tehnickog drveta). Srednja																			
				ugroženost od insekata. Srednja ugroženost od fitopatoloških																			
				oboljenja-oboljenja lista. pogrešno negovana sastojina. Stabla graba su																			
				kriva i sa velikim padom precnika (mala punodrvnost), sa dugim krošnjama																			
				(dužine izmedu 1/2 i 2/3 visine stabala) i preširokim krošnjama,																			
				zdravstveno stanje stabala ove vrste drveca je dobro. Stabla kitnjaka su																			
				zakrivljena i sa srednjim padom precnika (srednja punodrvnost), sa																			
				srednje dugim krošnjama (dužine izmedu 1/3 i 1/2 visine stabala) i																			
				preširokim krošnjama, od 11-25% oštecenih stabala od insekata i																			
				fitopatoloških obolenja, suvih i sihovrhih stabala ima od 11-25%,																			
10	a	60307261	1,28	zdravstveno stanje stabala ove vrste drveca je osrednje.																			
				Šuma - nalazi se u uvali i na srednje strmom terenu (nagiba od 6° do	1. Gr	0,4		92	23	16,4	12	7,5	79			35	17	14	146	0,6	1,2		
				10°) - nagib valovit. Nadmorska visina 210 do 240m. Ekspozicija 1 istok	2. Kit	0,4			43	19,2	12	12,5	4						4	0,1	0,5		
				- jugoistok. Mrtvi pokrivac srednje zastupljen - povoljan proces	3. Cer	0,1			46	19,5	11	17,5	27			11		2	40	1,0	4,8		
				humifikacije. Srednje gusta prizemna vegetacija. Srednje gusto žbunje.	4. SrLip	0,1			17	14,3	10	22,5	34				5		39	1,5	10,8		
				Nema zakorovljenosti. tip šume lužnjaka, graba i cera sa lipama u	5. Klen				11	11,6	11	27,5	59	2	5	5			72	4,3	29,5	1,1	3,6
				dolinama vecih nadmorskih visina (Tilio-Carpino-Quercetum robori-cerris	6. OTL				9	10,0	12	32,5	38	5		5			49	4,0	27,4	3,4	
				collinum) na delivijumu..								37,5	21	8		5			33	3,7	19,1	8,1	
												42,5	15	33	2	2			53	7,5	19,0	46,4	3,2
				Izdanacka mešovita šuma graba (izdanacka šuma graba, kitnjaka i cera) -								47,5	2	13	2				17	3,0	3,3	24,3	3,7
				jednodobna (u fazi razgradnje). Razredjena sastojina. Mešovita sastojina								52,5	2	4	2				9	1,9	3,9	10,4	4,6
				(smeša stablimicna) nepotpunog sklopa (0.5-0.6). u celini zdravstveno								57,5	2		5				8	1,9	5,1		15,1
				stanje sastojine je dobro. po kvalitetu malo vredna sastojina (ima do 20%								62,5			2				2	0,7			6,9
				tehnickog drveta). Mala ugroženost od insekata. Srednja ugroženost od								67,5		2					2	0,8		8,5	
				fitopatoloških oboljenja-oboljenja lista. pogrešno negovana sastojina.								UKUP.	284	68	19	64	23	16	475	31,1	124,4	102,2	37,1
				Stabla graba su zakrivljena i sa velikim padom precnika (mala																			
				punodrvnost), sa dugim krošnjama (dužine izmedu 1/2 i 2/3 visine stabala)																			
				i preširokim krošnjama, zdravstveno stanje stabala ove vrste drveca je																			
				dobro. Stabla kitnjaka su zakrivljena i sa srednjim padom precnika																			

ОПИС СТАНИШТА И САСТОЈИНА

Ozn.mesta		gazdi-	površ-	OPIS	Osnovni taksacioni elementi						visi	deb.	Broj stabala po hektaru							G	Zapremina po		
ode-	od-	nska	ina		vrsta	sme	obr	sta-	sred.stablo		nski			Vrsta drveta						po		Vrsta drv	
ljenje	sek	klasa	ha		drveća	sa	ast	rost	Ds	Hs	step.	st.	1	2	3	4	5	6	svg.	ha	1	2	3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
				(srednja punodrvnost), sa srednje dugim krošnjama (dužine izmedu 1/3 i																			
				1/2 visine stabala) i normalno razvijenim krošnjama, do 10% oštecenih																			
				stabala od insekata i fitopatoloških obolenja, suvih i suhovrhih stabala																			
10	b	60176144	6,26	ima do 10%, zdravstveno stanje stabala ove vrste drveca je dobro.																			

ОПИС СТАНИШТА И САСТОЈИНА

Ozn.mesta		gazdi-	površ-	OPIS	Osnovni taksacioni elementi						visi	deb.	Broj stabla po hektaru							G	Zapremina po		
ode-	od-	nska	ina		vrsta	sme	obr	sta-	sred.stablo		nski			Vrsta drveta						po		Vrsta drv	
ljenje	sek	klasa	ha		drveća	sa	ast	rost	Ds	Hs	step.	st.	1	2	3	4	5	6	svg.	ha	1	2	3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
				Šuma - nalazi se na strani i na blago nagnutom terenu (nagiba do 5°) -	1. Kit	0,4		92	29	17,9	10	7,5		33	33	82	197		345	1,5		0,9	0,4
				nagib ujednacen. Nadmorska visina 255 do 275m. Ekspozicija 1 zapadna.	2. Gr	0,3			28	17,4	11	12,5	33		49		66		147	1,8	2,6		3,9
				Mrtvi pokrivac obilno zastupljen (tanak sloj) - povoljan proces	3. Cjas	0,1			16	12,9	11	17,5	16		65				82	2,0	3,7		12,5
				humifikacije. Retka prizemna vegetacija. Srednje gusto žbunje. Nema	4. Klen	0,1			12	9,9	11	22,5			33	16			49	1,9			8,8
				zakorovljenosti. tip šume kitnjaka (Quercetum montanum cariecetosum	5. SrLip				9	7,0	8	27,5		17	16	17			49	2,9		9,9	7,0
				pilosae) na gajnjaci do lesiviranoj gajnjaci..								32,5	33	33					66	5,5	31,8	26,3	
												37,5		49					49	5,5		47,6	
				Izdanacka mešovita šuma kitnjaka (izdanacka šuma kitnjaka i graba) -								47,5	33						33	5,8	63,9		
				jednodobna (u fazi razgradnje). Razredjena sastojina. Mešovita sastojina								UKUP.	115	132	196	115	263		820	26,9	102,1	84,7	32,6
				(smeša stablimicna) nepotpunog sklopa (0.5-0.6). u celini zdravstveno																			
				stanje sastojine je osrednje. po kvalitetu malo vredna sastojina (ima do																			
				20% tehnickog drveta). Srednja ugroženost od insekata. Srednja ugroženost																			
				od fitopatoloških oboljenja-oboljenja lista. pogrešno negovana sastojina.																			
				Stabla graba su kriva i sa srednjim padom precnika (srednja																			
				punodrvnost), sa srednje dugim krošnjama (dužine izmedu 1/3 i 1/2 visine																			
				stabala) i preširokim krošnjama, zdravstveno stanje stabala ove vrste																			
				drveca je dobro. Stabla srebrna lipa su zakrivljena i sa velikim padom																			
				precnika (mala punodrvnost), sa dugim krošnjama (dužine izmedu 1/2 i 2/3																			
				visine stabala) i ekscentricnim krošnjama, zdravstveno stanje stabala																			
				ove vrste drveca je dobro. Stabla kitnjaka su zakrivljena i sa velikim																			
				padom precnika (mala punodrvnost), sa dugim krošnjama (dužine izmedu 1/2																			
				i 2/3 visine stabala) i ekscentricnim krošnjama, od 11-25% oštecenih																			
				stabala od insekata i fitopatoloških obolenja, suvih i sihovrhih stabala																			
10	c	60307484	1,02	ima od 11-25%, zdravstveno stanje stabala ove vrste drveca je osrednje.																			
				Šuma - nalazi se na strani i na srednje strmom terenu (nagiba od 6° do	1. Kit	0,5		92	39	21,7	9	7,5		109	17	125	77	49	377	1,7		2,9	0,3
				10°) - nagib ujednacen. Nadmorska visina 25 do 270m. Ekspozicija 1	2. Gr	0,2			18	14,8	9	12,5		13	16	33	11	11	84	1,0		0,9	1,4
				zapadna. Mrtvi pokrivac srednje zastupljen - povoljan proces	3. OTL	0,2			23	17,5	9	17,5		11		13	2		26	0,6		2,1	
				humifikacije. Srednje gusta prizemna vegetacija. Srednje gusto žbunje.	4. SrLip				10	9,4	7	22,5	6	28	5	6		6	50	2,0	1,7	9,1	1,4
				Nema zakorovljenosti. tip šume razlicitih hrastova i graba	5. Klen				8	8,1	9	27,5	5	17	2	2			27	1,6	2,8	9,7	1,3
				(Carpino-Polyquercetum typicum) na intervalu zemljišta od duboke	6. Cjas				10	9,2	9	32,5	24	21					45	3,7	21,8	17,0	
				pararendzine na lesu do lesivirane gajnjace..								37,5	24	18					42	4,6	29,9	18,4	
												42,5	33	8	16				57	8,1	54,2	10,2	28,7
				Izdanacka mešovita šuma kitnjaka (izdanacka šuma kitnjaka i graba) -								47,5	8		6				13	2,3	16,8		11,5
				jednodobna (u fazi razgradnje). Razredjena sastojina. Mešovita sastojina								52,5	11						11	2,4	31,2		
				(smeša stablimicna) nepotpunog sklopa (0.5-0.6). u celini zdravstveno								UKUP.	111	225	62	179	91	66	732	28,0	158,3	70,4	44,5
				stanje sastojine je dobro. po kvalitetu malo vredna sastojina (ima do 20%																			
				tehnickog drveta). Srednja ugroženost od insekata. Srednja ugroženost od																			
				fitopatoloških oboljenja-oboljenja lista. pogrešno negovana sastojina.																			
				Stabla graba su zakrivljena i sa velikim padom precnika (mala																			
				punodrvnost), sa dugim krošnjama (dužine izmedu 1/2 i 2/3 visine stabala)																			
				i preširokim krošnjama, zdravstveno stanje stabala ove vrste drveca je																			
				dobro. Stabla kitnjaka su zakrivljena i sa srednjim padom precnika																			
				(srednja punodrvnost), sa srednje dugim krošnjama (dužine izmedu 1/3 i																			
				1/2 visine stabala) i normalno razvijenim krošnjama, do 10% oštecenih																			
				stabala od insekata i fitopatoloških obolenja, suvih i suhovrhih stabala																			
10	d	60307201	10,37	ima do 10%, zdravstveno stanje stabala ove vrste drveca je dobro.																			
				Šuma - nalazi se na strani i na srednje strmom terenu (nagiba od 6° do	1. Kit	0,8		92	37	21,1	10	7,5		33	31		15		79	0,3		1,1	0,8
				10°) - nagib ujednacen. Nadmorska visina 230 do 275m. Ekspozicija 1	2. SrLip	0,2			17	14,8	7	12,5		48	26	14	2	6	96	1,2		4,2	1,9

ОПИС СТАНИШТА И САСТОЈИНА

Ozn.mesta		gazdi-	površ-	OPIS	Osnovni taksacioni elementi						visi	deb.	Broj stabala po hektaru							G	Zapremina po		
ode-	od-	nska	ina		vrsta	sme	obr	sta-	sred.stablo		nski			Vrsta drveta						po		Vrsta drv	
ljenje	sek	klasa	ha		drveća	sa	ast	rost	Ds	Hs	step.	st.	1	2	3	4	5	6	svg.	ha	1	2	3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
				zapadna. Mrtvi pokrivac obilno zastupljen (tanak sloj) - povoljan proces	3. Gr				11	10,9	9	17,5	2	44	4				50	1,2	0,4	7,7	0,8
				humifikacije. Srednje gusta prizemna vegetacija. Srednje gusto žbunje.	4. Cjas				17	14,6	9	22,5	8	21	6				34	1,4	2,6	6,5	1,7
				Nema zakorovljenosti. tip šume kitnjaka (Quercetum montanum cariecetosum	5. Klen				8	8,1	9	27,5	11	14					25	1,5	5,9	6,9	
				pilosae) na gajnjaci do lesiviranoj gajnjaci..	6. Brk				13	11,8	9	32,5	49						49	4,1	41,0		
												37,5	31	2					33	3,6	37,6	2,8	
				Izdanacka mešovita šuma kitnjaka (izdanacka šuma kitnjaka i lipe) -								42,5	26	4					31	4,3	41,2	6,3	
				jednodobna (u fazi razgradnje). Razredjena sastojina. Mešovita sastojina								47,5	19			2			21	3,7	38,9		
				(smeša stablimicna) nepotpunog sklopa (0.5-0.6). u celini zdravstveno								52,5	4	2					7	1,4	11,1	5,0	
				stanje sastojine je osrednje. po kvalitetu malo vredna sastojina (ima do								57,5	4	2					7	1,7	14,6	6,6	
				20% tehnickog drveta). Srednja ugroženost od insekata. Srednja ugroženost								UKUP.	154	170	67	16	18	6	431	24,4	193,1	47,0	5,3
				od fitopatoloških oboljenja-oboljenja lista. pogrešno negovana sastojina.																			
				Stabla graba su kriva i sa velikim padom precnika (mala punodrvnost), sa																			
				dugim krošnjama (dužine izmedu 1/2 i 2/3 visine stabala) i preširokim																			
				krošnjama, zdravstveno stanje stabala ove vrste drveca je dobro. Stabla																			
				srebrna lipa su zakrivljena i sa srednjim padom precnika (srednja																			
				punodrvnost), sa srednje dugim krošnjama (dužine izmedu 1/3 i 1/2 visine																			
				stabala) i ekscentricnim krošnjama, zdravstveno stanje stabala ove vrste																			
				drveca je dobro. Stabla kitnjaka su zakrivljena i sa srednjim padom																			
				precnika (srednja punodrvnost), sa srednje dugim krošnjama (dužine izmedu																			
				1/3 i 1/2 visine stabala) i normalno razvijenim krošnjama, do 10%																			
				oštecenih stabala od insekata i fitopatoloških obolenja, suvih i																			
				suhovrhih stabala ima do 10%, zdravstveno stanje stabala ove vrste																			
10	e	60307484	7,50	drveca je dobro.																			

Ozn.mesta		gazdi-	površ-	OPIS	Osnovni taksacioni elementi						visi	deb.	Broj stabala po hektaru							G	Zapremina po		
ode-	od-	nska	ina		vrsta	sme	obr	sta-	sred.stablo		nski			Vrsta drveta						po		Vrsta drv	
ljenje	sek	klasa	ha		drveća	sa	ast	rost	Ds	Hs	step.	st.	1	2	3	4	5	6	svg.	ha	1	2	3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
				Šuma - nalazi se na strani i na srednje strmom terenu (nagiba od 6° do	1. Bag	0,8		24	21	16,8	14	7,5	54	81	6	23	6		170	0,7	1,5	1,7	0,2
				10°) - nagib ujednacen. Nadmorska visina 205 do 335m. Ekspozicija 1	2. Klen	0,1			12	10,0	8	12,5	32	39		17			87	1,1	2,9	3,8	
				istocna. Mrtvi pokrivac srednje zastupljen - povoljan proces	3. Orah	0,1			24	19,0	7	17,5	19	13					32	0,8	3,6	2,6	
				humifikacije. Retka prizemna vegetacija. Srednje gusto žbunje. Nema	4. OTL				13	10,7	7	22,5	58	17					75	3,0	22,9	4,9	
				zakorovljenosti. tip šume lužnjaka, graba i cera sa lipama u dolinama	5. PBr				8	5,7	7	27,5	91	6	6				104	6,2	60,0	4,1	5,1
				vecih nadmorskih visina (Tilio-Carpino-Quercetum robori-cerris collinum)								32,5	13			6			19	1,5	13,0		
				na delivijumu..								37,5			6				6	0,7			8,4
												42,5	6						6	0,9	12,9		
				Izdanacka šuma bagrema - jednodobna (u optimalnoj fazi). Ocuvana								UKUP.	272	156	18	45	6		498	14,8	116,9	17,1	13,6
				sastojina. Mešovita sastojina (smeša i grupimicna i stablimicna) vrlo																			
				gustog sklopa (1.0). u celini zdravstveno stanje sastojine je dobro. po																			
				kvalitetu sastojina bez vrednosti (bez ucešca tehnickog drveta). Srednja																			
				ugroženost od insekata. Srednja ugroženost od drugih štetnih uticaja.																			
				nenegovana sastojina. Stabla bagrema su zakrivljena i sa velikim padom																			
				precnika (mala punodrvnost), sa kratkim krošnjama (dužine izmedu 1/4 i1/3																			
				visine stabala) i uskim krošnjama, suvih i suhovrhih stabala ima do 10%,																			
10	f	60325144	1,05	zdravstveno stanje stabala ove vrste drveca je dobro.																			
				Livada.																			
10	1	60	1,14																				
				Put.																			
10	2	60	0,33																				
				Šuma - nalazi se na strani i na srednje strmom terenu (nagiba od 6° do	1. CB	1,0		60	28	16,8	12	12,5		8	4	18	4		34	0,4		0,7	0,3
				10°) - nagib ujednacen. Nadmorska visina 220 do 270m. Ekspozicija 1	2. SrLip				15	13,4	9	17,5	27	8	4		4		42	1,0	3,6	1,2	0,8
				istocna. Mrtvi pokrivac slabo zastupljen - povoljan proces humifikacije.	3. Gr				15	13,4	12	22,5	151						151	6,0	49,0		
				Gusta prizemna vegetacija. Gusto žbunje. Nema zakorovljenosti. tip šume	4. Klen				13	12,3	12	27,5	84						84	5,0	45,0		
				lužnjaka, graba i cera sa lipama u dolinama vecih nadmorskih visina	5. Orah				15	13,4	11	32,5	106						106	8,8	79,6		
				(Tilio-Carpino-Quercetum robori-cerris collinum) na delivijumu..								37,5	64						64	7,1	73,5		
												42,5	8						8	1,1	11,7		
				Veštacki podignuta sastojina crnog bora - jednodobna (srednjedobna)								UKUP.	440	16	8	18	8		489	29,4	262,4	1,9	1,2
				sastojina. Ocuvana sastojina. Cista sastojina (smeša stablimicna) gustog																			
				sklopa (0.8 - 0.9). u celini zdravstveno stanje sastojine je osrednje. po																			
				kvalitetu srednjevredna sastojina (ima od 21-40% tehnickog drveta).																			
				Srednja ugroženost od insekata. Srednja ugroženost od požara. srednje																			
				negovana sastojina. Stabla crni bor su prava i sa srednjim padom																			
				precnika (srednja punodrvnost), sa dugim krošnjama (dužine izmedu 1/2 i																			
				2/3 visine stabala) i uskim krošnjama, do 10% oštecenih stabala od																			
				insekata, do 10% oštecenih stabala od guljenja kore, suvih i suhovrhih																			
				stabala ima do 10%, zdravstveno stanje stabala ove vrste drveca je																			
11	a	60475144	3,09	osrednje.																			
				Šuma - nalazi se u dolini i na blago nagnutom terenu (nagiba do 5°) -	1. Kit	0,6		96	36	19,3	11	7,5		99	72		16	49	236	1,0		1,9	1,5
				nagib ujednacen. Nadmorska visina 250 do 275m. Ekspozicija 1 jug -	2. Gr	0,2			17	14,9	11	12,5						16	16	0,2			
				jugoistok. Mrtvi pokrivac srednje zastupljen - povoljan proces	3. Klen	0,1			14	13,3	11	17,5		7					7	0,2		1,5	
				humifikacije. Srednje gusta prizemna vegetacija. Srednje gusto žbunje.	4. Cer				43	20,0	10	22,5		20					20	0,8		6,5	
				Nema zakorovljenosti. tip šume lužnjaka, graba i cera sa lipama u	5. OTL				13	13,1	11	27,5	46	26	7		7		85	5,1	27,2	13,5	2,8

Ozn.mesta		gazdi-	površ-	OPIS	Osnovni taksacioni elementi						visi	deb.	Broj stabala po hektaru							G	Zapremina po		
ode-	od-	nska	ina		vrsta	sme	obr	sta-	sred.stablo		nski			Vrsta drveta						po		Vrsta drv	
ljenje	sek	klasa	ha		drveća	sa	ast	rost	Ds	Hs	step.	st.	1	2	3	4	5	6	svg.	ha	1	2	3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
				dolinama vecih nadmorskih visina (Tilio-Carpino-Quercetum robori-cerris	6. SrLip				9	10,0	10	32,5	33	13	7				52	4,3	25,1	8,8	4,9
				collinum) na delivijumu..								37,5	16						16	1,8	17,3		
												42,5	7	7		7			20	2,8	10,6	8,7	
				Izdanacka mešovita šuma kitnjaka (izdanacka šuma kitnjaka i graba) -								47,5	29	7	7				43	7,5	61,3	9,8	10,3
				jednodobna (u fazi razgradnje). Razredjena sastojina. Mešovita sastojina								57,5	7						7	1,7	18,7		
				(smeša stablimicna) nepotpunog sklopa (0.5-0.6). u celini zdravstveno								UKUP.	138	177	92	7	23	65	502	25,5	160,2	50,7	19,6
				stanje sastojine je dobro. po kvalitetu malo vredna sastojina (ima do 20%																			
				tehnickog drveta). Srednja ugroženost od insekata. Srednja ugroženost od																			
				fitopatoloških oboljenja-oboljenja lista. pogrešno negovana sastojina.																			
				Stabla graba su kriva i sa velikim padom precnika (mala punodrvnost), sa																			
				dugim krošnjama (dužine izmedu 1/2 i 2/3 visine stabala) i preširokim																			
				krošnjama, do 10% oštecenih stabala od insekata i fitopatoloških																			
				obolenja, suvih i suhovrhih stabala ima do 10%, zdravstveno stanje																			
				stabala ove vrste drveca je dobro. Stabla cera su zakrivljena i sa																			
				srednjim padom precnika (srednja punodrvnost), sa srednje dugim krošnjama																			
				(dužine izmedu 1/3 i 1/2 visine stabala) i normalno razvijenim krošnjama,																			
				do 10% oštecenih stabala od insekata i fitopatoloških obolenja, suvih i																			
				suhovrhih stabala ima do 10%, zdravstveno stanje stabala ove vrste																			
				drveca je dobro. Stabla kitnjaka su zakrivljena i sa srednjim padom																			
				precnika (srednja punodrvnost), sa srednje dugim krošnjama (dužine izmedu																			
				1/3 i 1/2 visine stabala) i normalno razvijenim krošnjama, do 10%																			
				oštecenih stabala od insekata i fitopatoloških obolenja, suvih i																			
				suhovrhih stabala ima do 10%, zdravstveno stanje stabala ove vrste																			
11	b	60307144	1,56	drveca je dobro.																			

Ozn.mesta		gazdi-	površ-	OPIS	Osnovni taksacioni elementi						visi	deb.	Broj stabala po hektaru							G	Zapremina po		
ode-	od-	nska	ina		vrsta	sme	obr	sta-	sred.stablo		nski			Vrsta drveta						po		Vrsta drv	
ljenje	sek	klasa	ha		drveća	sa	ast	rost	Ds	Hs	step.	st.	1	2	3	4	5	6	svg.	ha	1	2	3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
				Šuma - nalazi se na strani i na strmom terenu (nagiba od 11° do 15°) -	1. Kit	0,4		96	30	16,9	12	7,5			164	41	69	92	365	1,6			3,4
				nagib valovit. Nadmorska visina 225 do 305m. Ekspozicija 1 istocna.	2. Cer	0,4			40	18,9	11	12,5			45	11	11	25	92	1,1			3,0
				Mrtvi pokrivac srednje zastupljen - povoljan proces humifikacije. Retka	3. SrLip	0,2			13	9,7	10	17,5	10		18	26		5	58	1,4	1,7		2,2
				prizemna vegetacija. Gusto žbunje. Nema zakorovljenosti. tip šume	4. OTL	0,1			15	11,1	12	22,5	22		10	16			47	1,9	6,8		3,1
				razlicitih hrastova sa crnim jasenom (Orno-Polyquercetum) na slabo	5. Klen				9	7,0	12	27,5	20	10	11				42	2,5	11,1	5,7	5,8
				razvijenim zemljištima na krecnjacima i bazicnim silikatnim stenama..	6. Cjas				9	7,1	12	32,5	45	5	6		2		58	4,8	31,7	4,2	4,4
												37,5	19	14	2				35	3,9	17,9	15,1	2,0
				Izdanacka mešovita šuma kitnjaka (izdanacka šuma kitnjaka i cera) -								42,5	4	25	11	5			46	6,5	6,5	34,8	14,2
				jednodobna (u fazi razgradnje). Ocuvana sastojina. Mešovita sastojina								57,5		5					5	1,3		14,4	
				(smeša stablimicna) potpunog sklopa (0.7). u celini zdravstveno stanje								62,5		2					2	0,7		6,6	
				sastojine je dobro. po kvalitetu malo vredna sastojina (ima do 20%								72,5	2						2	0,9	11,2		
				tehnickog drveta). Srednja ugroženost od insekata. Srednja ugroženost od								UKUP.	123	62	267	98	82	122	752	26,5	87,0	80,8	38,0
				fitopatoloških oboljenja-oboljenja lista. srednje negovana sastojina.																			
				Stabla cera su zakrivljena i sa srednjim padom precnika (srednja																			
				punodrvnost), sa srednje dugim krošnjama (dužine izmedu 1/3 i 1/2 visine																			
				stabala) i normalno razvijenim krošnjama, do 10% oštecenih stabala od																			
				insekata i fitopatoloških obolenja, suvih i suhovrhih stabala ima do 10%,																			
				zdravstveno stanje stabala ove vrste drveca je dobro. Stabla srebrna																			
				lipa su zakrivljena i sa velikim padom precnika (mala punodrvnost), sa																			
				kratkim krošnjama (dužine izmedu 1/4 i1/3 visine stabala) i uskim																			
				krošnjama, do 10% oštecenih stabala od insekata i fitopatoloških																			
				obolenja, suvih i suhovrhih stabala ima do 10%, zdravstveno stanje																			
				stabala ove vrste drveca je dobro. Stabla kitnjaka su zakrivljena i sa																			
				srednjim padom precnika (srednja punodrvnost), sa srednje dugim krošnjama																			
				(dužine izmedu 1/3 i 1/2 visine stabala) i normalno razvijenim krošnjama,																			
				do 10% oštecenih stabala od insekata i fitopatoloških obolenja, suvih i																			
				suhovrhih stabala ima do 10%, zdravstveno stanje stabala ove vrste																			
11	c	60307371	7,79	drveca je dobro.																			
				Šuma - nalazi se na strani i na strmom terenu (nagiba od 11° do 15°) -	1. Bk	0,7		96	27	16,5	14	7,5	50						50	0,2	0,7		
				nagib ujednacen. Nadmorska visina 225 do 260m. Ekspozicija 1 zapad -	2. Kit	0,2			32	18,4	11	12,5	19				6		25	0,3	1,5		
				severozapad. Mrtvi pokrivac srednje zastupljen - povoljan proces	3. SrLip	0,1			29	17,1	9	17,5	30		6	6			43	1,0	4,9		0,9
				humifikacije. Retka prizemna vegetacija. Retko žbunje. Nema	4. Gr				25	15,2	11	22,5	19	12	6	12			49	2,0	5,4	4,1	1,7
				zakorovljenosti. tip šume bukve i kitnjaka (Querco-Fagetum typicum) na	5. Brk				13	8,1	11	27,5		12	6	6			24	1,4		6,4	2,9
				kiselom smedem i lesiviranom kiselom smedjem zemljištu..								32,5	37	13	31	6			86	7,1	28,1	10,7	21,3
												37,5	43	19					62	6,8	47,9	19,5	
				Izdanacka mešovita šuma bukve (izdanacka šuma bukve i kitnjaka) -								42,5	31	6					37	5,2	43,2	9,6	
				jednodobna (u fazi razgradnje). Ocuvana sastojina. Mešovita sastojina								47,5	13						13	2,2	25,5		
				(smeša stablimicna) potpunog sklopa (0.7). u celini zdravstveno stanje								52,5	12						12	2,6	29,5		
				sastojine je osrednje. po kvalitetu malo vredna sastojina (ima do 20%								UKUP.	253	62	49	31	6		400	29,0	186,7	50,2	26,8
				tehnickog drveta). Srednja ugroženost od insekata. Srednja ugroženost od																			
				vetra. srednje negovana sastojina. Stabla srebrna lipa su zakrivljena i																			
				sa srednjim padom precnika (srednja punodrvnost), sa kratkim krošnjama																			
				(dužine izmedu 1/4 i1/3 visine stabala) i uskim krošnjama, zdravstveno																			
				stanje stabala ove vrste drveca je osrednje. Stabla kitnjaka su																			
				zakrivljena i sa velikim padom precnika (mala punodrvnost), sa dugim																			
				krošnjama (dužine izmedu 1/2 i 2/3 visine stabala) i ekscentricnim																			
				krošnjama, do 10% oštecenih stabala od vetra, snega i leda, do 10%																			
				oštecenih stabala od insekata i fitopatoloških obolenja, suvih i																			

ОПИС СТАНИШТА И САСТОЈИНА

Ozn.mesta		gazdi-	površ-	OPIS	Osnovni taksacioni elementi						visi	deb.	Broj stabala po hektaru							G	Zapremina po		
ode-	od-	nska	ina		vrsta	sme	obr	sta-	sred.stablo		nski			Vrsta drveta						po		Vrsta drv	
ljenje	sek	klasa	ha		drveća	sa	ast	rost	Ds	Hs	step.	st.	1	2	3	4	5	6	svg.	ha	1	2	3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
				suhovrhih stabala ima do 10%, zdravstveno stanje stabala ove vrste																			
				drveca je osrednje. Stabla bukve su zakrivljena i sa velikim padom																			
				precnika (mala punodrvnost), sa dugim krošnjama (dužine izmedu 1/2 i 2/3																			
				visine stabala) i ekscentricnim krošnjama, do 10% oštecenih stabala od																			
				vetra, snega i leda, suvih i suhovrhih stabala ima do 10%, zdravstveno																			
11	d	60361602	1,66	stanje stabala ove vrste drveca je osrednje.																			

Ozn.mesta		gazdi-	površ-	OPIS	Osnovni taksacioni elementi						visi	deb.	Broj stabala po hektaru							G	Zapremina po		
ode-	od-	nska	ina		vrsta	sme	obr	sta-	sred.stablo		nski			Vrsta drveta						po		Vrsta drv	
ljenje	sek	klasa	ha		drveća	sa	ast	rost	Ds	Hs	step.	st.	1	2	3	4	5	6	svg.	ha	1	2	3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
				Šuma - nalazi se na strani i na strmom terenu (nagiba od 11° do 15°) -	1. Kit	0,4		96	37	19,4	11	7,5		54	113	8	30	18	222	1,0		1,1	2,9
				nagib ujednacen. Nadmorska visina 225 do 260m. Ekspozicija 1 zapad -	2. Gr	0,2			17	14,2	11	12,5		20	18				38	0,5		1,7	1,3
				severozapad. Mrtvi pokrivac slabo zastupljen - povoljan proces	3. SrLip	0,3			17	13,6	9	17,5		48	20				67	1,6		8,7	2,5
				humifikacije. Srednje gusta prizemna vegetacija. Gusto žbunje. Nema	4. OTL	0,1			31	18,3	11	22,5	10	46	10				65	2,6	3,1	15,7	3,0
				zakorovljenosti. tip šume razlicitih hrastova i graba	5. Ocet				8	7,3	15	27,5	30	10		8			48	2,8	15,1	5,1	
				(Carpino-Polyquercetum typicum) na intervalu zemljišta od duboke	6. Cjas				8	7,3	11	32,5	4	18	4	4			30	2,5	3,4	12,5	2,7
				pararendzine na lesu do lesivirane gajnjace..								37,5	4						4	0,4	3,9		
												42,5	28		10	10			48	6,8	40,9		14,2
				Izdanacka mešovita šuma kitnjaka - jednodobna (u fazi razgradnje).								47,5	14		10				24	4,2	29,2		16,6
				Ocuvana sastojina. Mešovita sastojina (smeša stablimicna) gustog sklopa								52,5	8			4			12	2,6	20,8		
				(0.8 - 0.9). u celini zdravstveno stanje sastojine je dobro. po kvalitetu								57,5			10				10	2,6			25,4
				malo vredna sastojina (ima do 20% tehnickog drveta). Srednja ugroženost								UKUP.	97	194	195	34	30	18	568	27,5	116,5	44,8	68,6
				od insekata. Srednja ugroženost od fitopatoloških oboljenja-oboljenja																			
				lista. srednje negovana sastojina. Stabla graba su zakrivljena i sa																			
				velikim padom precnika (mala punodrvnost), sa dugim krošnjama (dužine																			
				izmedu 1/2 i 2/3 visine stabala) i preširokim krošnjama, zdravstveno																			
				stanje stabala ove vrste drveca je dobro. Stabla srebrna lipa su																			
				zakrivljena i sa srednjim padom precnika (srednja punodrvnost), sa																			
				srednje dugim krošnjama (dužine izmedu 1/3 i 1/2 visine stabala) i																			
				ekscentricnim krošnjama, zdravstveno stanje stabala ove vrste drveca je																			
				dobro. Stabla kitnjaka su zakrivljena i sa srednjim padom precnika																			
				(srednja punodrvnost), sa srednje dugim krošnjama (dužine izmedu 1/3 i																			
				1/2 visine stabala) i normalno razvijenim krošnjama, do 10% oštecenih																			
				stabala od insekata i fitopatoloških obolenja, suvih i suhovrhih stabala																			
11	e	60307201	2,93	ima do 10%, zdravstveno stanje stabala ove vrste drveca je dobro.																			
				Šuma - nalazi se u dolini i na blago nagnutom terenu (nagiba do 5°) -	1. Kit	0,4		96	42	20,5	11	7,5		40	76		27	33	176	0,8		0,6	1,7
				nagib valovit. Nadmorska visina 235 do 300m. Ekspozicija 1 istocna.	2. Gr	0,2			19	15,0	12	12,5		4	15		4	2	26	0,3		0,4	1,0
				Mrtvi pokrivac srednje zastupljen - povoljan proces humifikacije. Retka	3. SrLip	0,2			18	14,0	9	17,5		42	8			4	54	1,3		7,1	1,1
				prizemna vegetacija. Srednje gusto žbunje. Nema zakorovljenosti. tip šume	4. Cer	0,2			43	20,7	10	22,5		43	11			2	56	2,2		13,7	3,2
				lužnjaka, graba i cera sa lipama u dolinama vecih nadmorskih visina	5. OTL				10	9,0	11	27,5	4	15	7				26	1,5	2,7	6,9	3,0
				(Tilio-Carpino-Quercetum robori-cerris collinum) na delivijumu..	6. Klen				10	8,6	11	32,5	20	12		8			39	3,2	16,7	9,2	
												37,5	4	7	15	2	2		30	3,4	5,6	6,4	15,3
				Izdanacka mešovita šuma kitnjaka (izdanacka šuma kitnjaka, graba i lipe)								42,5	9	2	2	7			20	2,8	12,8	2,5	2,6
				- jednodobna (u fazi razgradnje). Ocuvana sastojina. Mešovita sastojina								47,5	11		13	6			29	5,2	20,3		22,7
				(smeša stablimicna) potpunog sklopa (0.7). u celini zdravstveno stanje								52,5	4						4	0,9	11,3		
				sastojine je dobro. po kvalitetu malo vredna sastojina (ima do 20%								57,5	8		2	2			12	3,1	24,1		5,8
				tehnickog drveta). Srednja ugroženost od insekata. Srednja ugroženost od								62,5	2			2			4	1,3	8,6		
				fitopatoloških oboljenja-oboljenja lista. srednje negovana sastojina.								UKUP.	62	165	149	26	34	42	477	26,1	102,1	46,8	56,4
				Stabla graba su kriva i sa velikim padom precnika (mala punodrvnost), sa																			
				dugim krošnjama (dužine izmedu 1/2 i 2/3 visine stabala) i preširokim																			
				krošnjama, zdravstveno stanje stabala ove vrste drveca je dobro. Stabla																			
				srebrna lipa su zakrivljena i sa srednjim padom precnika (srednja																			
				punodrvnost), sa srednje dugim krošnjama (dužine izmedu 1/3 i 1/2 visine																			
				stabala) i ekscentricnim krošnjama, zdravstveno stanje stabala ove vrste																			
				drveca je dobro. Stabla kitnjaka su zakrivljena i sa srednjim padom																			
				precnika (srednja punodrvnost), sa srednje dugim krošnjama (dužine izmedu																			
				1/3 i 1/2 visine stabala) i normalno razvijenim krošnjama, do 10%																			
				oštecenih stabala od insekata i fitopatoloških obolenja, suvih i																			

Ozn.mesta		gazdi-	površ-	OPIS	Osnovni taksacioni elementi						visi	deb.	Broj stabala po hektaru							G	Zapremina po		
ode-	od-	nska	ina		vrsta	sme	obr	sta-	sred.stablo		nski			Vrsta drveta						po		Vrsta drv	
ljenje	sek	klasa	ha		drveća	sa	ast	rost	Ds	Hs	step.	st.	1	2	3	4	5	6	svg.	ha	1	2	3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
				suhovrhih stabala ima do 10%, zdravstveno stanje stabala ove vrste																			
11	f	60307144	7,62	drveca je dobro.																			
				Šuma - nalazi se na strani i na blago nagnutom terenu (nagiba do 5°) -	1. Kit	0,6		96	30	18,8	9	7,5		246	49	77	56	49	476	2,1		5,5	1,1
				nagib ujednacen. Nadmorska visina 255 do 305m. Ekspozicija 1 istocna.	2. SrLip	0,3			13	11,1	8	12,5		50	7		14	14	84	1,0		4,0	0,8
				Mrtvi pokrivac slabo zastupljen - povoljan proces humifikacije. Retka	3. Gr				12	10,8	10	17,5		36	28	14		14	91	2,2		5,9	5,1
				prizemna vegetacija. Gusto žbunje. Nema zakorovljenosti. tip šume	4. Cjas				11	9,7	10	22,5	56		7				63	2,5	20,2		2,3
				kitnjaka (Quercetum montanum cariecetosum pilosae) na gajnjaci do	5. OTL				11	10,0	10	27,5	42	21					63	3,7	24,1	12,0	
				lesiviranoj gajnjaci..	6. Brk				10	9,3	10	32,5	21	28		7			56	4,7	16,6	21,7	
												37,5	21	7			7		35	3,9	26,6	8,6	
				Izdanacka mešovita šuma kitnjaka (izdanacka šuma kitnjaka i lipe) -								42,5	14						14	1,9	25,0		
				jednodobna (u fazi razgradnje). Ocuvana sastojina. Mešovita sastojina								47,5	7						7	1,3	15,5		
				(smeša stablimicna) potpunog sklopa (0.7). u celini zdravstveno stanje								UKUP.	161	387	90	98	76	77	889	23,3	128,1	57,7	9,3
				sastojine je dobro. po kvalitetu malo vredna sastojina (ima do 20%																			
				tehnickog drveta). Srednja ugroženost od insekata. Srednja ugroženost od																			
				fitopatoloških oboljenja-oboljenja lista. srednje negovana sastojina.																			
				Stabla srebrna lipa su zakrivljena i sa srednjim padom precnika (srednja																			
				punodrvnost), sa srednje dugim krošnjama (dužine izmedu 1/3 i 1/2 visine																			
				stabala) i ekscentricnim krošnjama, zdravstveno stanje stabala ove vrste																			
				drveca je dobro. Stabla kitnjaka su zakrivljena i sa srednjim padom																			
				precnika (srednja punodrvnost), sa srednje dugim krošnjama (dužine izmedu																			
				1/3 i 1/2 visine stabala) i normalno razvijenim krošnjama, do 10%																			
				oštecenih stabala od insekata i fitopatoloških obolenja, suvih i																			
				suhovrhih stabala ima do 10%, zdravstveno stanje stabala ove vrste																			
11	g	60307484	4,86	drveca je dobro.																			

Ozn.mesta		gazdi-	površ-	OPIS	Osnovni taksacioni elementi						visi	deb.	Broj stabala po hektaru							G	Zapremina po		
					vrsta	sme	obr	sta-	sred.stablo		nski			Vrsta drveta						po		Vrsta drv	
ode-	od-	nska	ina		drveća	sa	ast	rost	Ds	Hs	step.	st.	1	2	3	4	5	6	svg.	ha	1	2	3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
				Put.																			
11	1	59	0,54																				
				Šuma - nalazi se na strani i na srednje strmom terenu (nagiba od 6° do	1. Kit	0,5		101	39	13,9	16	7,5			36	190	40	53	319	1,4			0,5
				10°) - nagib konveksan (ispupcen). Nadmorska visina 240 do 275m.	2. Cer	0,3			33	13,9	15	12,5		16	17	29	30	46	138	1,7		1,6	1,0
				Ekspozicija 1 istocna. Mrtvi pokrivac srednje zastupljen - povoljan	3. SrLip	0,1			18	14,2	15	17,5		16		7	7		29	0,7		2,5	
				proces humifikacije. Srednje gusta prizemna vegetacija. Gusto žbunje.	4. Gr	0,1			12	14,5	16	22,5				23			23	0,9			
				Nema zakorovljenosti. tip šume lužnjaka, graba i cera sa lipama u	5. OTL				10	14,7	16	27,5	16			33			49	2,9	5,8		
				dolinama vecih nadmorskih visina (Tilio-Carpino-Quercetum robori-cerris	6. Klen				10	14,8	16	32,5	33	23		7			62	5,1	17,3	15,5	
				collinum) na delivijumu..								37,5	23						23	2,6	20,2		
												42,5	40		7				46	6,6	42,8		6,9
				Izdanacka mešovita šuma kitnjaka (izdanacka šuma kitnjaka i cera) -								47,5	23	16					39	7,0	31,8	23,1	
				jednodobna (u fazi razgradnje). Ocuvana sastojina. Mešovita sastojina								57,5	7	16					23	5,9	15,7	35,7	
				(smeša stablimicna) potpunog sklopa (0.7). u celini zdravstveno stanje								62,5			7				7	2,0			16,3
				sastojine je dobro. po kvalitetu malo vredna sastojina (ima do 20%								UKUP.	142	88	66	288	76	99	759	36,8	133,6	78,3	24,8
				tehnickog drveta). Srednja ugroženost od insekata. Srednja ugroženost od																			
				fitopatoloških oboljenja-oboljenja lista. srednje negovana sastojina.																			
				Stabla cera su zakrivljena i sa srednjim padom precnika (srednja																			
				punodrvnost), sa srednje dugim krošnjama (dužine izmedu 1/3 i 1/2 visine																			
				stabala) i normalno razvijenim krošnjama, do 10% oštecenih stabala od																			
				insekata i fitopatoloških obolenja, suvih i suhovrhih stabala ima do 10%,																			
				zdravstveno stanje stabala ove vrste drveca je dobro. Stabla kitnjaka su																			
				zakrivljena i sa srednjim padom precnika (srednja punodrvnost), sa																			
				srednje dugim krošnjama (dužine izmedu 1/3 i 1/2 visine stabala) i																			
				normalno razvijenim krošnjama, do 10% oštecenih stabala od insekata i																			
				fitopatoloških obolenja, suvih i suhovrhih stabala ima do 10%,																			
12	a	60307144	1,36	zdravstveno stanje stabala ove vrste drveca je dobro.																			
				Šuma - nalazi se u dolini i na srednje strmom terenu (nagiba od 6° do	1. Gr	0,4		100	19	15,1	10	7,5	89	68			11	19	187	0,8	2,4	1,4	
				10°) - nagib konkavan (ugnut). Nadmorska visina 235 do 290m.	2. SrLip	0,2			19	15,5	8	12,5	61	27				3	90	1,1	5,7	1,9	
				Ekspozicija 1 jugoistocna. Mrtvi pokrivac srednje zastupljen - povoljan	3. Kit	0,3			39	22,4	9	17,5	47	4	4			1	57	1,4	8,8	0,8	0,9
				proces humifikacije. Srednje gusta prizemna vegetacija. Srednje gusto	4. Cer	0,1			42	21,1	9	22,5	68	7				1	76	3,0	23,3	2,3	
				žbunje. Nema zakorovljenosti. tip šuma kitnjaka i graba sa lazarkinjom	5. OTL	0,1			26	17,7	10	27,5	31	7	3				42	2,5	17,3	4,0	2,1
				(Querco - Carpinetum asperulosum) na gajnjaci do lesiviranoj gajnjaci i	6. Klen				9	9,5	10	32,5	28	9	7	3			47	3,9	22,1	6,7	5,6
				lesiviranom smedem zemljištu na serpentinitu ..								37,5	10	6	15	1			32	3,5	10,7	5,9	18,5
												42,5	14	11	14	3	1		43	6,0	17,9	15,6	22,7
				Izdanacka mešovita šuma graba (izdanacka šuma graba, kitnjaka i cera) -								47,5		10	9	4			23	4,0		17,3	18,0
				jednodobna (u fazi razgradnje). Ocuvana sastojina. Mešovita sastojina								52,5		5	6	1	3		15	3,2		11,0	15,8
				(smeša stablimicna) gustog sklopa (0.8 - 0.9). u celini zdravstveno								57,5			1		3		4	1,1			3,8
				stanje sastojine je dobro. po kvalitetu malo vredna sastojina (ima do 20%								UKUP.	348	154	59	13	18	23	615	30,6	108,2	66,7	87,5
				tehnickog drveta). Srednja ugroženost od insekata. Srednja ugroženost od																			
				fitopatoloških oboljenja-oboljenja lista. srednje negovana sastojina.																			
				Stabla cera su zakrivljena i sa srednjim padom precnika (srednja																			
				punodrvnost), sa srednje dugim krošnjama (dužine izmedu 1/3 i 1/2 visine																			
				stabala) i normalno razvijenim krošnjama, do 10% oštecenih stabala od																			
				insekata i fitopatoloških obolenja, suvih i suhovrhih stabala ima do 10%,																			
				zdravstveno stanje stabala ove vrste drveca je dobro. Stabla kitnjaka su																			
				zakrivljena i sa srednjim padom precnika (srednja punodrvnost), sa																			

ОПИС СТАНИШТА И САСТОЈИНА

Ozn.mesta		gazdi-	površ-	OPIS	Osnovni taksacioni elementi						visi	deb.	Broj stabala po hektaru							G	Zapremina po		
ode-	od-	nska	ina		vrsta	sme	obr	sta-	sred.stablo		nski			Vrsta drveta						po		Vrsta drv	
ljenje	sek	klasa	ha		drveća	sa	ast	rost	Ds	Hs	step.	st.	1	2	3	4	5	6	svg.	ha	1	2	3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
				srednje dugim krošnjama (dužine izmedu 1/3 i 1/2 visine stabala) i																			
				normalno razvijenim krošnjama, do 10% oštecenih stabala od insekata i																			
				fitopatoloških obolenja, suvih i suhovrhih stabala ima do 10%,																			
12	b	60176261	19,25	zdravstveno stanje stabala ove vrste drveca je osrednje.																			

Ozn.mesta		gazdi-	površ-	OPIS	Osnovni taksacioni elementi						visi	deb.	Broj stabala po hektaru							G	Zapremina po		
ode-	od-	nska	ina		vrsta	sme	obr	sta-	sred.stablo		nski			Vrsta drveta						po		Vrsta drv	
ljenje	sek	klasa	ha		drveća	sa	ast	rost	Ds	Hs	step.	st.	1	2	3	4	5	6	svg.	ha	1	2	3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
				Šuma - nalazi se na strani i na srednje strmom terenu (nagiba od 6° do	1. Kit	0,7		100	35	21,6	9	7,5		25	11	8	5	7	55	0,2		1,0	0,3
				10°) - nagib konkavan (ugnut). Nadmorska visina 270 do 295m.	2. SrLip	0,2			21	16,2	8	12,5		37	8	7	7	2	60	0,7		3,4	0,4
				Ekspozicija 1 istocna. Mrtvi pokrivac srednje zastupljen - povoljan	3. OTL	0,1			23	18,6	12	17,5		18		3	8		29	0,7		3,2	
				proces humifikacije. Srednje gusta prizemna vegetacija. Gusto žbunje.	4. Klen				16	17,6	11	22,5	5	10					15	0,6	1,9	3,4	
				Nema zakorovljenosti. tip šume kitnjaka (Quercetum montanum cariecetosum	5. Tre				13	17,1	14	27,5	29	11		7			47	2,8	18,4	4,8	
				pilosae) na gajnjaci do lesiviranoj gajnjaci..	6. Gr				9	15,4	11	32,5	38	8	3				49	4,1	34,7	5,6	2,7
												37,5	59	2					61	6,7	72,9	2,0	
				Izdanacka mešovita šuma kitnjaka (izdanacka šuma kitnjaka i lipe) -								42,5	31	7	3				41	5,8	50,9	9,4	5,1
				jednodobna (u fazi razgradnje). Ocuvana sastojina. Mešovita sastojina								47,5	3	15	3				21	3,8	7,2	26,1	6,2
				(smeša stablimicna) potpunog sklopa (0.7). u celini zdravstveno stanje								67,5			2				2	0,6			6,6
				sastojine je dobro. po kvalitetu malo vredna sastojina (ima do 20%								UKUP.	166	132	31	25	20	8	381	26,0	186,1	58,9	21,2
				tehnickog drveta). Srednja ugroženost od insekata. Srednja ugroženost od																			
				fitopatoloških oboljenja-oboljenja lista. srednje negovana sastojina.																			
				Stabla srebrna lipa su zakrivljena i sa srednjim padom precnika (srednja																			
				punodrvnost), sa srednje dugim krošnjama (dužine izmedu 1/3 i 1/2 visine																			
				stabala) i ekscentricnim krošnjama, zdravstveno stanje stabala ove vrste																			
				drveca je dobro. Stabla kitnjaka su zakrivljena i sa srednjim padom																			
				precnika (srednja punodrvnost), sa srednje dugim krošnjama (dužine izmedu																			
				1/3 i 1/2 visine stabala) i normalno razvijenim krošnjama, do 10%																			
				oštecenih stabala od insekata i fitopatoloških obolenja, suvih i																			
				suhovrhih stabala ima do 10%, zdravstveno stanje stabala ove vrste																			
12	c	60307484	2,50	drveca je dobro.																			
				Šuma - nalazi se na strani i na srednje strmom terenu (nagiba od 6° do	1. Kit	0,5		100	38	21,7	10	7,5		129	147	8	8	8	300	1,3		3,5	2,7
				10°) - nagib konveksan (ispupcen). Nadmorska visina 250 do 285m.	2. SrLip	0,3			20	15,3	8	12,5		20	53		8	3	84	1,0		1,4	4,6
				Ekspozicija 1 jugoistocna. Mrtvi pokrivac srednje zastupljen - povoljan	3. Gr	0,1			13	11,6	11	17,5			36	3			39	0,9			5,8
				proces humifikacije. Srednje gusta prizemna vegetacija. Retko žbunje.	4. Klen				10	9,7	10	22,5		8	23				31	1,2		2,9	7,7
				Nema zakorovljenosti. tip šume kitnjaka (Quercetum montanum cariecetosum	5. OTL				10	9,5	10	27,5	16	3	21				41	2,4	9,7	1,5	11,3
				pilosae) na gajnjaci do lesiviranoj gajnjaci..	6. PBr				9	8,5	10	32,5	11	34	10				55	4,6	8,5	24,3	6,9
												37,5	68	13	3				84	9,3	78,3	13,7	3,5
				Izdanacka mešovita šuma kitnjaka (izdanacka šuma kitnjaka i lipe) -								42,5	33	8					41	5,7	50,2	10,7	
				jednodobna (u fazi razgradnje). Ocuvana sastojina. Mešovita sastojina								47,5	15	11					26	4,6	30,9	19,2	
				(smeša stablimicna) potpunog sklopa (0.7). u celini zdravstveno stanje								52,5		11					11	2,4		26,4	
				sastojine je osrednje. po kvalitetu malo vredna sastojina (ima do 20%								57,5		3					3	0,8		8,3	
				tehnickog drveta). Srednja ugroženost od insekata. Srednja ugroženost od								UKUP.	143	241	293	11	16	11	715	34,4	177,7	111,9	42,5
				fitopatoloških oboljenja-oboljenja lista. srednje negovana sastojina.																			
				Stabla srebrna lipa su zakrivljena i sa srednjim padom precnika (srednja																			
				punodrvnost), sa srednje dugim krošnjama (dužine izmedu 1/3 i 1/2 visine																			
				stabala) i ekscentricnim krošnjama, zdravstveno stanje stabala ove vrste																			
				drveca je dobro. Stabla kitnjaka su zakrivljena i sa srednjim padom																			
				precnika (srednja punodrvnost), sa srednje dugim krošnjama (dužine izmedu																			
				1/3 i 1/2 visine stabala) i normalno razvijenim krošnjama, do 10%																			
				oštecenih stabala od insekata i fitopatoloških obolenja, suvih i																			
				suhovrhih stabala ima do 10%, zdravstveno stanje stabala ove vrste																			
12	d	60307484	2,14	drveca je osrednje.																			
				Šuma - nalazi se na strani i na srednje strmom terenu (nagiba od 6° do	1. Kit	0,6		100	37	20,5	10	7,5		85	25	7	59	20	195	0,9		2,2	0,6
				10°) - nagib konveksan (ispupcen). Nadmorska visina 270 do 305m.	2. SrLip	0,2			17	12,6	8	12,5	8	79	13		30		130	1,6	0,4	7,0	0,9
				Ekspozicija 1 jugozapadna. Mrtvi pokrivac srednje zastupljen - povoljan	3. Gr	0,1			18	13,1	10	17,5		26	10				36	0,9		4,4	2,0
				proces humifikacije. Srednje gusta prizemna vegetacija. Srednje gusto	4. OTL	0,1			33	19,3	10	22,5	8		7				15	0,6	2,7		2,7

ОПИС СТАНИШТА И САСТОЈИНА

Ozn.mesta		gazdi-	površ-	OPIS	Osnovni taksacioni elementi						visi	deb.	Broj stabala po hektaru							G	Zapremina po		
ode-	od-	nska	ina		vrsta	sme	obr	sta-	sred.stablo		nski			Vrsta drveta						po		Vrsta drv	
ljenje	sek	klasa	ha		drveća	sa	ast	rost	Ds	Hs	step.	st.	1	2	3	4	5	6	svg.	ha	1	2	3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
				žbunje. Nema zakorovljenosti. tip šume kitnjaka (Quercetum montanum	5. Klen				9	7,2	10	27,5	12	15	20				46	2,7	6,9	7,4	9,3
				cariecetosum pilosae) na gajnjaci do lesiviranoj gajnjaci..	6. PBr				8	5,7	10	32,5	31	15	7				53	4,4	26,9	10,6	4,9
												37,5	48	20					67	7,4	58,2	19,3	
				Izdanacka mešovita šuma kitnjaka (izdanacka šuma kitnjaka i lipe) -								42,5	15	16					31	4,4	23,1	22,6	
				jednodobna (u fazi razgradnje). Ocuvana sastojina. Mešovita sastojina								47,5	26						26	4,6	52,6		
				(smeša stablimicna) potpunog sklopa (0.7). u celini zdravstveno stanje								52,5	3						3	0,7	8,7		
				sastojine je osrednje. po kvalitetu malo vredna sastojina (ima do 20%								57,5	7			7			13	3,5	20,6		
				tehnickog drveta). Srednja ugroženost od insekata. Srednja ugroženost od								UKUP.	158	256	81	13	89	20	616	31,7	200,1	73,4	20,4
				fitopatoloških oboljenja-oboljenja lista. srednje negovana sastojina.																			
				Stabla srebrna lipa su zakrivljena i sa srednjim padom precnika (srednja																			
				punodrvnost), sa srednje dugim krošnjama (dužine izmedu 1/3 i 1/2 visine																			
				stabala) i ekscentricnim krošnjama, zdravstveno stanje stabala ove vrste																			
				drveca je dobro. Stabla kitnjaka su zakrivljena i sa srednjim padom																			
				precnika (srednja punodrvnost), sa srednje dugim krošnjama (dužine izmedu																			
				1/3 i 1/2 visine stabala) i normalno razvijenim krošnjama, do 10%																			
				oštecenih stabala od insekata i fitopatoloških obolenja, suvih i																			
				suhovrhih stabala ima do 10%, zdravstveno stanje stabala ove vrste																			
12	e	60307484	2,31	drveca je osrednje.																			
				Put.																			
12	1	60	0,27																				

Ozn.mesta		gazdi-	površ-	OPIS	Osnovni taksacioni elementi						visi	deb.	Broj stabala po hektaru							G	Zapremina po		
ode-	od-	nska	ina		vrsta	sme	obr	sta-	sred.stablo		nski			Vrsta drveta						po		Vrsta drv	
ljenje	sek	klasa	ha		drveća	sa	ast	rost	Ds	Hs	step.	st.	1	2	3	4	5	6	svg.	ha	1	2	3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
				Šuma - nalazi se u dolini i na blago nagnutom terenu (nagiba do 5°) -	1. SrLip	0,4		79	24	16,4	8	7,5	52			17	5	25	99	0,4	1,3		
				nagib konkavan (ugnut). Nadmorska visina 295 do 325m. Ekspozicija 1 bez	2. Kit	0,4			34	20,7	9	12,5	37	5			10	5	57	0,7	3,0	0,6	
				jasno izražene ekspozicije. Mrtvi pokrivac srednje zastupljen - povoljan	3. Tre	0,1			46	22,3	13	17,5	10	5			5		20	0,5	1,9	1,2	
				proces humifikacije. Retka prizemna vegetacija. Retko žbunje. Nema	4. OTL	0,1			20	15,5	10	22,5		5	5				10	0,4		1,9	2,0
				zakorovljenosti. tip šume kitnjaka, graba i cera (Carpino-Quercetum	5. Gr				16	13,2	10	27,5	10	5			5		20	1,2	4,7	2,6	
				petraeae-cerris typicum) na intervalu zemljišta od pararendzine na lesu i	6. PBr				8	7,8	10	32,5	22	27					50	4,1	16,9	23,6	
				laporcu do lesivirane gajnjace ..								37,5	20	54		12			86	9,5	20,8	70,4	
												42,5	20	10					30	4,2	28,3	14,9	
				Izdanacka mešovita šuma lipa (izdanacka šuma lipa i kitnjaka) -								47,5	15	5					20	3,5	26,0	12,0	
				jednodobna (u optimalnoj fazi). Ocuvana sastojina. Mešovita sastojina								52,5	5		10				15	3,2	10,9		24,6
				(smeša stablimicna) potpunog sklopa (0.7). u celini zdravstveno stanje								57,5			5				5	1,3			14,1
				sastojine je dobro. po kvalitetu malo vredna sastojina (ima do 20%								UKUP.	191	116	20	30	25	30	411	29,1	113,7	127,2	40,8
				tehnickog drveta). Srednja ugroženost od insekata. Srednja ugroženost od																			
				fitopatoloških oboljenja-oboljenja lista. srednje negovana sastojina. 0.																			
				Stabla srebrna lipa su zakrivljena i sa srednjim padom precnika (srednja																			
				punodrvnost), sa srednje dugim krošnjama (dužine izmedu 1/3 i 1/2 visine																			
				stabala) i ekscentricnim krošnjama, zdravstveno stanje stabala ove vrste																			
				drveca je dobro. Stabla kitnjaka su zakrivljena i sa srednjim padom																			
				precnika (srednja punodrvnost), sa srednje dugim krošnjama (dužine izmedu																			
				1/3 i 1/2 visine stabala) i normalno razvijenim krošnjama, do 10%																			
				oštecenih stabala od insekata i fitopatoloških obolenja, suvih i																			
				suhovrhih stabala ima do 10%, zdravstveno stanje stabala ove vrste																			
13	a	60288246	2,05	drveca je dobro.																			
				Šuma - nalazi se na strani i na srednje strmom terenu (nagiba od 6° do	1. SrLip	0,4		79	17	13,6	9	7,5	210		42	27	32	39	349	1,5	4,5		0,8
				10°) - nagib konkavan (ugnut). Nadmorska visina 265 do 345m.	2. Kit	0,4			34	19,2	11	12,5	38		27	17	11		93	1,1	2,4		1,8
				Ekspozicija 1 istok - jugoistok. Mrtvi pokrivac srednje zastupljen -	3. OTL	0,1			15	13,1	11	17,5	33				5		38	0,9	4,8		
				povoljan proces humifikacije. Retka prizemna vegetacija. Srednje gusto	4. Tre				15	12,5	14	22,5	27	2		6	5		40	1,6	7,8	0,7	
				žbunje. Nema zakorovljenosti. tip šume kitnjaka (Quercetum montanum	5. Cjas				11	10,2	10	27,5	24	29					54	3,2	11,6	15,5	
				typicum) na kiselom smedem i lesiviranom kiselom smedjem zemljištu..	6. Gr				8	7,2	10	32,5	21	39					60	5,0	15,6	31,8	
												37,5	24	49	5				79	8,7	22,2	54,4	6,9
				Izdanacka mešovita šuma lipa (izdanacka šuma lipa i kitnjaka) -								42,5	11	6	11				27	3,9	15,0	8,0	17,5
				jednodobna (u optimalnoj fazi). Ocuvana sastojina. Mešovita sastojina								47,5	11			6			17	2,9	19,7		
				(smeša stablimicna) gustog sklopa (0.8 - 0.9). u celini zdravstveno								52,5	6						6	1,2	11,5		
				stanje sastojine je osrednje. po kvalitetu malo vredna sastojina (ima do								UKUP.	405	126	85	55	54	39	762	30,1	115,0	110,4	27,0
				20% tehnickog drveta). Srednja ugroženost od insekata. Srednja ugroženost																			
				od fitopatoloških oboljenja-oboljenja lista. srednje negovana sastojina.																			
				Stabla srebrna lipa su zakrivljena i sa srednjim padom precnika (srednja																			
				punodrvnost), sa srednje dugim krošnjama (dužine izmedu 1/3 i 1/2 visine																			
				stabala) i ekscentricnim krošnjama, zdravstveno stanje stabala ove vrste																			
				drveca je dobro. Stabla kitnjaka su zakrivljena i sa srednjim padom																			
				precnika (srednja punodrvnost), sa srednje dugim krošnjama (dužine izmedu																			
				1/3 i 1/2 visine stabala) i normalno razvijenim krošnjama, do 10%																			
				oštecenih stabala od insekata i fitopatoloških obolenja, suvih i																			
				suhovrhih stabala ima do 10%, zdravstveno stanje stabala ove vrste																			
13	b	60288482	9,45	drveca je osrednje.																			
				Šuma - nalazi se na strani i na blago nagnutom terenu (nagiba do 5°) -	1. SrLip	0,4		94	22	15,5	9	7,5	104		98	6	13	12	233	1,0	2,4		2,3
				nagib ujednacen. Nadmorska visina 250 do 295m. Ekspozicija 1 bez jasno	2. Kit	0,3			40	22,7	10	12,5	14		34			2	50	0,6	0,9		2,7
				izražene ekspozicije. Mrtvi pokrivac srednje zastupljen - proces	3. Gr	0,2			18	12,9	12	17,5	4		24		2		31	0,7	0,8		4,5

Ozn.mesta		gazdi-	površ-	OPIS	Osnovni taksacioni elementi						visi	deb.	Broj stabala po hektaru							G	Zapremina po		
ode-	od-	nska	ina		vrsta	sme	obr	sta-	sred.stablo		nski			Vrsta drveta						po		Vrsta drv	
ljenje	sek	klasa	ha		drveća	sa	ast	rost	Ds	Hs	step.	st.	1	2	3	4	5	6	svg.	ha	1	2	3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
				humifikacije vrlo povoljan. Nema prizemne vegetacije. Srednje gusto	4. OTL	0,1			32	18,9	11	22,5	8		29				36	1,4	2,4		8,7
				žbunje. Nema zakorovljenosti. tip šume lužnjaka, graba i cera sa lipama u	5. Klen				9	7,8	10	27,5	2		33	6			41	2,4	1,0		15,7
				dolinama vecih nadmorskih visina (Tilio-Carpino-Quercetum robori-cerris	6. PBr				8	7,2	11	32,5		8	24				32	2,6		5,8	18,1
				collinum) na delivijumu..								37,5	12	19	15				46	5,1	11,7	23,6	13,9
												42,5	9	16	2				27	3,9	12,1	27,6	2,6
				Izdanacka mešovita šuma lipa (izdanacka šuma lipa i kitnjaka) -								47,5	17	6					22	3,9	28,4	10,4	
				jednodobna (u fazi razgradnje). Ocuvana sastojina. Mešovita sastojina								52,5	6			8			13	2,8	11,0		
				(smeša stablimicna) potpunog sklopa (0.7). u celini zdravstveno stanje								57,5	10	2					12	3,1	25,6	6,9	
				sastojine je dobro. po kvalitetu malo vredna sastojina (ima do 20%								62,5	8						8	2,4	23,2		
				tehnickog drveta). Srednja ugroženost od insekata. Srednja ugroženost od								67,5	2						2	0,8	8,1		
				fitopatoloških oboljenja-oboljenja lista. srednje negovana sastojina.								UKUP.	195	50	259	19	15	14	553	30,8	127,4	74,2	68,5
				Stabla graba su kriva i sa velikim padom precnika (mala punodrvnost), sa																			
				dugim krošnjama (dužine izmedu 1/2 i 2/3 visine stabala) i ekscentricnim																			
				krošnjama, zdravstveno stanje stabala ove vrste drveca je dobro. Stabla																			
				srebrna lipa su zakrivljena i sa srednjim padom precnika (srednja																			
				punodrvnost), sa srednje dugim krošnjama (dužine izmedu 1/3 i 1/2 visine																			
				stabala) i ekscentricnim krošnjama, zdravstveno stanje stabala ove vrste																			
				drveca je dobro. Stabla kitnjaka su zakrivljena i sa srednjim padom																			
				precnika (srednja punodrvnost), sa srednje dugim krošnjama (dužine izmedu																			
				1/3 i 1/2 visine stabala) i normalno razvijenim krošnjama, do 10%																			
				oštecenih stabala od insekata i fitopatoloških obolenja, suvih i																			
				suhovrhih stabala ima do 10%, zdravstveno stanje stabala ove vrste																			
13	c	60288144	11,16	drveca je dobro.																			

ОПИС СТАНИШТА И САСТОЈИНА

Ozn.mesta		gazdi-	površ-	OPIS	Osnovni taksacioni elementi						visi	deb.	Broj stabala po hektaru							G	Zapremina po		
ode-	od-	nska	ina		vrsta	sme	obr	sta-	sred.stablo		nski			Vrsta drveta						po		Vrsta drv	
ljenje	sek	klasa	ha		drveća	sa	ast	rost	Ds	Hs	step.	st.	1	2	3	4	5	6	svg.	ha	1	2	3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
				Šuma - nalazi se na strani i na strmom terenu (nagiba od 11° do 15°) -	1. Kit	0,6		99	25	16,9	10	7,5	14		77	145	28	90	353	1,6	0,3		1,9
				nagib konveksan (ispupcen). Nadmorska visina 270 do 345m. Ekspozicija 1	2. Cer	0,2			33	20,4	9	12,5	14		63	14	14		105	1,3	1,3		5,0
				jug - jugoistok. Mrtvi pokrivac srednje zastupljen - povoljan proces	3. SrLip	0,1			14	11,6	7	17,5	55		14	14			83	2,0	9,5		2,2
				humifikacije. Srednje gusta prizemna vegetacija. Srednje gusto žbunje.	4. Cjas				9	7,4	10	22,5	69	7	7		7		89	3,6	22,4	2,8	2,3
				Srednja zakorovljenost. tip šume razlicitih hrastova sa crnim jasenom	5. Klen				11	9,5	10	27,5	90						90	5,3	50,5		
				(Orno-Polyquercetum) na slabo razvijenim zemljištima na krecnjacima i	6. OTL				8	6,3	9	32,5	55	14	14				83	6,9	46,3	13,5	11,0
				bazicnim silikatnim stenama..								37,5	28	21					49	5,4	30,7	27,0	
												42,5			7				7	1,0			10,3
				Izdanacka mešovita šuma kitnjaka (izdanacka šuma kitnjaka i cera) -								UKUP.	325	41	181	173	48	90	858	27,0	161,0	43,4	32,9
				jednodobna (u fazi razgradnje). Ocuvana sastojina. Mešovita sastojina																			
				(smeša stablimicna) potpunog sklopa (0.7). u celini zdravstveno stanje																			
				sastojine je osrednje. po kvalitetu malo vredna sastojina (ima do 20%																			
				tehnickog drveta). Srednja ugroženost od insekata. Srednja ugroženost od																			
				fitopatoloških oboljenja-oboljenja lista. srednje negovana sastojina.																			
				Stabla cera su zakrivljena i sa velikim padom precnika (mala																			
				punodrvnost), sa dugim krošnjama (dužine izmedu 1/2 i 2/3 visine stabala)																			
				i ekscentricnim krošnjama, do 10% oštecenih stabala od insekata i																			
				fitopatoloških obolenja, suvih i suhovrhih stabala ima do 10%,																			
				zdravstveno stanje stabala ove vrste drveca je dobro. Stabla kitnjaka su																			
				zakrivljena i sa srednjim padom precnika (srednja punodrvnost), sa dugim																			
				krošnjama (dužine izmedu 1/2 i 2/3 visine stabala) i ekscentricnim																			
				krošnjama, od 11-25% oštecenih stabala od insekata i fitopatoloških																			
				obolenja, suvih i sihovrhih stabala ima od 11-25%, zdravstveno stanje																			
13	d	60307371	4,94	stabala ove vrste drveca je osrednje.																			
				Livada.																			
13	1	60	0,77																				
				Livada.																			
13	2	60	0,25																				
				Livada.																			
13	3	59	0,27																				
				Livada.																			
13	4	60	1,06																				
				Put.																			
13	5	60	0,23																				
				Šuma - nalazi se na ravnom terenu. i na blago nagnutom terenu (nagiba do	1. SrLip	0,7		100	18	14,4	6	7,5	275		47	42	10	10	384	1,7	6,9		1,1
				5°) - nagib ujednacen. Nadmorska visina 385 do 420m. Ekspozicija 1 bez	2. Kit	0,3			37	22,7	8	12,5	33		29	10			71	0,9	2,2		1,9
				jasno izražene ekspozicije. Mrtvi pokrivac srednje zastupljen - povoljan	3. Tre				10	8,6	11	17,5	10		10				20	0,5	1,4		1,8
				proces humifikacije. Retka prizemna vegetacija. Retko žbunje. Slaba	4. Cjas				11	8,9	8	22,5	20			10			30	1,2	6,2		

ОПИС СТАНИШТА И САСТОЈИНА

Ozn.mesta		gazdi-	površ-	OPIS	Osnovni taksacioni elementi						visi	deb.	Broj stabala po hektaru							G	Zapremina po		
ode-	od-	nska	ina		vrsta	sme	obr	sta-	sred.stablo		nski			Vrsta drveta						po		Vrsta drv	
ljenje	sek	klasa	ha		drveća	sa	ast	rost	Ds	Hs	step.	st.	1	2	3	4	5	6	svg.	ha	1	2	3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
				zakorovljenost. tip šume kitnjaka (Quercetum montanum cariecetosum	5. Klen				8	6,0	8	27,5	30	14					44	2,6	17,8	7,6	
				pilosae) na gajnjaci do lesiviranoj gajnjaci..	6. Gr				8	6,0	8	32,5	18	18					36	2,9	14,6	15,0	
												37,5	52	19					71	7,9	57,1	22,9	
				Izdanacka mešovita šuma lipa (izdanacka šuma lipa i kitnjaka) -								42,5	43	13					57	8,1	66,9	22,7	
				jednodobna (u fazi razgradnje). Ocuvana sastojina. Mešovita sastojina								47,5	19	10					29	5,1	36,6	20,7	
				(smeša stablimicna) potpunog sklopa (0.7). u celini zdravstveno stanje								UKUP.	501	73	85	61	10	10	740	30,8	209,9	88,8	4,7
				sastojine je osrednje. po kvalitetu sastojina bez vrednosti (bez ucešca																			
				tehnickog drveta). Srednja ugroženost od insekata. Srednja ugroženost od																			
				fitopatoloških oboljenja-oboljenja kore. srednje negovana sastojina.																			
				Stabla srebrna lipa su zakrivljena i sa srednjim padom precnika (srednja																			
				punodrvnost), sa srednje dugim krošnjama (dužine izmedu 1/3 i 1/2 visine																			
				stabala) i ekscentricnim krošnjama, do 10% oštecenih stabala od vetra,																			
				snega i leda, zdravstveno stanje stabala ove vrste drveca je dobro.																			
				Stabla kitnjaka su zakrivljena i sa srednjim padom precnika (srednja																			
				punodrvnost), sa srednje dugim krošnjama (dužine izmedu 1/3 i 1/2 visine																			
				stabala) i normalno razvijenim krošnjama, do 10% oštecenih stabala od																			
				insekata, do 10% oštecenih stabala od snega, zdravstveno stanje stabala																			
14	a	59288484	4,09	ove vrste drveca je osrednje.																			

Ozn.mesta		gazdi-	površ-	OPIS	Osnovni taksacioni elementi						visi	deb.	Broj stabala po hektaru							G	Zapremina po		
ode-	od-	nska	ina		vrsta	sme	obr	sta-	sred.stablo		nski			Vrsta drveta						po		Vrsta drv	
ljenje	sek	klasa	ha		drveća	sa	ast	rost	Ds	Hs	step.	st.	1	2	3	4	5	6	svg.	ha	1	2	3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
				Šuma - nalazi se na strani i na strmom terenu (nagiba od 11° do 15°) -	1. SrLip	0,6		100	16	13,8	6	7,5	280		14	20	20	20	354	1,6	7,5		0,2
				nagib konveksan (ispupcen). Nadmorska visina 320 do 400m. Ekspozicija 1	2. Kit	0,4			37	22,6	9	12,5	90		13	7			110	1,4	7,8		1,3
				istocna. Mrtvi pokrivac srednje zastupljen - povoljan proces	3. Gr				14	12,3	8	17,5	21		3				23	0,6	4,4		0,6
				humifikacije. Srednje gusta prizemna vegetacija. Srednje gusto žbunje.	4. Cjas				9	7,6	8	22,5	27	7	13				47	1,9	8,7	2,8	4,0
				Slaba zakorovljenost. tip šume kitnjaka (Quercetum montanum cariecetosum	5. OTL				8	6,3	9	27,5	22	7					28	1,7	13,4	4,1	
				pilosae) na gajnjaci do lesiviranoj gajnjaci..	6. Klen				8	6,3	8	32,5	23	30					52	4,3	19,9	25,3	
												37,5	16	20					36	4,0	16,5	25,3	
				Izdanacka mešovita šuma lipa (izdanacka šuma lipa i kitnjaka) -								42,5	43	27					70	9,9	62,3	42,1	
				jednodobna (u fazi razgradnje). Ocuvana sastojina. Mešovita sastojina								47,5	10	10					19	3,4	19,8	19,2	
				(smeša stablimicna) potpunog sklopa (0.7). u celini zdravstveno stanje								UKUP.	530	99	43	27	20	20	740	28,6	160,3	118,8	6,1
				sastojine je osrednje. po kvalitetu sastojina bez vrednosti (bez ucešca																			
				tehnickog drveta). Srednja ugroženost od insekata. Srednja ugroženost od																			
				fitopatoloških oboljenja-oboljenja kore. srednje negovana sastojina.																			
				Stabla srebrna lipa su zakrivljena i sa srednjim padom precnika (srednja																			
				punodrvnost), sa srednje dugim krošnjama (dužine izmedu 1/3 i 1/2 visine																			
				stabala) i ekscentricnim krošnjama, do 10% oštecenih stabala od insekata,																			
14	b	59288484	6,42	zdravstveno stanje stabala ove vrste drveca je dobro.																			
				Šuma - nalazi se na strani i na strmom terenu (nagiba od 11° do 15°) -	1. SrLip	0,4		100	21	16,8	6	7,5	74				18	9	102	0,4	1,9		
				nagib valovit. Nadmorska visina 310 do 385m. Ekspozicija 1 zapadna.	2. Gr	0,2			21	16,9	8	12,5	19	50					69	0,8	1,6	5,6	
				Mrtvi pokrivac srednje zastupljen - povoljan proces humifikacije. Srednje	3. Kit	0,3			36	22,5	8	17,5	47	35					81	2,0	9,1	8,5	
				gusta prizemna vegetacija. Nema žbunja. Slaba zakorovljenost. tip šume	4. Bk	0,1			38	22,8	11	22,5	19	53	18				89	3,6	6,2	22,4	8,1
				bukve i kitnjaka (Querco-Fagetum typicum) na gajnjaci do lesiviranoj	5. OTL				19	16,1	8	27,5	73	25		9	9		116	6,9	41,0	14,7	
				gajnjaci i eutricnim smedim do lesiviranim eutricnim smedjim	6. Brk				8	7,2	8	32,5	47	4			9		60	4,9	41,2	3,0	
				zemljištima..								37,5	9	12	13				34	3,8	10,8	14,5	17,6
												42,5	9		37				46	6,5	14,5		69,4
				Izdanacka mešovita šuma lipa (izdanacka šuma lipa i kitnjaka) -								47,5				9			9	1,5			
				jednodobna (u fazi razgradnje). Ocuvana sastojina. Mešovita sastojina								UKUP.	297	178	68	17	37	9	606	30,5	126,3	68,7	95,0
				(smeša stablimicna) potpunog sklopa (0.7). u celini zdravstveno stanje																			
				sastojine je osrednje. po kvalitetu sastojina bez vrednosti (bez ucešca																			
				tehnickog drveta). Srednja ugroženost od insekata. Srednja ugroženost od																			
				fitopatoloških oboljenja-oboljenja kore. pogrešno negovana sastojina.																			
				Stabla srebrna lipa su zakrivljena i sa srednjim padom precnika (srednja																			
				punodrvnost), sa srednje dugim krošnjama (dužine izmedu 1/3 i 1/2 visine																			
				stabala) i ekscentricnim krošnjama, do 10% oštecenih stabala od insekata																			
				i fitopatoloških obolenja, zdravstveno stanje stabala ove vrste drveca																			
				je dobro. Stabla kitnjaka su zakrivljena i sa srednjim padom precnika																			
				(srednja punodrvnost), sa srednje dugim krošnjama (dužine izmedu 1/3 i																			
				1/2 visine stabala) i normalno razvijenim krošnjama, do 10% oštecenih																			
				stabala od insekata, do 10% oštecenih stabala od snega, suvih i suhovrhih																			
				stabala ima do 10%, zdravstveno stanje stabala ove vrste drveca je																			
14	c	59288601	2,36	osrednje.																			
				Šuma - nalazi se na strani i na vrlo strmom terenu(nagiba od 16° do	1. SrLip	0,4		100	13	11,4	10	7,5	282	106				10	399	1,8	6,0	2,6	
				20°) - nagib konveksan (ispupcen). Nadmorska visina 345 do 410m.	2. Cjas	0,4			17	12,8	12	12,5	100	40					140	1,7	7,1	3,1	
				Ekspozicija 1 jugoistocna. Mrtvi pokrivac srednje zastupljen - povoljan	3. Kit	0,1			28	16,2	12	17,5	66	57			9		132	3,2	11,9	9,2	
				proces humifikacije. Srednje gusta prizemna vegetacija. Srednje gusto	4. Cer	0,1			43	18,4	11	22,5	38	39	19				96	3,8	10,6	12,8	6,3
				žbunje. Srednja zakorovljenost. tip šume razlicitih hrastova sa crnim	5. Klen				18	13,4	12	27,5	20	37	10				67	4,0	8,7	16,1	4,4
				jasenom (Orno-Polyquercetum) na slabo razvijenim zemljištima na	6. OTL				8	7,5	12	32,5	18	28					47	3,9	12,6	20,2	
				krecnjacima i bazicnim silikatnim stenama..								37,5			9				9	1,0			9,4

ОПИС СТАНИШТА И САСТОЈИНА

Ozn.mesta		gazdi-	površ-	OPIS	Osnovni taksacioni elementi						visi	deb.	Broj stabala po hektaru							G	Zapremina po		
ode-	od-	nska	ina		vrsta	sme	obr	sta-	sred.stablo		nski			Vrsta drveta						po		Vrsta drv	
ljenje	sek	klasa	ha		drveća	sa	ast	rost	Ds	Hs	step.	st.	1	2	3	4	5	6	svg.	ha	1	2	3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
												42,5				9			9	1,3			
				Izdanacka mešovita šuma lipa - jednodobna (u fazi razgradnje). Ocuvana								47,5	10						10	1,7	14,6		
				sastojina. Mešovita sastojina (smeša stablimicna) gustog sklopa (0.8 -								UKUP.	533	308	38	9	9	10	908	22,3	71,6	63,9	20,1
				0.9). u celini zdravstveno stanje sastojine je dobro. po kvalitetu																			
				sastojina bez vrednosti (bez ucešca tehnickog drveta). Srednja ugroženost																			
				od insekata. Srednja ugroženost od fitopatoloških oboljenja-oboljenja																			
				kore. srednje negovana sastojina. Stabla srebrna lipa su zakrivljena i																			
				sa srednjim padom precnika (srednja punodrvnost), sa srednje dugim																			
				krošnjama (dužine izmedu 1/3 i 1/2 visine stabala) i ekscentricnim																			
				krošnjama, zdravstveno stanje stabala ove vrste drveca je dobro. Stabla																			
				kitnjaka su zakrivljena i sa srednjim padom precnika (srednja																			
				punodrvnost), sa srednje dugim krošnjama (dužine izmedu 1/3 i 1/2 visine																			
				stabala) i normalno razvijenim krošnjama, do 10% oštecenih stabala od																			
				insekata, do 10% oštecenih stabala od fitopatoloških obolenja,																			
14	d	59288371	3,63	zdravstveno stanje stabala ove vrste drveca je dobro.																			

Ozn.mesta		gazdi-	površ-	OPIS	Osnovni taksacioni elementi						visi	deb.	Broj stabala po hektaru							G	Zapremina po		
ode-	od-	nska	ina		vrsta	sme	obr	sta-	sred.stablo		nski			Vrsta drveta						po		Vrsta drv	
ljenje	sek	klasa	ha		drveća	sa	ast	rost	Ds	Hs	step.	st.	1	2	3	4	5	6	svg.	ha	1	2	3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
				Šuma - nalazi se na ravnom terenu. i na blago nagnutom terenu (nagiba do	1. SrLip	0,5		79	22	15,4	9	7,5	138	41		17		11	207	0,9	2,7	0,8	
				5°) - nagib ujednacen. Nadmorska visina 330 do 355m. Ekspozicija 1 bez	2. OTL	0,3			27	17,4	11	12,5	27			19		2	48	0,6	1,6		
				jasno izražene ekspozicije. Mrtvi pokrivac srednje zastupljen - povoljan	3. Kit	0,1			42	21,1	11	17,5	22			14		2	39	0,9	3,2		
				proces humifikacije. Retka prizemna vegetacija. Srednje gusto žbunje.	4. Gr				17	13,3	10	22,5	13	2		2		2	20	0,8	4,6	0,6	
				Slaba zakorovljenost. tip šuma kitnjaka i graba sa lazarkinjom (Querco -	5. CB	0,1			63	23,8	13	27,5	32	6		11		2	51	3,0	16,2	3,4	
				Carpinetum asperulosum) na gajnjaci do lesiviranoj gajnjaci i lesiviranom	6. Tre				13	10,7	13	32,5	23		10	6			39	3,2	17,4		7,9
				smedem zemljištu na serpentinitu ..								37,5	38		4				43	4,7	37,7		5,2
												42,5	31	6	2				39	5,5	42,2	8,5	3,8
				Izdanacka mešovita šuma lipa - jednodobna (u optimalnoj fazi). Ocuvana								47,5	8		2				10	1,8	13,1		4,0
				sastojina. Mešovita sastojina (smeša stablimicna) potpunog sklopa (0.7).								52,5	16						16	3,3	32,0		
				u celini zdravstveno stanje sastojine je dobro. po kvalitetu sastojina								62,5			5		6		11	3,3			18,5
				bez vrednosti (bez ucešca tehnickog drveta). Srednja ugrožen od								67,5		11					11	3,9		49,0	
				insekata. Srednja ugroženost od vetra. srednje negovana sastojina.								77,5		6					6	2,6		33,7	
				Stabla srebrna lipa su zakrivljena i sa srednjim padom precnika (srednja								UKUP.	347	71	24	68	6	20	535	34,6	170,7	96,0	39,3
				punodrvnost), sa srednje dugim krošnjama (dužine izmedu 1/3 i 1/2 visine																			
				stabala) i ekscentricnim krošnjama, , zdravstveno stanje stabala ove																			
				vrste drveca je dobro. Stabla kitnjaka su zakrivljena i sa srednjim padom																			
				precnika (srednja punodrvnost), sa srednje dugim krošnjama (dužine izmedu																			
				1/3 i 1/2 visine stabala) i normalno razvijenim krošnjama, , ,																			
14	e	59288261	8,00	zdravstveno stanje stabala ove vrste drveca je osrednje.																			
				Šuma - nalazi se na strani i na srednje strmom terenu (nagiba od 6° do	1. SrLip	0,5		79	22	15,4	8	7,5	114		28	17	31	28	217	1,0	2,4		0,4
				10°) - nagib konkavan (ugnut). Nadmorska visina 330 do 385m.	2. Kit	0,4			29	18,9	9	12,5	3	14	14			14	45	0,5	0,3	1,6	0,7
				Ekspozicija 1 jugoistocna. Mrtvi pokrivac srednje zastupljen - povoljan	3. OTL	0,1			19	14,1	10	17,5	32	10		7			49	1,2	5,2	1,9	
				proces humifikacije. Retka prizemna vegetacija. Srednje gusto žbunje.	4. Brk				10	8,4	10	22,5	22	27					49	1,9	6,9	9,3	
				Slaba zakorovljenost. tip šume kitnjaka (Quercetum montanum typicum) na	5. Tre				8	5,9	13	27,5	43	35					78	4,6	22,7	21,8	
				kiselom smedem i lesiviranom kiselom smedjem zemljištu..	6. Klen				9	7,4	10	32,5	59	32					91	7,6	43,4	29,4	
												37,5	27	20					46	5,1	30,9	24,2	
				Izdanacka mešovita šuma kitnjaka (izdanacka šuma kitnjaka i lipe) -								42,5	14	12					26	3,7	18,5	18,7	
				jednodobna (u optimalnoj fazi). Ocuvana sastojina. Mešovita sastojina								47,5	7	7	14				28	4,9	11,6	13,6	26,4
				(smeša stablimicna) gustog sklopa (0.8 - 0.9). u celini zdravstveno								UKUP.	321	156	56	23	31	42	629	30,5	141,9	120,6	27,6
				stanje sastojine je dobro. po kvalitetu malo vredna sastojina (ima do 20%																			
				tehnickog drveta). Srednja ugroženost od insekata. Srednja ugroženost od																			
				fitopatoloških oboljenja-oboljenja kore. srednje negovana sastojina.																			
				Stabla srebrna lipa su zakrivljena i sa srednjim padom precnika (srednja																			
				punodrvnost), sa srednje dugim krošnjama (dužine izmedu 1/3 i 1/2 visine																			
				stabala) i ekscentricnim krošnjama, zdravstveno stanje stabala ove vrste																			
				drveca je dobro. Stabla kitnjaka su zakrivljena i sa srednjim padom																			
				precnika (srednja punodrvnost), sa srednje dugim krošnjama (dužine izmedu																			
				1/3 i 1/2 visine stabala) i normalno razvijenim krošnjama, ,																			
14	f	59307482	5,15	zdravstveno stanje stabala ove vrste drveca je dobro.																			
				Put.																			
14	1	59	0,38																				
				Šuma - nalazi se u uvali i na srednje strmom terenu (nagiba od 6° do	1. SrLip	0,6		100	22	17,1	6	7,5	134		58	30	29	37	288	1,3	3,5		1,3
				10°) - nagib valovit. Nadmorska visina 355 do 490m. Ekspozicija 1	2. Kit	0,2			40	22,7	9	12,5	34		17	21	8	25	106	1,3	2,7		1,6
				južna. Mrtvi pokrivac srednje zastupljen - povoljan proces humifikacije.	3. OTL	0,1			16	13,5	9	17,5	30		17	13	4		64	1,5	5,9		3,3
				Srednje gusta prizemna vegetacija. Srednje gusto žbunje. Slaba	4. Gr				14	12,5	8	22,5	29	4	4	16	4		57	2,3	11,5	1,1	1,2

ОПИС СТАНИШТА И САСТОЈИНА

Ozn.mesta		gazdi-	površ-	OPIS	Osnovni taksacioni elementi						visi	deb.	Broj stabala po hektaru							G	Zapremina po		
ode-	od-	nska	ina		vrsta	sme	obr	sta-	sred.stablo		nski			Vrsta drveta						po		Vrsta drv	
ljenje	sek	klasa	ha		drveća	sa	ast	rost	Ds	Hs	step.	st.	1	2	3	4	5	6	svg.	ha	1	2	3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
				zakorovljenost. tip šuma kitnjaka i graba sa lazarkinjom (Querco -	5. Tre				13	11,7	12	27,5	34			4	8		46	2,7	18,3		
				Carpinetum asperulosum) na gajnjaci do lesiviranoj gajnjaci i lesiviranom	6. PBr				10	8,7	9	32,5	33	8	4				45	3,8	27,8	7,2	3,3
				smedem zemljištu na serpentinitu ..								37,5	29	16	4				49	5,5	35,4	22,3	5,4
												42,5	29	17	4				50	7,1	43,4	27,4	7,5
				Izdanacka mešovita šuma lipa (izdanacka šuma lipa i kitnjaka) -								47,5	12	8					21	3,6	23,4	17,6	
				jednodobna (u fazi razgradnje). Ocuvana sastojina. Mešovita sastojina								52,5	13						13	2,7	30,6		
				(smeša stablimicna) potpunog sklopa (0.7). u celini zdravstveno stanje								57,5		4					4	1,1		13,4	
				sastojine je dobro. po kvalitetu malo vredna sastojina (ima do 20%								62,5			4				4	1,3			16,6
				tehnickog drveta). Srednja ugroženost od insekata. Srednja ugroženost od								UKUP.	376	58	112	84	53	63	746	34,0	202,5	89,0	40,2
				vetra. srednje negovana sastojina. Stabla graba su zakrivljena i sa																			
				velikim padom precnika (mala punodrvnost), sa dugim krošnjama (dužine																			
				izmedu 1/2 i 2/3 visine stabala) i preširokim krošnjama, do 10% oštecenih																			
				stabala od vetra, snega i leda, suvih i suhovrhih stabala ima do 10%,																			
				zdravstveno stanje stabala ove vrste drveca je dobro. Stabla srebrna lipa																			
				su zakrivljena i sa srednjim padom precnika (srednja punodrvnost), sa																			
				srednje dugim krošnjama (dužine izmedu 1/3 i 1/2 visine stabala) i																			
				ekscentricnim krošnjama, do 10% oštecenih stabala od vetra, snega i leda,																			
				suvih i suhovrhih stabala ima do 10%, zdravstveno stanje stabala ove																			
				vrste drveca je dobro. Stabla kitnjaka su zakrivljena i sa srednjim padom																			
				precnika (srednja punodrvnost), sa srednje dugim krošnjama (dužine izmedu																			
				1/3 i 1/2 visine stabala) i normalno razvijenim krošnjama, do 10%																			
				oštecenih stabala od vetra, snega i leda, do 10% oštecenih stabala od																			
				insekata i fitopatoloških obolenja, suvih i suhovrhih stabala ima do 10%,																			
15	a	59288261	14,89	zdravstveno stanje stabala ove vrste drveca je dobro.																			

Ozn.mesta		gazdi-	površ-	OPIS	Osnovni taksacioni elementi						visi	deb.	Broj stabala po hektaru							G	Zapremina po		
ode-	od-	nska	ina		vrsta	sme	obr	sta-	sred.stablo		nski			Vrsta drveta						po		Vrsta drv	
ljenje	sek	klasa	ha		drveća	sa	ast	rost	Ds	Hs	step.	st.	1	2	3	4	5	6	svg.	ha	1	2	3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
				Šuma - nalazi se na grebenu i na srednje strmom terenu (nagiba od 6° do	1. Kit	0,6		100	36	23,5	8	7,5	5	200	40	16	29	23	313	1,4	0,1	5,5	1,1
				10°) - nagib ujednacen. Nadmorska visina 400 do 485m. Ekspozicija 1	2. SrLip	0,3			15	12,9	8	12,5		53	17		12	23	105	1,3		3,7	1,6
				južna. Mrtvi pokrivac srednje zastupljen - povoljan proces humifikacije.	3. Cjas	0,1			14	11,6	8	17,5		12					12	0,3		1,8	
				Srednje gusta prizemna vegetacija. Srednje gusto žbunje. Srednja	4. Gr				14	11,8	8	22,5		24	12	12			48	1,9		6,1	3,5
				zakorovljenost. tip šume kitnjaka (Quercetum montanum cariecetosum	5. OTL				9	7,4	8	27,5	12	12	12				36	2,1	6,5	6,7	6,0
				pilosae) na gajnjaci do lesiviranoj gajnjaci..	6. Bk				10	8,4	10	32,5	29	29					57	4,7	24,2	19,9	
												37,5	28	17					45	4,9	33,5	16,6	
				Izdanacka mešovita šuma kitnjaka (izdanacka šuma kitnjaka i lipe) -								42,5	39	12					52	7,3	63,9	18,0	
				jednodobna (u fazi razgradnje). Ocuvana sastojina. Mešovita sastojina								47,5	5						5	0,8	10,7		
				(smeša stablimicna) vrlo gustog sklopa (1.0). u celini zdravstveno stanje								UKUP.	117	359	81	28	41	46	672	24,8	138,8	78,3	12,2
				sastojine je dobro. po kvalitetu malo vredna sastojina (ima do 20%																			
				tehnickog drveta). Srednja ugroženost od insekata. Srednja ugroženost od																			
				fitopatoloških oboljenja-oboljenja lista. srednje negovana sastojina.																			
				Stabla srebrna lipa su zakrivljena i sa srednjim padom precnika (srednja																			
				punodrvnost), sa srednje dugim krošnjama (dužine izmedu 1/3 i 1/2 visine																			
				stabala) i ekscentricnim krošnjama, zdravstveno stanje stabala ove vrste																			
				drveca je dobro. Stabla kitnjaka su zakrivljena i sa srednjim padom																			
				precnika (srednja punodrvnost), sa srednje dugim krošnjama (dužine izmedu																			
				1/3 i 1/2 visine stabala) i normalno razvijenim krošnjama, do 10%																			
				oštecenih stabala od insekata i fitopatoloških obolenja, suvih i																			
				suhovrhih stabala ima do 10%, zdravstveno stanje stabala ove vrste																			
15	b	59307484	1,61	drveca je dobro.																			
				Šuma - nalazi se na strani i na vrlo strmom terenu(nagiba od 16° do	1. SrLip	0,6		100	15	13,1	6	7,5	296		39	37	12		385	1,7	8,7		1,0
				20°) - nagib ujednacen. Nadmorska visina 445 do 485m. Ekspozicija 1	2. Kit	0,4			36	23,3	8	12,5	92		14				106	1,3	7,9		1,2
				jugozapadna. Mrtvi pokrivac srednje zastupljen - povoljan proces	3. Cjas				10	8,6	7	17,5			5				5	0,1			0,8
				humifikacije. Srednje gusta prizemna vegetacija. Srednje gusto žbunje.	4. Klen				8	6,6	7	22,5	30	5					35	1,4	8,9	1,7	
				Srednja zakorovljenost. tip šume kitnjaka (Quercetum montanum typicum) na	5. Gr				8	6,6	7	27,5	12	12					25	1,5	6,4	8,1	
				kiselom smedem zemljištu..								32,5	12						12	1,0	11,8		
												37,5	25	69					94	10,4	32,4	88,4	
				Izdanacka mešovita šuma kitnjaka (izdanacka šuma kitnjaka i lipe) -								42,5	13						13	1,8	21,3		
				jednodobna (u fazi razgradnje). Ocuvana sastojina. Mešovita sastojina								47,5		5					5	0,8		12,1	
				(smeša stablimicna) vrlo gustog sklopa (1.0). u celini zdravstveno stanje								52,5	25						25	5,4	59,8		
				sastojine je dobro. po kvalitetu malo vredna sastojina (ima do 20%								UKUP.	504	91	58	37	12		703	25,3	157,3	110,3	3,0
				tehnickog drveta). Srednja ugroženost od insekata. Srednja ugroženost od																			
				fitopatoloških oboljenja-oboljenja lista. srednje negovana sastojina.																			
				Stabla srebrna lipa su zakrivljena i sa srednjim padom precnika (srednja																			
				punodrvnost), sa srednje dugim krošnjama (dužine izmedu 1/3 i 1/2 visine																			
				stabala) i ekscentricnim krošnjama, zdravstveno stanje stabala ove vrste																			
				drveca je dobro. Stabla kitnjaka su zakrivljena i sa srednjim padom																			
				precnika (srednja punodrvnost), sa srednje dugim krošnjama (dužine izmedu																			
				1/3 i 1/2 visine stabala) i normalno razvijenim krošnjama, do 10%																			
				oštecenih stabala od insekata i fitopatoloških obolenja, suvih i																			
				suhovrhih stabala ima do 10%, zdravstveno stanje stabala ove vrste																			
15	c	59307481	1,59	drveca je dobro.																			
				Šuma - nalazi se na strani i na strmom terenu (nagiba od 11° do 15°) -	1. SrLip	0,5		100	15	10,8	10	7,5	338		75	56	48	46	562	2,5	7,1		2,0
				nagib ujednacen. Nadmorska visina 370 do 460m. Ekspozicija 1 zapadna.	2. Kit	0,4			36	19,6	11	12,5	100		18	19	19		156	1,9	6,5		2,0
				Mrtvi pokrivac srednje zastupljen - povoljan proces humifikacije. Srednje	3. Cjas	0,1			14	10,0	11	17,5	130		56				186	4,5	20,2		11,2
				gusta prizemna vegetacija. Srednje gusto žbunje. Srednja zakorovljenost.	4. Gr				10	7,2	11	22,5	63		38	9			110	4,4	18,4		11,3

ОПИС СТАНИШТА И САСТОЈИНА

Ozn.mesta		gazdi-	površ-	OPIS	Osnovni taksacioni elementi						visi	deb.	Broj stabala po hektaru							G	Zapremina po		
ode-	od-	nska	ina		vrsta	sme	obr	sta-	sred.stablo		nski			Vrsta drveta						po		Vrsta drv	
ljenje	sek	klasa	ha		drveća	sa	ast	rost	Ds	Hs	step.	st.	1	2	3	4	5	6	svg.	ha	1	2	3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
				tip šume kitnjaka (Quercetum montanum cariecetosum pilosae) na gajnjaci	5. OTL				9	6,2	11	27,5	91						91	5,4	42,7		
				do lesiviranoj gajnjaci..	6. Brk				8	5,0	11	32,5	37	46					83	6,9	26,2	38,6	
												37,5	10	37					46	5,1	8,2	41,6	
				Izdanacka mešovita šuma lipa (izdanacka šuma lipa i kitnjaka) -								42,5	10	10					19	2,7	13,1	16,3	
				jednodobna (u fazi razgradnje). Ocuvana sastojina. Mešovita sastojina								UKUP.	778	92	187	84	66	46	1253	33,3	142,3	96,5	26,6
				(smeša stablimicna) vrlo gustog sklopa (1.0). u celini zdravstveno stanje																			
				sastojine je dobro. po kvalitetu malo vredna sastojina (ima do 20%																			
				tehnickog drveta). Srednja ugroženost od insekata. Srednja ugroženost od																			
				vetra. srednje negovana sastojina. Stabla srebrna lipa su zakrivljena i																			
				sa srednjim padom precnika (srednja punodrvnost), sa srednje dugim																			
				krošnjama (dužine izmedu 1/3 i 1/2 visine stabala) i ekscentricnim																			
				krošnjama, do 10% oštecenih stabala od vetra, snega i leda, suvih i																			
				suhovrhih stabala ima do 10%, zdravstveno stanje stabala ove vrste																			
				drveca je dobro. Stabla kitnjaka su zakrivljena i sa srednjim padom																			
				precnika (srednja punodrvnost), sa srednje dugim krošnjama (dužine izmedu																			
				1/3 i 1/2 visine stabala) i normalno razvijenim krošnjama, do 10%																			
				oštecenih stabala od insekata i fitopatoloških obolenja, suvih i																			
				suhovrhih stabala ima do 10%, zdravstveno stanje stabala ove vrste																			
15	d	59288484	2,36	drveca je dobro.																			
				Put.																			
15	1	59	0,35																				

Ozn.mesta		gazdi-	površ-	OPIS	Osnovni taksacioni elementi						visi	deb.	Broj stabala po hektaru							G	Zapremina po		
ode-	od-	nska	ina		vrsta	sme	obr	sta-	sred.stablo		nski			Vrsta drveta						po		Vrsta drv	
ljenje	sek	klasa	ha		drveća	sa	ast	rost	Ds	Hs	step.	st.	1	2	3	4	5	6	svg.	ha	1	2	3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
				Šuma - nalazi se na strani i na strmom terenu (nagiba od 11° do 15°) -	1. Kit	0,5		99	36	18,8	11	7,5		195	36	77	15	46	369	1,6		4,2	0,6
				nagib valovit. Nadmorska visina 325 do 460m. Ekspozicija 1 jug -	2. SrLip	0,3			15	12,4	10	12,5		32	11	5	15	6	69	0,8		2,1	0,6
				jugozapad. Mrtvi pokrivac slabo zastupljen - povoljan proces	3. OTL	0,1			20	14,7	11	17,5		20		15	10	5	49	1,2		3,5	
				humifikacije. Srednje gusta prizemna vegetacija. Srednje gusto žbunje.	4. Cjas	0,1			14	12,0	11	22,5	22	20		30			72	2,9	7,5	6,1	
				tip šume kitnjaka (Quercetum montanum cariecetosum pilosae) na gajnjaci	5. Brk				12	10,9	11	27,5	15	16		5			36	2,1	8,0	6,4	
				do lesiviranoj gajnjaci..	6. Gr				9	8,7	11	32,5	37	25	6	5			73	6,0	29,6	18,2	4,0
												37,5	21	21					42	4,6	21,2	19,7	
				Izdanacka mešovita šuma kitnjaka (izdanacka šuma kitnjaka i lipe) -								42,5	20						20	2,8	31,8		
				jednodobna (u fazi razgradnje). Ocuvana sastojina. Mešovita sastojina								47,5	11		10				21	3,6	19,5		20,7
				(smeša stablimicna) vrlo gustog sklopa (1.0). u celini zdravstveno stanje								52,5		10	5				15	3,3		21,2	12,9
				sastojine je dobro. po kvalitetu malo vredna sastojina (ima do 20%								62,5	11						11	3,4	41,5		
				tehnickog drveta). Srednja ugroženost od insekata. Srednja ugroženost od								UKUP.	137	339	67	136	41	56	776	32,4	159,0	81,3	38,9
				fitopatoloških oboljenja-oboljenja kore. srednje negovana sastojina.																			
				Stabla srebrna lipa su zakrivljena i sa srednjim padom precnika (srednja																			
				punodrvnost), sa srednje dugim krošnjama (dužine izmedu 1/3 i 1/2 visine																			
				stabala) i ekscentricnim krošnjama, od vetra, snega i leda, zdravstveno																			
				stanje stabala ove vrste drveca je dobro. Stabla kitnjaka su zakrivljena																			
				i sa srednjim padom precnika (srednja punodrvnost), sa srednje dugim																			
				krošnjama (dužine izmedu 1/3 i 1/2 visine stabala) i normalno razvijenim																			
				krošnjama, do 10% oštecenih stabala od vetra, snega i leda, do 10%																			
				oštecenih stabala od insekata i fitopatoloških obolenja, suvih i																			
				suhovrhih stabala ima do 10%, zdravstveno stanje stabala ove vrste																			
16	a	59307484	10,79	drveca je dobro.																			
				Šuma - nalazi se na strani i na vrlo strmom terenu(nagiba od 16° do	1. Cer	0,4		99	36	16,5	12	7,5	11	189		265	11	11	487	2,2	0,3	3,8	
				20°) - nagib ujednacen. Nadmorska visina 325 do 415m. Ekspozicija 1	2. SrLip	0,3			14	11,1	11	12,5		45		33			78	1,0		2,9	
				istok - jugoistok. Mrtvi pokrivac slabo zastupljen - povoljan proces	3. Kit	0,2			28	15,4	13	17,5		23	11	11			44	1,1		3,0	2,1
				humifikacije. Srednje gusta prizemna vegetacija. Srednje gusto žbunje.	4. Cjas	0,1			9	8,2	13	22,5		33		11			44	1,8		8,4	
				tip šume kitnjaka i cera sa bogatim spratom žbunja (Quercetum	5. Tre				8	7,1	17	27,5	11	11	45				66	3,9	6,3	4,9	18,1
				petraea-cerris galietosum) na rendiznama, pararendzinama, posmedenim	6. Gr				8	7,1	13	32,5		22	11				33	2,7		16,2	6,5
				pararendzinama, plitkim eutricnim smedjim zemljištima i gajnjacama..								37,5			11				11	1,3			13,2
												42,5	23	11					34	4,8	29,9	14,4	
				Izdanacka mešovita šuma cera - jednodobna (u fazi razgradnje). Ocuvana								47,5	22						22	3,9	36,1		
				sastojina. Mešovita sastojina (smeša stablimicna) vrlo gustog sklopa								UKUP.	66	334	77	319	11	11	819	22,5	72,6	53,6	39,9
				(1.0). u celini zdravstveno stanje sastojine je osrednje. po kvalitetu																			
				srednjevredna sastojina (ima od 21-40% tehnickog drveta). Srednja																			
				ugroženost od insekata. Srednja ugroženost od fitopatoloških																			
				oboljenja-oboljenja kore. srednje negovana sastojina. Stabla cera su																			
				zakrivljena i sa velikim padom precnika (mala punodrvnost), sa dugim																			
				krošnjama (dužine izmedu 1/2 i 2/3 visine stabala) i ekscentricnim																			
				krošnjama, od 11-25% oštecenih stabala od insekata, od 11-25% oštecenih																			
				stabala od fitopatoloških obolenja, suvih i suhovrhih stabala ima do 10%,																			
				zdravstveno stanje stabala ove vrste drveca je osrednje. Stabla kitnjaka																			
				su zakrivljena i sa srednjim padom precnika (srednja punodrvnost), sa																			
				dugim krošnjama (dužine izmedu 1/2 i 2/3 visine stabala) i ekscentricnim																			
				krošnjama, od 11-25% oštecenih stabala od insekata, od 11-25% oštecenih																			
				stabala od fitopatoloških obolenja, suvih i suhovrhih stabala ima do 10%,																			
16	b	59196461	1,97	zdravstveno stanje stabala ove vrste drveca je osrednje.																			
				Šuma - nalazi se u dolini i - nagib ujednacen. Nadmorska visina 375 do	1. SrLip	0,9		99	31	15,2	11	7,5	60	21		33	5	5	124	0,5	1,2	0,4	

ОПИС СТАНИШТА И САСТОЈИНА

Ozn.mesta		gazdi-	površ-	OPIS	Osnovni taksacioni elementi						visi	deb.	Broj stabala po hektaru							G	Zapremina po		
ode-	od-	nska	ina		vrsta	sme	obr	sta-	sred.stablo		nski			Vrsta drveta						po		Vrsta drv	
ljenje	sek	klasa	ha		drveća	sa	ast	rost	Ds	Hs	step.	st.	1	2	3	4	5	6	svg.	ha	1	2	3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
				440m. Ekspozicija 1 južna. Mrtvi pokrivac slabo zastupljen - povoljan	2. Gr	0,1			20	11,1	12	12,5	37			4	9		51	0,6	2,7		
				proces humifikacije. Nema prizemne vegetacije. Nema žbunja. tip šuma	3. Cer				38	18,0	12	17,5				4			4	0,1			
				kitnjaka i graba sa lazarkinjom (Querco - Carpinetum asperulosum) na	4. PBr				9	4,5	12	22,5	9						9	0,4	2,2		
				gajnjaci do lesiviranoj gajnjaci i lesiviranom smedem zemljištu na	5. Mle				11	5,7	12	27,5	4						4	0,3	1,8		
				serpentinitu ..	6. Klen				8	3,5	12	32,5	9	22					31	2,5	6,0	15,1	
												37,5	18		2				21	2,3	18,3		2,6
				Izdanacka mešovita šuma lipa - jednodobna (u fazi razgradnje).								42,5	18						18	2,5	20,6		
				Razredjena sastojina. Mešovita sastojina (smeša stablimicna) nepotpunog								47,5	21						21	3,7	32,1		
				sklopa (0.5-0.6). u celini zdravstveno stanje sastojine je dobro. po								52,5	28						28	6,1	54,4		
				kvalitetu malo vredna sastojina (ima do 20% tehnickog drveta). Srednja								57,5	13						13	3,4	33,3		
				ugroženost od insekata. Srednja ugroženost od vetra. pogrešno negovana								62,5	10						10	3,0	28,4		
				sastojina. Stabla graba su zakrivljena i sa velikim padom precnika (mala								72,5	5						5	1,9	18,5		
				punodrvnost), sa dugim krošnjama (dužine izmedu 1/2 i 2/3 visine stabala)								UKUP.	231	43	2	42	14	5	337	27,2	219,3	15,5	2,6
				i uskim krošnjama, do 10% oštecenih stabala od vetra, snega i leda,																			
				zdravstveno stanje stabala ove vrste drveca je dobro. Stabla srebrna lipa																			
				su zakrivljena i sa srednjim padom precnika (srednja punodrvnost), sa																			
				srednje dugim krošnjama (dužine izmedu 1/3 i 1/2 visine stabala) i																			
				ekscentricnim krošnjama, do 10% oštecenih stabala od vetra, snega i leda,																			
16	c	59288261	1,45	zdravstveno stanje stabala ove vrste drveca je dobro.																			

Ozn.mesta		gazdi-	površ-	OPIS	Osnovni taksacioni elementi						visi	deb.	Broj stabala po hektaru							G	Zapremina po		
ode-	od-	nska	ina		vrsta	sme	obr	sta-	sred.stablo		nski			Vrsta drveta						po		Vrsta drv	
ljenje	sek	klasa	ha		drveća	sa	ast	rost	Ds	Hs	step.	st.	1	2	3	4	5	6	svg.	ha	1	2	3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
				Šuma - nalazi se na strani i na srednje strmom terenu (nagiba od 6° do	1. SrLip	0,4		99	17	14,0	8	7,5	161		87	65	51	56	420	1,9	3,4		1,8
				10°) - nagib ujednacen. Nadmorska visina 395 do 450m. Ekspozicija 1	2. Kit	0,6			36	22,7	8	12,5	40		6	3	7		55	0,7	3,1		0,4
				istocna. Mrtvi pokrivac slabo zastupljen - povoljan proces humifikacije.	3. Gr				9	7,9	9	17,5	7			3			9	0,2	0,8		
				Srednje gusta prizemna vegetacija. Srednje gusto žbunje. tip šume	4. OTL				9	8,5	9	22,5	6	13		7			26	1,0	2,4	3,9	
				kitnjaka (Quercetum montanum cariecetosum pilosae) na gajnjaci do	5. Cjas				8	7,4	9	27,5	19	7					26	1,5	10,3	4,2	
				lesiviranoj gajnjaci..	6. Tre				8	6,8	12	32,5	6	31					36	3,0	4,5	28,1	
												37,5	13	39	3				55	6,1	14,2	50,0	3,4
				Izdanacka mešovita šuma kitnjaka (izdanacka šuma kitnjaka i lipe) -								42,5	15	30					45	6,4	21,3	55,7	
				jednodobna (u fazi razgradnje). Ocuvana sastojina. Mešovita sastojina								47,5	8	7					15	2,6	14,4	17,0	
				(smeša stablimicna) vrlo gustog sklopa (1.0). u celini zdravstveno stanje								52,5	3						3	0,6	5,8		
				sastojine je dobro. po kvalitetu malo vredna sastojina (ima do 20%								57,5	3						3	0,7	6,8		
				tehnickog drveta). Srednja ugroženost od insekata. Srednja ugroženost od								67,5	3						3	1,0	11,1		
				vetra. srednje negovana sastojina. Stabla srebrna lipa su zakrivljena i								72,5	3						3	1,1	12,9		
				sa srednjim padom precnika (srednja punodrvnost), sa srednje dugim								UKUP.	285	127	96	78	58	56	698	26,8	111,1	159,0	5,5
				krošnjama (dužine izmedu 1/3 i 1/2 visine stabala) i ekscentricnim																			
				krošnjama, do 10% oštecenih stabala od vetra, snega i leda, zdravstveno																			
				stanje stabala ove vrste drveca je dobro. Stabla kitnjaka su zakrivljena																			
				i sa srednjim padom precnika (srednja punodrvnost), sa srednje dugim																			
				krošnjama (dužine izmedu 1/3 i 1/2 visine stabala) i normalno razvijenim																			
				krošnjama, do 10% oštecenih stabala od vetra, snega i leda, do 10%																			
				oštecenih stabala od insekata i fitopatoloških obolenja, zdravstveno																			
16	d	59307484	3,04	stanje stabala ove vrste drveca je osrednje.																			
				Šuma - nalazi se na strani i na srednje strmom terenu (nagiba od 6° do	1. SrLip	0,6		99	31	18,6	9	7,5	69		34	17	16	12	148	0,7	1,1		0,7
				10°) - nagib valovit. Nadmorska visina 420 do 470m. Ekspozicija 1	2. Kit	0,3			35	19,7	10	12,5			8	12		2	22	0,3			0,7
				južna. Mrtvi pokrivac slabo zastupljen - povoljan proces humifikacije.	3. Gr	0,1			17	12,5	10	17,5	4		22				27	0,6	0,7		4,4
				Srednje gusta prizemna vegetacija. Srednje gusto žbunje. tip šume	4. PBr				13	9,9	11	22,5	7	24	17	6			54	2,1	1,9	8,4	5,6
				kitnjaka i graba sa klokocikom (Querco-Carpinetum staphyletosum) na	5. Tre				17	12,6	14	27,5	7	4	10	2	2		25	1,5	3,4	2,2	5,5
				kiselom smedem do lesiviranom kiselom smedjem zemljištu..	6. OTL				8	6,4	11	32,5	18	28	2				48	3,9	14,0	24,4	2,0
												37,5	29	16					45	5,0	30,2	19,2	
				Izdanacka mešovita šuma lipa (izdanacka šuma lipa i kitnjaka) -								42,5	34	11			5		50	7,1	46,0	17,2	
				jednodobna (u fazi razgradnje). Ocuvana sastojina. Mešovita sastojina								47,5	19	10					28	5,0	32,0	19,7	
				(smeša stablimicna) potpunog sklopa (0.7). u celini zdravstveno stanje								52,5	24	4					28	6,0	49,4	11,3	
				sastojine je osrednje. po kvalitetu malo vredna sastojina (ima do 20%								57,5	9	2					11	2,8	22,4	6,8	
				tehnickog drveta). Srednja ugroženost od insekata. Srednja ugroženost od								62,5	2		2				4	1,3	6,6		6,8
				fitopatoloških oboljenja-oboljenja kore. srednje negovana sastojina.								UKUP.	220	99	96	37	23	14	488	36,2	207,7	109,2	25,7
				Stabla srebrna lipa su zakrivljena i sa srednjim padom precnika (srednja																			
				punodrvnost), sa srednje dugim krošnjama (dužine izmedu 1/3 i 1/2 visine																			
				stabala) i ekscentricnim krošnjama, od 11-25% oštecenih stabala od																			
				guljenja kore, zdravstveno stanje stabala ove vrste drveca je osrednje.																			
				Stabla kitnjaka su zakrivljena i sa srednjim padom precnika (srednja																			
				punodrvnost), sa srednje dugim krošnjama (dužine izmedu 1/3 i 1/2 visine																			
				stabala) i ekscentricnim krošnjama, do 10% oštecenih stabala od insekata																			
				i fitopatoloških obolenja, do 10% oštecenih stabala od guljenja kore,																			
16	e	59288263	4,29	zdravstveno stanje stabala ove vrste drveca je osrednje.																			
				Šuma - nalazi se na strani i na srednje strmom terenu (nagiba od 6° do	1. SrLip	0,6		99	27	17,8	9	7,5	98	6		6	18	12	141	0,6	2,1	0,1	
				10°) - nagib ujednacen. Nadmorska visina 415 do 465m. Ekspozicija 1	2. Bk	0,2			32	20,4	12	12,5		13		12	6	6	37	0,5		1,1	
				istok - jugoistok. Mrtvi pokrivac slabo zastupljen - povoljan proces	3. Kit	0,1			41	20,7	11	17,5	6	6					12	0,3	0,8	0,8	
				humifikacije. Srednje gusta prizemna vegetacija. Srednje gusto žbunje.	4. OTL	0,1			28	16,4	13	22,5	12						12	0,5	3,6		

ОПИС СТАНИШТА И САСТОЈИНА

Ozn.mesta		gazdi-	površ-	OPIS	Osnovni taksacioni elementi						visi	deb.	Broj stabala po hektaru							G	Zapremina po		
ode-	od-	nska	ina		vrsta	sme	obr	sta-	sred.stablo		nski			Vrsta drveta						po		Vrsta drv	
ljenje	sek	klasa	ha		drveća	sa	ast	rost	Ds	Hs	step.	st.	1	2	3	4	5	6	svg.	ha	1	2	3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
				tip šume bukve i kitnjaka (Querco-Fagetum typicum) na kiselom smedem i	5. Mle				9			27,5	6						6	0,4	3,2		
				lesiviranom kiselom smedjem zemljištu..	6. PBr				9	7,9	9	32,5	6	6					12	1,0	3,8	6,3	
												37,5	6	6	18				30	3,3	6,9	6,5	19,2
				Izdanacka mešovita šuma lipa - jednodobna (u fazi razgradnje). Ocuvana								42,5	24	6	6				36	5,2	33,6	8,9	9,3
				sastojina. Mešovita sastojina (smeša stablimicna) potpunog sklopa (0.7).								47,5	43		6	6			55	9,8	76,4		11,9
				u celini zdravstveno stanje sastojine je dobro. po kvalitetu malo vredna								52,5	13						13	2,7	27,4		
				sastojina (ima do 20% tehnickog drveta). Srednja ugroženost od insekata.								57,5	6	6		6			19	4,8	16,0	20,7	
				Srednja ugroženost od vetra. srednje negovana sastojina. Stabla srebrna								62,5	6						6	1,9	20,7		
				lipa su zakrivljena i sa srednjim padom precnika (srednja punodrvnost),								72,5		6					6	2,6		30,9	
				sa srednje dugim krošnjama (dužine izmedu 1/3 i 1/2 visine stabala) i								UKUP.	227	56	30	30	25	18	386	33,6	194,7	75,1	40,4
				ekscentricnim krošnjama, do 10% oštecenih stabala od vetra, snega i leda,																			
				zdravstveno stanje stabala ove vrste drveca je dobro. Stabla kitnjaka su																			
				zakrivljena i sa srednjim padom precnika (srednja punodrvnost), sa																			
				srednje dugim krošnjama (dužine izmedu 1/3 i 1/2 visine stabala) i																			
				ekscentricnim krošnjama, do 10% oštecenih stabala od vetra, snega i leda,																			
				do 10% oštecenih stabala od insekata i fitopatoloških obolenja,																			
				zdravstveno stanje stabala ove vrste drveca je dobro. Stabla bukve su																			
				zakrivljena i sa srednjim padom precnika (srednja punodrvnost), sa																			
				srednje dugim krošnjama (dužine izmedu 1/3 i 1/2 visine stabala) i																			
				ekscentricnim krošnjama, od vetra, snega i leda, zdravstveno stanje																			
16	f	59288602	1,44	stabala ove vrste drveca je dobro.																			

ОПИС СТАНИШТА И САСТОЈИНА

Ozn.mesta		gazdi-	površ-	OPIS	Osnovni taksacioni elementi						visi	deb.	Broj stabala po hektaru							G	Zapremina po		
									sred.stablo					Vrsta drveta						po		Vrsta drv	
ode-	od-	nska	ina		vrsta	sme	obr	sta-			nski								svg.				
ljenje	sek	klasa	ha		drveća	sa	ast	rost	Ds	Hs	step.	st.	1	2	3	4	5	6		ha	1	2	3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
				Put.																			
16	1	59	0,72																				
				Šuma - nalazi se na strani i na vrlo strmom terenu(nagiba od 16° do	1. SrLip	0,6		93	32	19,8	7	7,5	40		41	3	22		106	0,5	0,8		1,0
				20°) - nagib valovit. Nadmorska visina 320 do 440m. Ekspozicija 1	2. Jav	0,2			43	23,7	9	12,5	17		13	13	3		47	0,6	1,2		1,0
				zapadna. Mrtvi pokrivac srednje zastupljen - povoljan proces	3. Gr	0,1			16	11,2	9	17,5	3		12		18		33	0,8	0,4		2,2
				humifikacije. Retka prizemna vegetacija. Nema žbunja. Nema	4. Bk	0,1			22	15,6	12	22,5			3				3	0,1			1,1
				zakorovljenosti. tip šume bukve i kitnjaka (Querco-Fagetum typicum) na	5. OTL				15	11,0	9	27,5	3	3	7	6		9	29	1,7	1,8	1,9	4,2
				gajnjaci do lesiviranoj gajnjaci i eutricnim smedim do lesiviranim	6. Kit				30	19,2	9	32,5			6	3		6	15	1,2			5,2
				eutricnim smedjim zemljištima..								37,5	3	6	6	3			19	2,1	4,2	7,5	6,7
												42,5	21			3			24	3,4	32,9		
				Izdanacka mešovita šuma lipa - jednodobna (u fazi razgradnje). Ocuvana								47,5	35	13					48	8,5	69,0	27,9	
				sastojina. Mešovita sastojina (smeša stablimicna) potpunog sklopa (0.7).								52,5	14	3			3		20	4,4	31,8	9,9	
				u celini zdravstveno stanje sastojine je dobro. po kvalitetu malo vredna								57,5	6						6	1,6	18,8		
				sastojina (ima do 20% tehnickog drveta). Srednja ugroženost od insekata.								62,5	6						6	1,9	19,6		
				Srednja ugroženost od fitopatoloških oboljenja-oboljenja lista. srednje								UKUP.	149	26	89	31	47	15	356	26,8	180,5	47,3	21,3
				negovana sastojina. Stabla srebrna lipa su zakrivljena i sa srednjim																			
				padom precnika (srednja punodrvnost), sa dugim krošnjama (dužine izmedu																			
				1/2 i 2/3 visine stabala) i ekscentricnim krošnjama, do 10% oštecenih																			
				stabala od vetra, snega i leda, suvih i suhovrhih stabala ima do 10%,																			
				zdravstveno stanje stabala ove vrste drveca je dobro. Stabla kitnjaka su																			
				zakrivljena i sa srednjim padom precnika (srednja punodrvnost), sa																			
				srednje dugim krošnjama (dužine izmedu 1/3 i 1/2 visine stabala) i																			
				normalno razvijenim krošnjama, suvih i suhovrhih stabala ima do 10%,																			
				zdravstveno stanje stabala ove vrste drveca je dobro. Stabla bukve su																			
				zakrivljena i sa srednjim padom precnika (srednja punodrvnost), sa																			
				srednje dugim krošnjama (dužine izmedu 1/3 i 1/2 visine stabala) i																			
				normalno razvijenim krošnjama, do 10% oštecenih stabala od vetra, snega i																			
				leda, suvih i suhovrhih stabala ima do 10%, zdravstveno stanje stabala																			
17	a	60288601	2,65	ove vrste drveca je dobro.																			
				Šuma - nalazi se na strani i na vrlo strmom terenu(nagiba od 16° do	1. Kit	0,4		93	18	15,2	11	7,5	45	48	657	235			984	4,3	0,8	2,8	9,9
				20°) - nagib konveksan (ispupcen). Nadmorska visina 230 do 370m.	2. Cer	0,5			24	15,1	10	12,5	45			48			92	1,1	3,9		
				Ekspozicija 1 jugozapadna. Mrtvi pokrivac srednje zastupljen - povoljan	3. Cjas				8	7,9	12	17,5	178	48					226	5,4	27,0	11,2	
				proces humifikacije. Srednje gusta prizemna vegetacija. Srednje gusto	4. SrLip				8	7,8	9	22,5	223						223	8,9	69,9		
				žbunje. Nema zakorovljenosti. tip šume razlicitih hrastova sa crnim								27,5		48					48	2,8		24,8	
				jasenom (Orno-Polyquercetum) na slabo razvijenim zemljištima na								32,5		95					95	7,9		77,9	
				krecnjacima i bazicnim silikatnim stenama..								UKUP.	490	238	657	282			1667	30,5	101,4	116,6	9,9
				Izdanacka mešovita šuma cera (izdanacka šuma cera i kitnjaka) -																			
				jednodobna (u fazi razgradnje). Ocuvana sastojina. Mešovita sastojina																			
				(smeša stablimicna) vrlo gustog sklopa (1.0). u celini zdravstveno stanje																			
				sastojine je osrednje. po kvalitetu malo vredna sastojina (ima do 20%																			
				tehnickog drveta). Srednja ugroženost od insekata. Srednja ugroženost od																			
				fitopatoloških oboljenja-oboljenja lista. srednje negovana sastojina.																			
				Stabla cera su zakrivljena i sa velikim padom precnika (mala																			
				punodrvnost), sa dugim krošnjama (dužine izmedu 1/2 i 2/3 visine stabala)																			
				i ekscentricnim krošnjama, do 10% oštecenih stabala od insekata i																			

ОПИС СТАНИШТА И САСТОЈИНА

Ozn.mesta		gazdi-	površ-	OPIS	Osnovni taksacioni elementi						visi	deb.	Broj stabala po hektaru							G	Zapremina po		
ode-	od-	nska	ina		vrsta	sme	obr	sta-	sred.stablo		nski			Vrsta drveta						po		Vrsta drv	
ljenje	sek	klasa	ha		drveća	sa	ast	rost	Ds	Hs	step.	st.	1	2	3	4	5	6	svg.	ha	1	2	3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
				fitopatoloških obolenja, suvih i suhovrhih stabala ima do 10%,																			
				zdravstveno stanje stabala ove vrste drveca je osrednje. Stabla kitnjaka																			
				su zakrivljena i sa velikim padom precnika (mala punodrvnost), sa dugim																			
				krošnjama (dužine izmedu 1/2 i 2/3 visine stabala) i ekscentricnim																			
				krošnjama, do 10% oštecenih stabala od insekata i fitopatoloških																			
				obolenja, suvih i suhovrhih stabala ima do 10%, zdravstveno stanje																			
17	b	60196371	0,64	stabala ove vrste drveca je osrednje.																			

Ozn.mesta		gazdi-	površ-	OPIS	Osnovni taksacioni elementi						visi	deb.	Broj stabala po hektaru							G	Zapremina po		
ode-	od-	nska	ina		vrsta	sme	obr	sta-	sred.stablo		nski			Vrsta drveta						po		Vrsta drv	
ljenje	sek	klasa	ha		drveća	sa	ast	rost	Ds	Hs	step.	st.	1	2	3	4	5	6	svg.	ha	1	2	3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
				Šuma - nalazi se na strani i na vrlo strmom terenu(nagiba od 16° do	1. Kit	0,6		93	35	19,5	10	7,5		333	129	10	11	10	494	2,2		8,2	2,8
				20°) - nagib konveksan (ispupcen). Nadmorska visina 345 do 440m.	2. SrLip	0,4			14	11,4	9	12,5		123	16	10	11	10	170	2,1		9,2	0,9
				Ekspozicija 1 jugozapadna. Mrtvi pokrivac srednje zastupljen - povoljan	3. Cjas				8	6,9	11	17,5		26				5	31	0,8		4,0	
				proces humifikacije. Srednje gusta prizemna vegetacija. Srednje gusto	4. Brk				14	11,6	11	22,5	5	26		10	11		52	2,1	1,6	7,6	
				žbunje. Srednja zakorovljenost. tip šume kitnjaka (Quercetum montanum	5. Gr				14	11,6	11	27,5	42	30					72	4,3	23,7	15,0	
				cariecetosum pilosae) na gajnjaci do lesiviranoj gajnjaci..	6. OTL				11	9,7	10	32,5	41	31					72	6,0	32,3	20,7	
												37,5	56	16					72	7,9	70,5	15,9	
				Izdanacka mešovita šuma kitnjaka (izdanacka šuma kitnjaka i lipe) -								42,5	16						16	2,2	24,3		
				jednodobna (u fazi razgradnje). Ocuvana sastojina. Mešovita sastojina								47,5	11						11	2,0	22,1		
				(smeša stablimicna) vrlo gustog sklopa (1.0). u celini zdravstveno stanje								52,5		11					11	2,4		22,3	
				sastojine je osrednje. po kvalitetu malo vredna sastojina (ima do 20%								UKUP.	171	597	144	31	33	25	1001	31,9	174,4	102,9	3,6
				tehnickog drveta). Srednja ugroženost od insekata. Srednja ugroženost od																			
				fitopatoloških oboljenja-oboljenja lista. srednje negovana sastojina.																			
				Stabla srebrna lipa su zakrivljena i sa velikim padom precnika (mala																			
				punodrvnost), sa srednje dugim krošnjama (dužine izmedu 1/3 i 1/2 visine																			
				stabala) i ekscentricnim krošnjama, suvih i suhovrhih stabala ima do 10%,																			
				zdravstveno stanje stabala ove vrste drveca je osrednje. Stabla kitnjaka																			
				su zakrivljena i sa srednjim padom precnika (srednja punodrvnost), sa																			
				srednje dugim krošnjama (dužine izmedu 1/3 i 1/2 visine stabala) i																			
				normalno razvijenim krošnjama, do 10% oštecenih stabala od insekata i																			
				fitopatoloških obolenja, suvih i suhovrhih stabala ima do 10%,																			
17	c	60307484	4,55	zdravstveno stanje stabala ove vrste drveca je osrednje.																			
				Šuma - nalazi se na platou i na blago nagnutom terenu (nagiba do 5°) -	1. SrLip	0,6		93	18	14,4	9	7,5	199		25	124			348	1,5	4,3		0,3
				nagib ujednacen. Nadmorska visina 430 do 450m. Ekspozicija 1	2. Kit	0,4			41	20,8	11	12,5	100						100	1,2	5,2		
				jugozapadna. Mrtvi pokrivac srednje zastupljen - povoljan proces	3. OTL				18	13,1	13	17,5	75				25	25	124	3,0	10,9		
				humifikacije. Retka prizemna vegetacija. Retko žbunje. Slaba	4. Gr				8	5,2	9	22,5	75						75	3,0	22,0		
				zakorovljenost. tip šume kitnjaka i graba sa klokocikom	5. Klen				18	13,7	11	27,5	75		25				99	5,9	38,5		13,9
				(Querco-Carpinetum staphyletosum) na kiselom smedem do lesiviranom	6. PBr				18	14,0	9	32,5	75	25					99	8,2	50,3	21,2	
				kiselom smedjem zemljištu..								42,5	25	25					50	7,0	33,8	38,1	
												47,5		25					25	4,4		47,0	
				Izdanacka mešovita šuma lipa (izdanacka šuma lipa i kitnjaka) -								UKUP.	621	75	50	124	25	25	919	34,3	164,9	106,4	14,2
				jednodobna (u fazi razgradnje). Ocuvana sastojina. Mešovita sastojina																			
				(smeša stablimicna) gustog sklopa (0.8 - 0.9). u celini zdravstveno																			
				stanje sastojine je osrednje. po kvalitetu malo vredna sastojina (ima do																			
				20% tehnickog drveta). Srednja ugroženost od insekata. Srednja ugroženost																			
				od fitopatoloških oboljenja-oboljenja lista. srednje negovana sastojina.																			
				Stabla srebrna lipa su zakrivljena i sa srednjim padom precnika (srednja																			
				punodrvnost), sa srednje dugim krošnjama (dužine izmedu 1/3 i 1/2 visine																			
				stabala) i ekscentricnim krošnjama, suvih i suhovrhih stabala ima do 10%,																			
				zdravstveno stanje stabala ove vrste drveca je dobro. Stabla kitnjaka su																			
				zakrivljena i sa srednjim padom precnika (srednja punodrvnost), sa																			
				srednje dugim krošnjama (dužine izmedu 1/3 i 1/2 visine stabala) i																			
				normalno razvijenim krošnjama, do 10% oštecenih stabala od insekata i																			
				fitopatoloških obolenja, suvih i suhovrhih stabala ima do 10%,																			
17	d	60288263	0,60	zdravstveno stanje stabala ove vrste drveca je osrednje.																			
				Šuma - nalazi se na strani i na vrlo strmom terenu(nagiba od 16° do	1. Kit	0,8		83	40	19,0	8	7,5		87	68	17	28	33	233	1,0		1,8	1,9
				20°) - nagib konveksan (ispupcen). Nadmorska visina 390 do 440m.	2. SrLip	0,1			13	12,9	6	12,5		103		33			136	1,7		9,6	
				Ekspozicija 1 zapadna. Mrtvi pokrivac srednje zastupljen - povoljan	3. Cjas	0,1			13	12,8	9	17,5		16	28				44	1,1		3,0	5,9

ОПИС СТАНИШТА И САСТОЈИНА

Ozn.mesta		gazdi-	površ-	OPIS	Osnovni taksacioni elementi						visi	deb.	Broj stabala po hektaru							G	Zapremina po		
ode-	od-	nska	ina		vrsta	sme	obr	sta-	sred.stablo		nski			Vrsta drveta						po		Vrsta drv	
ljenje	sek	klasa	ha		drveća	sa	ast	rost	Ds	Hs	step.	st.	1	2	3	4	5	6	svg.	ha	1	2	3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
				proces humifikacije. Srednje gusta prizemna vegetacija. Srednje gusto	4. OTL				11	11,5	8	22,5	6	53	26				85	3,4	2,9	21,6	8,9
				žbunje. Slaba zakorovljenost. tip šume kitnjaka (Quercetum montanum	5. Brk				8	8,9	9	27,5	16						16	0,9	11,0		
				typicum) na kiselom smedem i lesiviranom kiselom smedjem zemljištu..	6. Klen				8	8,9	9	32,5	49						49	4,0	43,3		
												42,5	32						32	4,5	51,8		
				Izdanacka mešovita šuma kitnjaka (izdanacka šuma kitnjaka i lipe) -								47,5	17						17	2,9	36,3		
				jednodobna (u optimalnoj fazi). Ocuvana sastojina. Mešovita sastojina								52,5	32						32	6,9	92,4		
				(smeša stablimicna) gustog sklopa (0.8 - 0.9). u celini zdravstveno								UKUP.	151	258	122	50	28	33	643	26,5	237,6	36,0	16,7
				stanje sastojine je dobro. po kvalitetu malo vredna sastojina (ima do 20%																			
				tehnickog drveta). Srednja ugroženost od insekata. Srednja ugroženost od																			
				vetra. srednje negovana sastojina. Stabla srebrna lipa su zakrivljena i																			
				sa srednjim padom precnika (srednja punodrvnost), sa srednje dugim																			
				krošnjama (dužine izmedu 1/3 i 1/2 visine stabala) i ekscentricnim																			
				krošnjama, do 10% oštecenih stabala od vetra, snega i leda, suvih i																			
				suhovrhih stabala ima do 10%, zdravstveno stanje stabala ove vrste																			
				drveca je dobro. Stabla kitnjaka su zakrivljena i sa srednjim padom																			
				precnika (srednja punodrvnost), sa dugim krošnjama (dužine izmedu 1/2 i																			
				2/3 visine stabala) i normalno razvijenim krošnjama, do 10% oštecenih																			
				stabala od vetra, snega i leda, do 10% oštecenih stabala od insekata i																			
				fitopatoloških obolenja, suvih i suhovrhih stabala ima do 10%,																			
17	e	60307482	1,52	zdravstveno stanje stabala ove vrste drveca je dobro.																			

Ozn.mesta		gazdi-	površ-	OPIS	Osnovni taksacioni elementi						visi	deb.	Broj stabala po hektaru							G	Zapremina po		
ode-	od-	nska	ina		vrsta	sme	obr	sta-	sred.stablo		nski			Vrsta drveta						po		Vrsta drv	
ljenje	sek	klasa	ha		drveća	sa	ast	rost	Ds	Hs	step.	st.	1	2	3	4	5	6	svg.	ha	1	2	3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
				Šuma - nalazi se na platou i na srednje strmom terenu (nagiba od 6° do	1. SrLip	0,6		93	29	18,7	9	7,5	75		18	12	5	65	175	0,8	1,5		0,3
				10°) - nagib ujednacen. Nadmorska visina 385 do 440m. Ekspozicija 1	2. Kit	0,3			41	20,8	11	12,5	5		3	8	5	7	28	0,3	0,3		0,2
				jugozapadna. Mrtvi pokrivac slabo zastupljen - povoljan proces	3. OTL	0,1			19	15,1	11	17,5	8		7	6	5		26	0,6	1,4		1,3
				humifikacije. Retka prizemna vegetacija. Retko žbunje. Slaba	4. Gr				17	14,4	10	22,5	15	7	3	5			30	1,2	4,2	2,4	1,1
				zakorovljenost. tip šume kitnjaka i graba sa klokocikom	5. Bk				15	13,5	13	27,5				3			3	0,1			
				(Querco-Carpinetum staphyletosum) na kiselom smedem do lesiviranom	6. PBr				8	8,1	11	32,5	22			3	3		27	2,3	17,2		
				kiselom smedjem zemljištu..								37,5	32	12	3	3			49	5,4	33,2	14,8	2,6
												42,5	20	33	3				56	7,9	28,6	47,3	4,2
				Izdanacka mešovita šuma lipa (izdanacka šuma lipa i kitnjaka) -								47,5	16	8					25	4,4	28,7	16,2	
				jednodobna (u fazi razgradnje). Ocuvana sastojina. Mešovita sastojina								52,5	20						20	4,3	41,8		
				(smeša stablimicna) potpunog sklopa (0.7). u celini zdravstveno stanje								57,5	7	3	3				12	3,2	16,3	9,4	8,1
				sastojine je dobro. po kvalitetu vredna sastojina (ima od 41-60%								62,5	3						3	0,8	8,5		
				tehnickog drveta). Srednja ugroženost od insekata. Srednja ugroženost od								67,5	7						7	2,4	25,0		
				vetra. srednje negovana sastojina. Stabla srebrna lipa su zakrivljena i								UKUP.	229	63	38	39	18	72	459	33,7	206,7	90,1	17,8
				sa srednjim padom precnika (srednja punodrvnost), sa srednje dugim																			
				krošnjama (dužine izmedu 1/3 i 1/2 visine stabala) i ekscentricnim																			
				krošnjama, do 10% oštecenih stabala od vetra, snega i leda, suvih i																			
				suhovrhih stabala ima do 10%, zdravstveno stanje stabala ove vrste																			
				drveca je dobro. Stabla kitnjaka su zakrivljena i sa srednjim padom																			
				precnika (srednja punodrvnost), sa dugim krošnjama (dužine izmedu 1/2 i																			
				2/3 visine stabala) i normalno razvijenim krošnjama, do 10% oštecenih																			
				stabala od vetra, snega i leda, do 10% oštecenih stabala od insekata i																			
				fitopatoloških obolenja, suvih i suhovrhih stabala ima do 10%,																			
17	f	60288263	3,25	zdravstveno stanje stabala ove vrste drveca je dobro.																			
				Put.																			
17	1	60	0,10																				
				Šuma - nalazi se na strani i na vrlo strmom terenu(nagiba od 16° do	1. SrLip	0,6		89	22	16,2	7	7,5	109		50	17	8	8	192	0,8	2,9		0,7
				20°) - nagib konkavan (ugnut). Nadmorska visina 350 do 385m.	2. Kit	0,4			31	19,3	10	12,5	3				3		7	0,1	0,3		
				Ekspozicija 1 istocna. Mrtvi pokrivac srednje zastupljen - povoljan	3. Tre				13	11,8	13	17,5	30						30	0,7	4,6		
				proces humifikacije. Retka prizemna vegetacija. Srednje gusto žbunje.	4. Klen				18	14,8	10	22,5	48	15	8	12	8		90	3,6	16,5	5,7	3,3
				Nema zakorovljenosti. tip šume kitnjaka (Quercetum montanum typicum) na	5. Gr				15	13,0	10	27,5	78	44	8				130	7,7	42,6	25,2	4,8
				kiselom smedem i lesiviranom kiselom smedjem zemljištu..	6. Brk				8	7,4	10	32,5	53	60	3	8			124	10,3	42,2	50,4	2,7
												37,5	25	3					28	3,1	24,8	3,9	
				Izdanacka mešovita šuma lipa (izdanacka šuma lipa i kitnjaka) -								42,5		12					12	1,6		16,6	
				jednodobna (u optimalnoj fazi). Ocuvana sastojina. Mešovita sastojina								52,5	8						8	1,8	19,7		
				(smeša stablimicna) vrlo gustog sklopa (1.0). u celini zdravstveno stanje								UKUP.	353	133	69	37	20	8	620	29,7	153,6	101,8	11,5
				sastojine je dobro. po kvalitetu malo vredna sastojina (ima do 20%																			
				tehnickog drveta). Srednja ugroženost od insekata. Srednja ugroženost od																			
				vetra. srednje negovana sastojina. Stabla srebrna lipa su zakrivljena i																			
				sa srednjim padom precnika (srednja punodrvnost), sa srednje dugim																			
				krošnjama (dužine izmedu 1/3 i 1/2 visine stabala) i ekscentricnim																			
				krošnjama, do 10% oštecenih stabala od vetra, snega i leda, suvih i																			
				suhovrhih stabala ima do 10%, zdravstveno stanje stabala ove vrste																			
				drveca je dobro. Stabla kitnjaka su zakrivljena i sa srednjim padom																			
				precnika (srednja punodrvnost), sa srednje dugim krošnjama (dužine izmedu																			
				1/3 i 1/2 visine stabala) i normalno razvijenim krošnjama, do 10%																			

ОПИС СТАНИШТА И САСТОЈИНА

Ozn.mesta		gazdi-	površ-	OPIS	Osnovni taksacioni elementi						visi	deb.	Broj stabala po hektaru							G	Zapremina po		
ode-	od-	nska	ina		vrsta	sme	obr	sta-	sred.stablo		nski			Vrsta drveta						po		Vrsta drv	
ljenje	sek	klasa	ha		drveća	sa	ast	rost	Ds	Hs	step.	st.	1	2	3	4	5	6	svg.	ha	1	2	3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
				oštecenih stabala od vetra, snega i leda, do 10% oštecenih stabala od																			
				insekata i fitopatoloških obolenja, suvih i suhovrhih stabala ima do 10%,																			
18	a	60288482	2,06	zdravstveno stanje stabala ove vrste drveca je dobro.																			

Ozn.mesta		gazdi-	površ-	OPIS	Osnovni taksacioni elementi						visi	deb.	Broj stabala po hektaru							G	Zapremina po		
ode-	od-	nska	ina		vrsta	sme	obr	sta-	sred.stablo		nski			Vrsta drveta						po		Vrsta drv	
ljenje	sek	klasa	ha		drveća	sa	ast	rost	Ds	Hs	step.	st.	1	2	3	4	5	6	svg.	ha	1	2	3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
				Šuma - nalazi se na strani i na strmom terenu (nagiba od 11° do 15°) -	1. SrLip	0,4		89	12	9,6	10	7,5	534		111		17		662	2,9	11,2		2,0
				nagib konveksan (ispupcen). Nadmorska visina 370 do 390m. Ekspozicija 1	2. Kit	0,5			27	15,4	12	12,5	39	8	49				96	1,2	2,6	0,6	3,6
				jugozapadna. Mrtvi pokrivac srednje zastupljen - povoljan proces	3. Cjas	0,1			13	10,2	13	17,5	49	50	32				130	3,1	6,9	9,0	4,4
				humifikacije. Retka prizemna vegetacija. Srednje gusto žbunje. Nema	4. Cer				33	16,5	11	22,5	8	50	24				82	3,3	2,5	13,2	6,8
				zakorovljenosti. tip šume razlicitih hrastova sa crnim jasenom	5. Brk				8	6,5	13	27,5		82	16	8			106	6,3		40,3	6,8
				(Orno-Polyquercetum) na slabo razvijenim zemljištima na krecnjacima i								32,5	33	57					90	7,4	21,1	38,7	
				bazicnim silikatnim stenama..								37,5	25	15		8			48	5,3	23,0	16,3	
												42,5		16					16	2,3		23,9	
				Izdanacka mešovita šuma lipa (izdanacka šuma lipa i kitnjaka) -								87,5	8						8	4,7	48,7		
				jednodobna (u optimalnoj fazi). Ocuvana sastojina. Mešovita sastojina								UKUP.	695	277	233	17	17		1238	36,6	116,0	142,2	23,7
				(smeša stablimicna) gustog sklopa (0.8 - 0.9). u celini zdravstveno																			
				stanje sastojine je dobro. po kvalitetu malo vredna sastojina (ima do 20%																			
				tehnickog drveta). Srednja ugroženost od insekata. Srednja ugroženost od																			
				vetra. srednje negovana sastojina. Stabla srebrna lipa su zakrivljena i																			
				sa srednjim padom precnika (srednja punodrvnost), sa srednje dugim																			
				krošnjama (dužine izmedu 1/3 i 1/2 visine stabala) i ekscentricnim																			
				krošnjama, do 10% oštecenih stabala od vetra, snega i leda, suvih i																			
				suhovrhih stabala ima do 10%, zdravstveno stanje stabala ove vrste																			
				drveca je dobro. Stabla kitnjaka su zakrivljena i sa srednjim padom																			
				precnika (srednja punodrvnost), sa srednje dugim krošnjama (dužine izmedu																			
				1/3 i 1/2 visine stabala) i normalno razvijenim krošnjama, do 10%																			
				oštecenih stabala od vetra, snega i leda, do 10% oštecenih stabala od																			
				insekata i fitopatoloških obolenja, suvih i suhovrhih stabala ima do 10%,																			
18	b	60288371	2,80	zdravstveno stanje stabala ove vrste drveca je osrednje.																			
				Šuma - nalazi se na strani i na vrlo strmom terenu(nagiba od 16° do	1. Kit	0,6		89	32	16,5	13	7,5		583	237	31	16	10	877	3,9		11,2	3,9
				20°) - nagib konveksan (ispupcen). Nadmorska visina 325 do 410m.	2. SrLip	0,3			12	10,6	10	12,5		71	31		10		112	1,4		5,5	1,9
				Ekspozicija 1 jugozapadna. Mrtvi pokrivac srednje zastupljen - povoljan	3. Cjas				9	8,4	12	17,5		60	16		10		86	2,1		8,6	2,3
				proces humifikacije. Srednje gusta prizemna vegetacija. Retko žbunje.	4. Gr				12	10,5	12	22,5	62	51	5				118	4,7	17,6	13,2	1,4
				Nema zakorovljenosti. tip šume kitnjaka (Quercetum montanum typicum) na	5. Brk				12	10,4	12	27,5	31	37					68	4,1	14,3	18,5	
				kiselom smedem i lesiviranom kiselom smedjem zemljištu..	6. Tre				8	7,2	15	32,5	62	32					93	7,7	44,0	21,0	
												37,5	87	20		5			112	12,4	90,2	19,6	
				Izdanacka mešovita šuma kitnjaka (izdanacka šuma kitnjaka i lipe) -								42,5	20						20	2,9	28,1		
				jednodobna (u optimalnoj fazi). Ocuvana sastojina. Mešovita sastojina								UKUP.	262	854	289	36	36	10	1487	39,1	194,2	97,6	9,4
				(smeša stablimicna) gustog sklopa (0.8 - 0.9). u celini zdravstveno																			
				stanje sastojine je osrednje. po kvalitetu malo vredna sastojina (ima do																			
				20% tehnickog drveta). Srednja ugroženost od insekata. Srednja ugroženost																			
				od drugih štetnih uticaja. srednje negovana sastojina. Stabla srebrna																			
				lipa su zakrivljena i sa srednjim padom precnika (srednja punodrvnost),																			
				sa srednje dugim krošnjama (dužine izmedu 1/3 i 1/2 visine stabala) i																			
				ekscentricnim krošnjama, zdravstveno stanje stabala ove vrste drveca je																			
				dobro. Stabla kitnjaka su zakrivljena i sa srednjim padom precnika																			
				(srednja punodrvnost), sa srednje dugim krošnjama (dužine izmedu 1/3 i																			
				1/2 visine stabala) i normalno razvijenim krošnjama, od 11-25% oštecenih																			
				stabala od insekata i fitopatoloških obolenja, suvih i sihovrhih stabala																			
18	c	60307482	4,80	ima od 11-25%, zdravstveno stanje stabala ove vrste drveca je dobro.																			
				Šuma - nalazi se na strani i na strmom terenu (nagiba od 11° do 15°) -	1. Kit	0,8		89	28	17,5	11	7,5		155	70				224	1,0		3,3	0,9
				nagib valovit. Nadmorska visina 300 do 315m. Ekspozicija 1 zapadna.	2. SrLip	0,1			11	8,1	9	12,5		46		22			68	0,8		3,3	
				Mrtvi pokrivac srednje zastupljen - povoljan proces humifikacije. Srednje	3. Gr	0,1			12	9,3	11	17,5		22	22				43	1,0		2,7	4,3

ОПИС СТАНИШТА И САСТОЈИНА

Ozn.mesta		gazdi-	površ-	OPIS	Osnovni taksacioni elementi						visi	deb.	Broj stabala po hektaru							G	Zapremina po		
ode-	od-	nska	ina		vrsta	sme	obr	sta-	sred.stablo		nski			Vrsta drveta						po		Vrsta drv	
ljenje	sek	klasa	ha		drveća	sa	ast	rost	Ds	Hs	step.	st.	1	2	3	4	5	6	svg.	ha	1	2	3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
				gusta prizemna vegetacija. Srednje gusto žbunje. Nema zakorovljenosti.	4. Brk				13	9,4	11	22,5	70	22	22				113	4,5	27,0	5,9	5,5
				tip šume bukve i kitnjaka (Querco-Fagetum typicum) na kiselom smedem i								27,5	111						111	6,6	56,9		
				lesiviranom kiselom smedjem zemljištu..								32,5	23						23	1,9	15,7		
												37,5	45						45	4,9	49,0		
				Izdanacka mešovita šuma kitnjaka - jednodobna (u fazi razgradnje).								UKUP.	249	244	113	22			628	20,8	148,6	15,2	10,7
				Razredjena sastojina. Mešovita sastojina (smeša stablimicna) nepotpunog																			
				sklopa (0.5-0.6). u celini zdravstveno stanje sastojine je dobro. po																			
				kvalitetu malo vredna sastojina (ima do 20% tehnickog drveta). Srednja																			
				ugroženost od insekata. Srednja ugroženost od vetra. pogrešno negovana																			
				sastojina. Stabla srebrna lipa su zakrivljena i sa srednjim padom																			
				precnika (srednja punodrvnost), sa srednje dugim krošnjama (dužine izmedu																			
				1/3 i 1/2 visine stabala) i ekscentricnim krošnjama, zdravstveno stanje																			
				stabala ove vrste drveca je dobro. Stabla kitnjaka su zakrivljena i sa																			
				srednjim padom precnika (srednja punodrvnost), sa srednje dugim krošnjama																			
				(dužine izmedu 1/3 i 1/2 visine stabala) i normalno razvijenim krošnjama,																			
				do 10% oštecenih stabala od insekata i fitopatoloških obolenja, suvih i																			
				suhovrhih stabala ima do 10%, zdravstveno stanje stabala ove vrste																			
18	d	60307602	0,62	drveca je dobro.																			

Ozn.mesta		gazdi-	površ-	OPIS	Osnovni taksacioni elementi						visi	deb.	Broj stabala po hektaru							G	Zapremina po		
ode-	od-	nska	ina		vrsta	sme	obr	sta-	sred.stablo		nski			Vrsta drveta						po		Vrsta drv	
ljenje	sek	klasa	ha		drveća	sa	ast	rost	Ds	Hs	step.	st.	1	2	3	4	5	6	svg.	ha	1	2	3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
				Šuma - nalazi se na strani i na vrlo strmom terenu(nagiba od 16° do	1. Kit	0,6		89	31	17,4	12	7,5		353	400	74	13	27	867	3,8		9,0	6,6
				20°) - nagib konveksan (ispupcen). Nadmorska visina 315 do 375m.	2. SrLip	0,2			11	10,7	7	12,5		133	60	27			221	2,7		11,1	4,5
				Ekspozicija 1 jugozapadna. Mrtvi pokrivac srednje zastupljen - povoljan	3. Cjas	0,1			9	10,6	12	17,5	27	67	47		7	13	161	3,9	4,6	11,1	8,4
				proces humifikacije. Srednje gusta prizemna vegetacija. Retko žbunje.	4. Gr	0,1			12	12,4	12	22,5	27	40	7	27			101	4,0	6,8	12,6	1,6
				Nema zakorovljenosti. tip šume razlicitih hrastova sa crnim jasenom	5. OTL				15	13,6	12	27,5	53	7	7	7	7		80	4,8	26,5	3,9	3,6
				(Orno-Polyquercetum) na slabo razvijenim zemljištima na krecnjacima i	6. Brk				11	11,5	12	32,5	26	7					33	2,7	18,3	6,1	
				bazicnim silikatnim stenama..								37,5	13						13	1,5	14,5		
												42,5	13						13	1,9	17,1		
				Izdanacka mešovita šuma kitnjaka (izdanacka šuma kitnjaka i lipe) -								47,5	13						13	2,3	23,7		
				jednodobna (u optimalnoj fazi). Ocuvana sastojina. Mešovita sastojina								57,5	13						13	3,4	39,8		
				(smeša stablimicna) vrlo gustog sklopa (1.0). srednje negovana sastojina.								UKUP.	186	607	521	135	27	40	1516	31,0	151,2	53,8	24,7
				0. Stabla srebrna lipa su zakrivljena i sa srednjim padom precnika																			
				(srednja punodrvnost), sa srednje dugim krošnjama (dužine izmedu 1/3 i																			
				1/2 visine stabala) i ekscentricnim krošnjama, zdravstveno stanje																			
				stabala ove vrste drveca je dobro. Stabla kitnjaka su zakrivljena i sa																			
				srednjim padom precnika (srednja punodrvnost), sa srednje dugim krošnjama																			
				(dužine izmedu 1/3 i 1/2 visine stabala) i normalno razvijenim krošnjama,																			
				do 10% oštecenih stabala od insekata i fitopatoloških obolenja, suvih i																			
				suhovrhih stabala ima do 10%, zdravstveno stanje stabala ove vrste																			
18	e	60307371	3,76	drveca je dobro.																			
				Put.																			
18	1	60	0,27																				
				Šuma - nalazi se u dolini i na blago nagnutom terenu (nagiba do 5°) -	1. SrLip	0,5		114	19	13,3	8	7,5	226		8	81	17	16	348	1,5	4,6		0,1
				nagib konkavan (ugnut). Nadmorska visina 355 do 395m. Ekspozicija 1	2. Kit	0,4			35	20,5	10	12,5	31						31	0,4	2,6		
				istocna. Mrtvi pokrivac srednje zastupljen - povoljan proces	3. OTL				23	15,0	10	17,5	38						38	0,9	6,3		
				humifikacije. Srednje gusta prizemna vegetacija. Srednje gusto žbunje.	4. Klen				8	4,6	10	22,5	16						16	0,6	5,7		
				Nema zakorovljenosti. tip šume kitnjaka (Quercetum montanum cariecetosum	5. Brk				8	4,6	10	27,5	74	16					90	5,3	35,2	9,2	
				pilosae) na gajnjaci do lesiviranoj gajnjaci..	6. Cjas				8	4,6	10	32,5	59	68					127	10,5	42,3	59,3	
												37,5	31	36	8				75	8,2	30,4	45,1	9,0
				Izdanacka mešovita šuma lipa (izdanacka šuma lipa i kitnjaka) -								42,5	32	11					44	6,2	46,8	18,9	
				jednodobna (u fazi razgradnje). Ocuvana sastojina. Mešovita sastojina								47,5	7	3					11	1,9	14,9	6,9	
				(smeša stablimicna) gustog sklopa (0.8 - 0.9). u celini zdravstveno								62,5		3					3	1,0		11,8	
				stanje sastojine je osrednje. po kvalitetu malo vredna sastojina (ima do								UKUP.	514	137	16	81	17	16	782	36,6	188,7	151,3	9,2
				20% tehnickog drveta). Srednja ugroženost od insekata. Srednja ugroženost																			
				od vetra. srednje negovana sastojina. 0. Stabla kitnjaka su zakrivljena																			
				i sa srednjim padom precnika (srednja punodrvnost), sa srednje dugim																			
				krošnjama (dužine izmedu 1/3 i 1/2 visine stabala) i normalno razvijenim																			
				krošnjama, suvih i suhovrhih stabala ima do 10%, zdravstveno stanje																			
19	a	60288484	2,45	stabala ove vrste drveca je osrednje.																			
				Šuma - nalazi se na strani i na srednje strmom terenu (nagiba od 6° do	1. SrLip	0,6		60	28	18,0	9	7,5	40	13	20		13	40	126	0,6	0,7	0,2	0,3
				10°) - nagib konkavan (ugnut). Nadmorska visina 355 do 370m.	2. Bag	0,2			22	17,3	15	12,5	7		13		20	7	46	0,6	0,3		1,1
				Ekspozicija 1 jugoistocna. Mrtvi pokrivac srednje zastupljen - povoljan	3. Klen	0,1			17	13,7	11	17,5		13		7			20	0,5		2,1	
				proces humifikacije. Retka prizemna vegetacija. Srednje gusto žbunje.	4. Tre	0,1			35	15,9	17	22,5	13	13	13				40	1,6	4,4	5,1	4,0
				Slaba zakorovljenost. tip šume kitnjaka (Quercetum montanum cariecetosum	5. PBr				14	11,9	9	27,5	7	7	7				20	1,2	3,5	4,8	2,8
				pilosae) na gajnjaci do lesiviranoj gajnjaci..	6. OTL				8	7,5	13	32,5	13				7		20	1,6	10,7		
												37,5		13	7				20	2,2		18,4	6,7

ОПИС СТАНИШТА И САСТОЈИНА

Ozn.mesta		gazdi-	površ-	OPIS	Osnovni taksacioni elementi						visi	deb.	Broj stabala po hektaru							G	Zapremina po		
ode-	od-	nska	ina		vrsta	sme	obr	sta-	sred.stablo		nski			Vrsta drveta						po		Vrsta drv	
ljenje	sek	klasa	ha		drveća	sa	ast	rost	Ds	Hs	step.	st.	1	2	3	4	5	6	svg.	ha	1	2	3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
				Izdanacka mešovita šuma lipa - jednodobna (u optimalnoj fazi).								42,5	7						7	0,9	8,1		
				Razredjena sastojina. Mešovita sastojina (smeša i grupimicna i								47,5	13						13	2,3	22,6		
				stablimicna) nepotpunog sklopa (0.5-0.6). u celini zdravstveno stanje								52,5	13			7			20	4,3	28,9		
				sastojine je dobro. po kvalitetu malo vredna sastojina (ima do 20%								62,5	7						7	2,0	21,1		
				tehnickog drveta). Srednja ugroženost od insekata. Srednja ugroženost od								UKUP.	119	60	60	13	40	47	338	17,8	100,4	30,6	15,0
				drugih štetnih uticaja. pogrešno negovana sastojina. Stabla srebrna lipa																			
				su zakrivljena i sa srednjim padom precnika (srednja punodrvnost), sa																			
				srednje dugim krošnjama (dužine izmedu 1/3 i 1/2 visine stabala) i																			
				normalno razvijenim krošnjama, suvih i suhovrhih stabala ima do 10%,																			
				zdravstveno stanje stabala ove vrste drveca je dobro. Stabla bagrema su																			
				zakrivljena i sa srednjim padom precnika (srednja punodrvnost), sa																			
				srednje dugim krošnjama (dužine izmedu 1/3 i 1/2 visine stabala) i																			
				normalno razvijenim krošnjama, suvih i suhovrhih stabala ima do 10%,																			
19	b	60288484	0,81	zdravstveno stanje stabala ove vrste drveca je dobro.																			

ОПИС СТАНИШТА И САСТОЈИНА

Ozn.mesta		gazdi-	površ-	OPIS	Osnovni taksacioni elementi						visi	deb.	Broj stabala po hektaru							G	Zapremina po		
ode-	od-	nska	ina		vrsta	sme	obr	sta-	sred.stablo		nski			Vrsta drveta						po		Vrsta drv	
ljenje	sek	klasa	ha		drveća	sa	ast	rost	Ds	Hs	step.	st.	1	2	3	4	5	6	svg.	ha	1	2	3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
				Šuma - nalazi se na strani i na vrlo strmom terenu(nagiba od 16° do	1. Bk	0,2		114	28	11,9	17	7,5	35	163		51	26	17	291	1,3	0,3	3,0	
				20°) - nagib valovit. Nadmorska visina 290 do 325m. Ekspozicija 1	2. SrLip	0,3			19	12,8	11	12,5		7		8			15	0,2		0,6	
				jugoistocna. Mrtvi pokrivac srednje zastupljen - povoljan proces	3. Kit	0,4			45	19,4	12	17,5	8			8			16	0,4	1,0		
				humifikacije. Retka prizemna vegetacija. Retko žbunje. Nema	4. Gr				13	10,0	12	22,5				12			12	0,5			
				zakorovljenosti. tip šume bukve i kitnjaka (Querco-Fagetum typicum) na	5. OTL	0,1			19	12,9	12	27,5	3	16		3			22	1,3	1,6	7,3	
				gajnjaci do lesiviranoj gajnjaci i eutricnim smedim do lesiviranim	6. Cjas				8	5,8	12	32,5	17	35	8	6	8		75	6,2	10,8	24,6	5,7
				eutricnim smedjim zemljištima..								37,5	15		24				39	4,3	14,8		26,7
												42,5	9	15			8		32	4,5	11,8	17,1	
				Izdanacka mešovita šuma kitnjaka (izdanacka šuma kitnjaka, bukve i lipe)								47,5	17	15	23				55	9,7	29,1	22,2	42,5
				- jednodobna (u fazi razgradnje). Razredjena sastojina. Mešovita								52,5	3	16	3				22	4,8	6,2	32,0	7,3
				sastojina (smeša stablimicna) nepotpunog sklopa (0.5-0.6). u celini								57,5			16				16	4,1			45,3
				zdravstveno stanje sastojine je osrednje. po kvalitetu srednjevredna								UKUP.	107	266	74	88	42	17	594	37,2	75,7	106,9	127,6
				sastojina (ima od 21-40% tehnickog drveta). Srednja ugroženost od																			
				insekata. Srednja ugroženost od fitopatoloških oboljenja-oboljenja kore.																			
				pogrešno negovana sastojina. Stabla srebrna lipa su zakrivljena i sa																			
				srednjim padom precnika (srednja punodrvnost), sa srednje dugim krošnjama																			
				(dužine izmedu 1/3 i 1/2 visine stabala) i ekscentricnim krošnjama, do																			
				10% oštecenih stabala od vetra, snega i leda, suvih i suhovrhih stabala																			
				ima do 10%, zdravstveno stanje stabala ove vrste drveca je osrednje.																			
				Stabla kitnjaka su zakrivljena i sa srednjim padom precnika (srednja																			
				punodrvnost), sa srednje dugim krošnjama (dužine izmedu 1/3 i 1/2 visine																			
				stabala) i normalno razvijenim krošnjama, do 10% oštecenih stabala od																			
				insekata i fitopatoloških obolenja, suvih i suhovrhih stabala ima do 10%,																			
19	c	60307601	2,86	zdravstveno stanje stabala ove vrste drveca je osrednje.																			
				Šuma - nalazi se na strani i na strmom terenu (nagiba od 11° do 15°) -	1. Kit	0,8		114	42	21,8	10	7,5		423	37	60	79	50	648	2,9		8,8	0,6
				nagib valovit. Nadmorska visina 285 do 380m. Ekspozicija 1 jugoistocna.	2. SrLip	0,2			10	9,5	8	12,5		81	5		5		91	1,1		6,0	0,3
				Mrtvi pokrivac srednje zastupljen - povoljan proces humifikacije. Retka	3. OTL	0,1			15	12,8	10	17,5		37					37	0,9		6,1	
				prizemna vegetacija. Srednje gusto žbunje. Slaba zakorovljenost. tip šume	4. Gr				10	9,3	10	22,5		16					16	0,6		5,5	
				kitnjaka (Quercetum montanum cariecetosum pilosae) na gajnjaci do	5. Cjas				8	7,3	10	27,5		5					5	0,3		2,7	
				lesiviranoj gajnjaci..	6. Klen				8	7,0	10	32,5	16						16	1,3	13,0		
												37,5	38	16		5			59	6,5	43,9	17,6	
				Izdanacka mešovita šuma kitnjaka (izdanacka šuma kitnjaka i lipe) -								42,5	48		10				59	8,3	78,0		16,4
				jednodobna (u fazi razgradnje). Ocuvana sastojina. Mešovita sastojina								47,5	27						27	4,8	58,0		
				(smeša stablimicna) potpunog sklopa (0.7). u celini zdravstveno stanje								52,5	16						16	3,6	42,5		
				sastojine je osrednje. po kvalitetu srednjevredna sastojina (ima od								UKUP.	146	578	52	65	84	50	975	30,4	235,4	46,7	17,2
				21-40% tehnickog drveta). Srednja ugroženost od insekata. Srednja																			
				ugroženost od fitopatoloških oboljenja-oboljenja kore. srednje negovana																			
				sastojina. Stabla srebrna lipa su zakrivljena i sa srednjim padom																			
				precnika (srednja punodrvnost), sa srednje dugim krošnjama (dužine izmedu																			
				1/3 i 1/2 visine stabala) i ekscentricnim krošnjama, suvih i suhovrhih																			
				stabala ima do 10%, zdravstveno stanje stabala ove vrste drveca je veoma																			
				dobro. Stabla kitnjaka su zakrivljena i sa srednjim padom precnika																			
				(srednja punodrvnost), sa srednje dugim krošnjama (dužine izmedu 1/3 i																			
				1/2 visine stabala) i normalno razvijenim krošnjama, do 10% oštecenih																			
				stabala od insekata i fitopatoloških obolenja, suvih i suhovrhih stabala																			
19	d	60307484	13,11	ima do 10%, zdravstveno stanje stabala ove vrste drveca je osrednje.																			
				Šuma - nalazi se na strani i na strmom terenu (nagiba od 11° do 15°) -	1. Kit	0,6		119	37	20,7	10	7,5	11	321	53	22		33	440	1,9	0,2	6,9	0,9
				nagib konveksan (ispupcen). Nadmorska visina 280 do 325m. Ekspozicija 1	2. SrLip	0,2			12	10,1	8	12,5		61					61	0,7		4,4	

ОПИС СТАНИШТА И САСТОЈИНА

Ozn.mesta		gazdi-	površ-	OPIS	Osnovni taksacioni elementi						visi	deb.	Broj stabala po hektaru							G	Zapremina po		
ode-	od-	nska	ina		vrsta	sme	obr	sta-	sred.stablo		nski			Vrsta drveta						po		Vrsta drv	
ljenje	sek	klasa	ha		drveća	sa	ast	rost	Ds	Hs	step.	st.	1	2	3	4	5	6	svg.	ha	1	2	3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
				jugozapadna. Mrtvi pokrivac srednje zastupljen - povoljan proces	3. OTL	0,1			15	11,5	10	17,5	6	19			4		29	0,7	1,3	2,5	
				humifikacije. Retka prizemna vegetacija. Srednje gusto žbunje. Nema	4. Klen				14	10,6	10	22,5		22	6		4		32	1,3		7,2	1,4
				zakorovljenosti. tip šume kitnjaka (Quercetum montanum cariecetosum	5. Jas				24	16,2	14	27,5		16		2	4		23	1,3		8,2	
				pilosae) na gajnjaci do lesiviranoj gajnjaci..	6. Gr				11	8,6	10	32,5	21	11			2	5	40	3,3	18,3	8,2	
												37,5	43	5	2	2			53	5,8	51,2	5,1	2,6
				Izdanacka mešovita šuma kitnjaka (izdanacka šuma kitnjaka i lipe) -								42,5	32	6	2	2			42	6,0	53,4	8,6	3,9
				jednodobna (u fazi razgradnje). Ocuvana sastojina. Mešovita sastojina								47,5	11	8					18	3,2	21,9	13,1	
				(smeša stablimicna) potpunog sklopa (0.7). u celini zdravstveno stanje								52,5	11	5					16	3,4	28,6	12,0	
				sastojine je osrednje. po kvalitetu srednjevredna sastojina (ima od								57,5	5						5	1,4	16,1		
				21-40% tehnickog drveta). Srednja ugroženost od insekata. Srednja								62,5			5				5	1,7			22,5
				ugroženost od fitopatoloških oboljenja-oboljenja kore. srednje negovana								UKUP.	139	472	68	29	15	38	762	30,7	190,9	76,3	31,3
				sastojina. Stabla srebrna lipa su zakrivljena i sa srednjim padom																			
				precnika (srednja punodrvnost), sa dugim krošnjama (dužine izmedu 1/2 i																			
				2/3 visine stabala) i ekscentricnim krošnjama, zdravstveno stanje																			
				stabala ove vrste drveca je dobro. Stabla kitnjaka su zakrivljena i sa																			
				srednjim padom precnika (srednja punodrvnost), sa srednje dugim krošnjama																			
				(dužine izmedu 1/3 i 1/2 visine stabala) i normalno razvijenim krošnjama,																			
				do 10% oštecenih stabala od insekata i fitopatoloških obolenja, suvih i																			
				suhovrhih stabala ima do 10%, zdravstveno stanje stabala ove vrste																			
19	e	60307484	5,06	drveca je osrednje.																			

Ozn.mesta		gazdi-	površ-	OPIS	Osnovni taksacioni elementi						visi	deb.	Broj stabala po hektaru							G	Zapremina po		
ode-	od-	nska	ina		vrsta	sme	obr	sta-	sred.stablo		nski			Vrsta drveta						po		Vrsta drv	
ljenje	sek	klasa	ha		drveća	sa	ast	rost	Ds	Hs	step.	st.	1	2	3	4	5	6	svg.	ha	1	2	3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
				Šuma - nalazi se na strani i na strmom terenu (nagiba od 11° do 15°) -	1. Kit	0,8		119	51	21,9	11	7,5		130	110	49	48	16	353	1,6		2,5	2,9
				nagib valovit. Nadmorska visina 265 do 285m. Ekspozicija 1 jugozapadna.	2. Gr	0,1			13	10,4	9	12,5			65				65	0,8			4,4
				Mrtvi pokrivac srednje zastupljen - povoljan proces humifikacije. Retka	3. SrLip				11	9,8	9	17,5			33				33	0,8			4,4
				prizemna vegetacija. Srednje gusto žbunje. Nema zakorovljenosti. tip šume	4. Klen				13	11,0	11	22,5		7					7	0,3		2,5	
				bukve i kitnjaka (Querco-Fagetum typicum) na gajnjaci do lesiviranoj	5. Brk				8	8,5	14	27,5				16			16	1,0			
				gajnjaci i eutricnim smedim do lesiviranim eutricnim smedjim	6. Cjas				8	7,9	12	32,5	16						16	1,3	12,8		
				zemljištima..								37,5		7					7	0,7		6,5	
												42,5	7						7	0,9	10,5		
				Izdanacka mešovita šuma kitnjaka - jednodobna (u fazi razgradnje).								47,5	19	16					36	6,3	38,0	28,1	
				Razredjena sastojina. Mešovita sastojina (smeša stablimicna) retkog								52,5	23						23	4,9	59,3		
				sklopa (0.5). u celini zdravstveno stanje sastojine je osrednje. po								57,5	16						16	4,2	51,9		
				kvalitetu srednjevredna sastojina (ima od 21-40% tehnickog drveta).								67,5	16						16	5,8	68,1		
				Srednja ugroženost od insekata. Srednja ugroženost od fitopatoloških								UKUP.	97	159	208	65	48	16	593	28,5	240,5	39,7	11,6
				oboljenja-oboljenja lista. pogrešno negovana sastojina. Stabla graba su																			
				zakrivljena i sa velikim padom precnika (mala punodrvnost), sa dugim																			
				krošnjama (dužine izmedu 1/2 i 2/3 visine stabala) i preširokim																			
				krošnjama, do 10% oštecenih stabala od vetra, snega i leda, suvih i																			
				suhovrhih stabala ima do 10%, zdravstveno stanje stabala ove vrste																			
				drveca je osrednje. Stabla kitnjaka su zakrivljena i sa srednjim padom																			
				precnika (srednja punodrvnost), sa srednje dugim krošnjama (dužine izmedu																			
				1/3 i 1/2 visine stabala) i normalno razvijenim krošnjama, do 10%																			
				oštecenih stabala od insekata i fitopatoloških obolenja, suvih i																			
				suhovrhih stabala ima do 10%, zdravstveno stanje stabala ove vrste																			
19	f	60307601	1,30	drveca je osrednje.																			
				Šuma - nalazi se na strani i na srednje strmom terenu (nagiba od 6° do	1. SrLip	0,7		35	20	9,5	14	7,5	66	115	82	16	49		329	1,5	1,0	1,5	1,2
				10°) - nagib konkavan (ugnut). Nadmorska visina 290 do 315m.	2. Klen	0,2			17	8,0	16	12,5	98	17					115	1,4	6,4	0,9	
				Ekspozicija 1 zapad - severozapad. Mrtvi pokrivac slabo zastupljen -	3. OTL	0,1			11	5,0	15	17,5	81		17				98	2,3	10,4		2,5
				povoljan proces humifikacije. Gusta prizemna vegetacija. Srednje gusto	4. Gr	0,1			20	9,5	16	22,5	49	17	17				82	3,2	10,0	3,0	4,6
				žbunje. Slaba zakorovljenost. tip šume kitnjaka (Quercetum montanum	5. Cjas				8	3,0	16	27,5	49	17					65	3,9	19,7	5,1	
				cariecetosum pilosae) na gajnjaci do lesiviranoj gajnjaci..								32,5		33		16			49	4,1		17,3	
												37,5	33	17					49	5,4	25,0	10,9	
				Izdanacka mešovita šuma lipa - jednodobna (u optimalnoj fazi). Ocuvana								42,5	33						33	4,7	36,1		
				sastojina. Mešovita sastojina (smeša stablimicna) gustog sklopa (0.8 -								UKUP.	408	214	115	32	49		819	26,5	108,7	38,6	8,4
				0.9). u celini zdravstveno stanje sastojine je dobro. po kvalitetu																			
				srednjevredna sastojina (ima od 21-40% tehnickog drveta). Srednja																			
				ugroženost od insekata. Mala ugroženost od drugih štetnih uticaja.																			
				nenegovana sastojina. 0. Stabla srebrna lipa su zakrivljena i sa																			
				srednjim padom precnika (srednja punodrvnost), sa dugim krošnjama (dužine																			
				izmedu 1/2 i 2/3 visine stabala) i ekscentricnim krošnjama, zdravstveno																			
19	g	60288484	0,99	stanje stabala ove vrste drveca je dobro.																			
				Šuma - nalazi se na strani i na blago nagnutom terenu (nagiba do 5°) -	1. SrLip	0,8		35	14	12,3	9	7,5	299	50	174	100			622	2,7	5,5	0,6	2,3
				nagib konveksan (ispupcen). Nadmorska visina 315 do 340m. Ekspozicija 1	2. Klen	0,1			15	12,5	11	12,5	50			25	25		100	1,2	3,8		
				severozapadna. Mrtvi pokrivac slabo zastupljen - povoljan proces	3. OTL	0,1			9	8,4	13	17,5	25	25					50	1,2	3,6	4,9	
				humifikacije. Srednje gusta prizemna vegetacija. Srednje gusto žbunje.	4. PBr				9	7,3	9	22,5	100		25				124	4,9	31,1		6,2
				Slaba zakorovljenost. tip šume kitnjaka (Quercetum montanum cariecetosum	5. Kit				13	12,1	11	27,5	25	25					50	2,9	14,3	12,7	
				pilosae) na gajnjaci do lesiviranoj gajnjaci..								32,5	50						50	4,1	36,1		
												UKUP.	547	99	199	125	25		995	17,2	94,5	18,2	8,6
				Izdanacka šuma lipa - jednodobna (u optimalnoj fazi). Ocuvana sastojina.																			

ОПИС СТАНИШТА И САСТОЈИНА

Ozn.mesta		gazdi-	površ-	OPIS	Osnovni taksacioni elementi						visi	deb.	Broj stabala po hektaru							G	Zapremina po		
ode-	od-	nska	ina		vrsta	sme	obr	sta-	sred.stablo		nski			Vrsta drveta						po		Vrsta drv	
ljenje	sek	klasa	ha		drveća	sa	ast	rost	Ds	Hs	step.	st.	1	2	3	4	5	6	svg.	ha	1	2	3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
				Mešovita sastojina (smeša stablimicna) gustog sklopa (0.8 - 0.9). u																			
				celini zdravstveno stanje sastojine je dobro. po kvalitetu malo vredna																			
				sastojina (ima do 20% tehnickog drveta). Srednja ugroženost od insekata.																			
				Srednja ugroženost od drugih štetnih uticaja. nenegovana sastojina.																			
				Stabla srebrna lipa su zakrivljena i sa srednjim padom precnika (srednja																			
				punodrvnost), sa srednje dugim krošnjama (dužine izmedu 1/3 i 1/2 visine																			
				stabala) i ekscentricnim krošnjama, suvih i suhovrhih stabala ima do 10%,																			
19	h	60287484	0,25	zdravstveno stanje stabala ove vrste drveca je dobro.																			
				Šuma - nalazi se na strani i na strmom terenu (nagiba od 11° do 15°) -	1. CB	0,9		34	20	15,3	6	12,5	149		11		5		165	2,0	11,4		1,0
				nagib ujednacen. Nadmorska visina 280 do 345m. Ekspozicija 1	2. SrLip				19	15,2	7	17,5	260	22		5			288	6,9	45,7	3,8	
				severozapadna. Mrtvog pokrivaca nema - nepovoljan proces humifikacije.	3. Gr				18	14,8	10	22,5	272	11	11				294	11,7	92,1	3,3	3,3
				Gusta prizemna vegetacija. Retko žbunje. Slaba zakorovljenost. tip šume	4. Cer				18	14,8	18	27,5	112						112	6,7	58,7		
				kitnjaka (Quercetum montanum cariecetosum pilosae) na gajnjaci do	5. Kit				13	13,4	2	32,5	27						27	2,2	21,6		
				lesiviranoj gajnjaci..								UKUP.	821	33	22	5	5		886	29,5	229,5	7,0	4,3
				Veštacki podignuta sastojina crnog bora - jednodobna (srednjedobna)																			
				sastojina. Ocuvana sastojina. Cista sastojina (smeša stablimicna) gustog																			
				sklopa (0.8 - 0.9). u celini zdravstveno stanje sastojine je dobro. po																			
				kvalitetu srednjevredna sastojina (ima od 21-40% tehnickog drveta).																			
				Srednja ugroženost od insekata. Srednja ugroženost od požara. nenegovana																			
				sastojina. Stabla crni bor su prava i sa malim padom precnika (velika																			
				punodrvnost), sa kratkim krošnjama (dužine izmedu 1/4 i1/3 visine																			
				stabala) i uskim krošnjama, suvih i suhovrhih stabala ima do 10%,																			
19	i	60475484	10,82	zdravstveno stanje stabala ove vrste drveca je dobro.																			

ОПИС СТАНИШТА И САСТОЈИНА

Ozn.mesta		gazdi-	površ-	OPIS	Osnovni taksacioni elementi						visi	deb.	Broj stabala po hektaru							G	Zapremina po		
ode-	od-	nska	ina		vrsta	sme	obr	sta-	sred.stablo		nski			Vrsta drveta						po		Vrsta drv	
ljenje	sek	klasa	ha		drveća	sa	ast	rost	Ds	Hs	step.	st.	1	2	3	4	5	6	svg.	ha	1	2	3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
				Šuma - nalazi se na strani i na blago nagnutom terenu (nagiba do 5°) -	1. SrLip	0,4		34	20	12,2	11	12,5	100	96	75	25	48		344	4,2	6,3	6,9	4,2
				nagib ujednacen. Nadmorska visina 345 do 360m. Ekspozicija 1 zapad -	2. CB	0,6			18	11,2	15	17,5	75	433					507	12,2	11,3	71,3	
				jugozapad. Mrtvog pokrivaca nema - vrlo nepovoljan proces humifikacije.	3. OTL				15	10,1	4	22,5	100	96	25				221	8,8	28,9	20,4	5,6
				Retka prizemna vegetacija. Nema žbunja. Nema zakorovljenosti. tip šume	4. Kit				13	9,1	4	27,5	75	48					123	7,3	30,3	18,4	
				kitnjaka (Quercetum montanum cariecetosum pilosae) na gajnjaci do	5. PBr				13	9,1	4												
				lesiviranoj gajnjaci..								UKUP.	349	673	100	25	48		1195	32,5	76,8	116,9	9,7
				Veštacki podignuta sastojina crnog bora - jednodobna (mladik u kasnom																			
				periodu). Ocuvana sastojina. Mešovita sastojina (smeša stablimicna) vrlo																			
				gustog sklopa (1.0). u celini zdravstveno stanje sastojine je dobro. po																			
				kvalitetu srednjevredna sastojina (ima od 21-40% tehnickog drveta).																			
				Srednja ugroženost od insekata. Srednja ugroženost od požara. nenegovana																			
				sastojina. Stabla crni bor su prava i sa malim padom precnika (velika																			
				punodrvnost), sa kratkim krošnjama (dužine izmedu 1/4 i1/3 visine																			
				stabala) i uskim krošnjama, suvih i suhovrhih stabala ima do 10%,																			
19	j	60475484	0,67	zdravstveno stanje stabala ove vrste drveca je dobro.																			
				Šuma - nalazi se na strani i na srednje strmom terenu (nagiba od 6° do	1. CB	1,0		34	23	14,3	12	7,5		2					2			0,1	
				10°) - nagib ujednacen. Nadmorska visina 245 do 333m. Ekspozicija 1	2. Kit				14	10,3	4	12,5	44	2	2	5			53	0,7	2,6	0,1	0,2
				jugozapadna. Mrtvog pokrivaca nema - nepovoljan proces humifikacije.	3. Bag				13	9,4	17	17,5	158						158	3,8	23,8		
				Gusta prizemna vegetacija. Retko žbunje. Slaba zakorovljenost. tip šume	4. OTL				13	9,4	4	22,5	213	2					215	8,6	66,2	0,5	
				kitnjaka (Quercetum montanum cariecetosum pilosae) na gajnjaci do								27,5	157						157	9,3	79,2		
				lesiviranoj gajnjaci..								32,5	68						68	5,6	52,3		
												42,5	2						2	0,3	3,1		
				Veštacki podignuta sastojina crnog bora - jednodobna (mladik u kasnom								47,5	2						2	0,4	4,2		
				periodu). Ocuvana sastojina. Cista sastojina (smeša stablimicna) vrlo								UKUP.	644	6	2	5			658	28,7	231,4	0,7	0,2
				gustog sklopa (1.0). u celini zdravstveno stanje sastojine je dobro. po																			
				kvalitetu srednjevredna sastojina (ima od 21-40% tehnickog drveta).																			
				Srednja ugroženost od insekata. Srednja ugroženost od požara. nenegovana																			
				sastojina. Stabla crni bor su prava i sa malim padom precnika (velika																			
				punodrvnost), sa kratkim krošnjama (dužine izmedu 1/4 i1/3 visine																			
				stabala) i uskim krošnjama, suvih i suhovrhih stabala ima do 10%,																			
19	k	60475484	6,20	zdravstveno stanje stabala ove vrste drveca je dobro.																			
				Put.																			
19	1	60	0,23																				
				Šuma - nalazi se na strani i na srednje strmom terenu (nagiba od 6° do	1. SrLip	0,6		80	19	15,7	7	7,5	226		12	24	48	12	321	1,4	4,2		0,2
				10°) - nagib konkavan (ugnut). Nadmorska visina 345 do 385m.	2. Kit	0,3			32	19,7	10	12,5	47			12			59	0,7	3,6		
				Ekspozicija 1 jugoistocna. Mrtvi pokrivac srednje zastupljen - povoljan	3. OTL	0,1			25	17,7	10	17,5	12						12	0,3	2,2		
				proces humifikacije. Retka prizemna vegetacija. Srednje gusto žbunje.	4. Gr				14	12,4	10	22,5	48	24					72	2,9	15,3	8,0	
				Slaba zakorovljenost. tip šume kitnjaka (Quercetum montanum cariecetosum	5. Klen				8	7,3	10	27,5	24	36		12			72	4,3	13,0	18,4	
				pilosae) na gajnjaci do lesiviranoj gajnjaci..	6. Tre				8	7,3	13	32,5	49	12					61	5,0	35,4	11,6	
												37,5	83	48					131	14,4	88,7	54,7	
				Izdanacka mešovita šuma lipa (izdanacka šuma lipa i kitnjaka) -								42,5		12	12				24	3,4		20,4	19,3
				jednodobna (u optimalnoj fazi). Ocuvana sastojina. Mešovita sastojina								47,5	12						12	2,2	22,1		
				(smeša stablimicna) gustog sklopa (0.8 - 0.9). u celini zdravstveno								UKUP.	501	131	24	48	48	12	764	34,6	184,5	113,1	19,5
				stanje sastojine je osrednje. po kvalitetu malo vredna sastojina (ima do																			
				20% tehnickog drveta). Srednja ugroženost od insekata. Mala ugroženost od																			

ОПИС СТАНИШТА И САСТОЈИНА

Ozn.mesta		gazdi-	površ-	OPIS	Osnovni taksacioni elementi						visi	deb.	Broj stabala po hektaru							G	Zapremina po		
ode-	od-	nska	ina		vrsta	sme	obr	sta-	sred.stablo		nski			Vrsta drveta						po		Vrsta drv	
ljenje	sek	klasa	ha		drveća	sa	ast	rost	Ds	Hs	step.	st.	1	2	3	4	5	6	svg.	ha	1	2	3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
				vetra. srednje negovana sastojina. Stabla srebrna lipa su zakrivljena i																			
				sa srednjim padom precnika (srednja punodrvnost), sa srednje dugim																			
				krošnjama (dužine izmedu 1/3 i 1/2 visine stabala) i ekscentricnim																			
				krošnjama, do 10% oštecenih stabala od vetra, snega i leda, zdravstveno																			
				stanje stabala ove vrste drveca je dobro. Stabla kitnjaka su zakrivljena																			
				i sa srednjim padom precnika (srednja punodrvnost), sa srednje dugim																			
				krošnjama (dužine izmedu 1/3 i 1/2 visine stabala) i normalno razvijenim																			
				krošnjama, do 10% oštecenih stabala od insekata i fitopatoloških																			
				obolenja, suvih i suhovrhih stabala ima do 10%, zdravstveno stanje																			
20	a	60288484	2,59	stabala ove vrste drveca je osrednje.																			

Ozn.mesta		gazdi-	površ-	OPIS	Osnovni taksacioni elementi						visi	deb.	Broj stabala po hektaru							G	Zapremina po		
ode-	od-	nska	ina		vrsta	sme	obr	sta-	sred.stablo		nski			Vrsta drveta						po		Vrsta drv	
ljenje	sek	klasa	ha		drveća	sa	ast	rost	Ds	Hs	step.	st.	1	2	3	4	5	6	svg.	ha	1	2	3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
				Šuma - nalazi se u uvali i na srednje strmom terenu (nagiba od 6° do	1. SrLip	0,5		80	19	14,0	10	7,5	180		10	32	19	28	268	1,2	3,7		0,1
				10°) - nagib konkavan (ugnut). Nadmorska visina 305 do 450m.	2. Kit	0,4			38	21,1	10	12,5	7		6		7		19	0,2	0,4		0,6
				Ekspozicija 1 jugoistocna. Mrtvi pokrivac srednje zastupljen - povoljan	3. OTL	0,1			19	14,5	11	17,5	3		12	10			25	0,6	0,6		2,2
				proces humifikacije. Retka prizemna vegetacija. Retko žbunje. Slaba	4. Gr				12	10,7	10	22,5	3		3	6			11	0,4	0,7		1,1
				zakorovljenost. tip šume bukve i kitnjaka (Querco-Fagetum typicum) na	5. Cjas				13	10,9	10	27,5	18	9		3	7		36	2,2	7,5	5,3	
				gajnjaci do lesiviranoj gajnjaci i eutricnim smedim do lesiviranim	6. Bag				8	6,8	18	32,5	19	15					33	2,7	13,3	11,8	
				eutricnim smedjim zemljištima..								37,5	41	17					58	6,4	37,6	20,8	
												42,5	10	15					25	3,5	12,0	23,1	
				Izdanacka mešovita šuma lipa (izdanacka šuma lipa i kitnjaka) -								47,5	16	10					26	4,6	28,0	19,0	
				jednodobna (u optimalnoj fazi). Ocuvana sastojina. Mešovita sastojina								52,5	6	3					8	1,8	11,6	7,9	
				(smeša stablimicna) potpunog sklopa (0.7). u celini zdravstveno stanje								67,5	3						3	1,0	10,4		
				sastojine je osrednje. po kvalitetu malo vredna sastojina (ima do 20%								72,5			3				3	1,2			14,9
				tehnickog drveta). Srednja ugroženost od insekata. Srednja ugroženost od								UKUP.	303	69	34	49	32	28	515	25,8	125,8	87,9	19,0
				fitopatoloških oboljenja-oboljenja lista. srednje negovana sastojina.																			
				Stabla srebrna lipa su zakrivljena i sa srednjim padom precnika (srednja																			
				punodrvnost), sa srednje dugim krošnjama (dužine izmedu 1/3 i 1/2 visine																			
				stabala) i ekscentricnim krošnjama, zdravstveno stanje stabala ove vrste																			
				drveca je dobro. Stabla kitnjaka su zakrivljena i sa srednjim padom																			
				precnika (srednja punodrvnost), sa srednje dugim krošnjama (dužine izmedu																			
				1/3 i 1/2 visine stabala) i normalno razvijenim krošnjama, do 10%																			
				oštecenih stabala od insekata i fitopatoloških obolenja, suvih i																			
				suhovrhih stabala ima do 10%, zdravstveno stanje stabala ove vrste																			
20	b	60288601	4,97	drveca je osrednje.																			
				Šuma - nalazi se na strani i na srednje strmom terenu (nagiba od 6° do	1. Kit	0,5		80	33	19,5	11	7,5		149	149	25			323	1,4		2,7	2,6
				10°) - nagib ujednacen. Nadmorska visina 320 do 350m. Ekspozicija 1	2. SrLip	0,3			16	13,5	9	12,5		50					50	0,6		3,5	
				jugoistocna. Mrtvi pokrivac srednje zastupljen - povoljan proces	3. Gr	0,2			14	10,9	9	17,5		25					25	0,6		4,1	
				humifikacije. Srednje gusta prizemna vegetacija. Srednje gusto žbunje.	4. Bk				8	6,1	12	22,5		25					25	1,0		6,0	
				Slaba zakorovljenost. tip šuma kitnjaka i graba sa lazarkinjom (Querco -								27,5	25	50	75				149	8,8	12,9	26,3	48,4
				Carpinetum asperulosum) na gajnjaci do lesiviranoj gajnjaci i lesiviranom								32,5	99	50					149	12,3	86,5	38,7	
				smedem zemljištu na serpentinitu ..								37,5	50						50	5,5	59,9		
												UKUP.	173	347	224	25			769	30,3	159,3	81,3	51,0
				Izdanacka mešovita šuma kitnjaka (izdanacka šuma kitnjaka i lipe) -																			
				jednodobna (u optimalnoj fazi). Ocuvana sastojina. Mešovita sastojina																			
				(smeša stablimicna) gustog sklopa (0.8 - 0.9). u celini zdravstveno																			
				stanje sastojine je osrednje. po kvalitetu malo vredna sastojina (ima do																			
				20% tehnickog drveta). Srednja ugroženost od insekata. Srednja ugroženost																			
				od fitopatoloških oboljenja-oboljenja lista. srednje negovana sastojina.																			
				Stabla srebrna lipa su zakrivljena i sa srednjim padom precnika (srednja																			
				punodrvnost), sa srednje dugim krošnjama (dužine izmedu 1/3 i 1/2 visine																			
				stabala) i ekscentricnim krošnjama, zdravstveno stanje stabala ove vrste																			
				drveca je dobro. Stabla kitnjaka su zakrivljena i sa srednjim padom																			
				precnika (srednja punodrvnost), sa srednje dugim krošnjama (dužine izmedu																			
				1/3 i 1/2 visine stabala) i normalno razvijenim krošnjama, do 10%																			
				oštecenih stabala od insekata i fitopatoloških obolenja, suvih i																			
				suhovrhih stabala ima do 10%, zdravstveno stanje stabala ove vrste																			
20	c	60307261	0,94	drveca je osrednje.																			
				Šuma - nalazi se na strani i na strmom terenu (nagiba od 11° do 15°) -	1. SrLip	0,6		80	18	14,4	8	7,5	223		62	33	23	12	353	1,6	4,7		1,2
				nagib konveksan (ispupcen). Nadmorska visina 350 do 430m. Ekspozicija 1	2. Kit	0,4			32	21,0	9	12,5	51		10				61	0,7	4,1		1,2

ОПИС СТАНИШТА И САСТОЈИНА

Ozn.mesta		gazdi-	površ-	OPIS	Osnovni taksacioni elementi						visi	deb.	Broj stabala po hektaru							G	Zapremina po		
ode-	od-	nska	ina		vrsta	sme	obr	sta-	sred.stablo		nski			Vrsta drveta						po		Vrsta drv	
ljenje	sek	klasa	ha		drveća	sa	ast	rost	Ds	Hs	step.	st.	1	2	3	4	5	6	svg.	ha	1	2	3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
				jugoistocna. Mrtvi pokrivac srednje zastupljen - povoljan proces	3. Cjas				10	10,1	9	17,5	15						15	0,4	2,6		
				humifikacije. Srednje gusta prizemna vegetacija. Srednje gusto žbunje.	4. OTL				8	7,5	9	22,5	42	5	12				59	2,3	13,2	2,2	4,3
				Nema zakorovljenosti. tip šume kitnjaka (Quercetum montanum cariecetosum	5. PBr				8	7,5	9	27,5	39	33					72	4,3	21,3	21,0	
				pilosae) na gajnjaci do lesiviranoj gajnjaci..	6. Tre				8	7,5	12	32,5	36	41					76	6,3	28,3	35,8	
												37,5	27	25					52	5,7	27,2	28,1	
				Izdanacka mešovita šuma lipa (izdanacka šuma lipa i kitnjaka) -								42,5	18	5					23	3,2	26,5	8,6	
				jednodobna (u optimalnoj fazi). Ocuvana sastojina. Mešovita sastojina								47,5	13						13	2,2	22,5		
				(smeša stablimicna) gustog sklopa (0.8 - 0.9). u celini zdravstveno								UKUP.	461	109	84	33	23	12	722	26,8	150,4	95,6	6,8
				stanje sastojine je osrednje. po kvalitetu malo vredna sastojina (ima do																			
				20% tehnickog drveta). Srednja ugroženost od insekata. Mala ugroženost od																			
				vetra. srednje negovana sastojina. Stabla srebrna lipa su zakrivljena i																			
				sa srednjim padom precnika (srednja punodrvnost), sa srednje dugim																			
				krošnjama (dužine izmedu 1/3 i 1/2 visine stabala) i ekscentricnim																			
				krošnjama, do 10% oštecenih stabala od vetra, snega i leda, suvih i																			
				suhovrhih stabala ima do 10%, zdravstveno stanje stabala ove vrste																			
				drveca je dobro. Stabla kitnjaka su zakrivljena i sa srednjim padom																			
				precnika (srednja punodrvnost), sa srednje dugim krošnjama (dužine izmedu																			
				1/3 i 1/2 visine stabala) i normalno razvijenim krošnjama, do 10%																			
				oštecenih stabala od insekata i fitopatoloških obolenja, suvih i																			
				suhovrhih stabala ima do 10%, zdravstveno stanje stabala ove vrste																			
20	d	60288484	6,54	drveca je osrednje.																			

ОПИС СТАНИШТА И САСТОЈИНА

Ozn.mesta		gazdi-	površ-	OPIS	Osnovni taksacioni elementi						visi	deb.	Broj stabala po hektaru							G	Zapremina po		
ode-	od-	nska	ina		vrsta	sme	obr	sta-	sred.stablo		nski			Vrsta drveta						po		Vrsta drv	
ljenje	sek	klasa	ha		drveća	sa	ast	rost	Ds	Hs	step.	st.	1	2	3	4	5	6	svg.	ha	1	2	3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
				Put.																			
20	1	60	0,12																				
				Šuma - nalazi se na strani i na vrlo strmom terenu (nagiba od 26° do	1. Kit	0,6		90	35	20,8	10	7,5		207	62	37	21	27	353	1,6		5,7	1,5
				30°) - nagib ujednacen. Nadmorska visina 284 do 385m. Ekspozicija 1	2. SrLip	0,4			15	12,8	8	12,5		126	16	16	5	5	168	2,1		10,2	1,8
				jugozapadna. Mrtvi pokrivac srednje zastupljen - povoljan proces	3. Brk				9	7,8	9	17,5		42		5			47	1,1		6,7	
				humifikacije. Srednje gusta prizemna vegetacija. Srednje gusto žbunje.	4. OTL				10	8,9	10	22,5		22					22	0,9		6,5	
				Slaba zakorovljenost. tip šume kitnjaka (Quercetum montanum cariecetosum	5. Gr				9	7,8	9	27,5	37	11					47	2,8	21,6	6,2	
				pilosae) na gajnjaci do lesiviranoj gajnjaci..	6. Tre				8	7,6	12	32,5	53	16					69	5,7	47,8	12,7	
												37,5	37	22					58	6,4	43,4	23,2	
				Izdanacka mešovita šuma kitnjaka (izdanacka šuma kitnjaka i lipe) -								42,5	26	11					37	5,2	43,7	13,9	
				jednodobna (u fazi razgradnje). Ocuvana sastojina. Mešovita sastojina								47,5	5	11					16	2,8	12,2	19,3	
				(smeša stablimicna) gustog sklopa (0.8 - 0.9). u celini zdravstveno								UKUP.	158	465	78	58	26	32	816	28,6	168,6	104,4	3,4
				stanje sastojine je osrednje. po kvalitetu malo vredna sastojina (ima do																			
				20% tehnickog drveta). Srednja ugroženost od insekata. Srednja ugroženost																			
				od fitopatoloških oboljenja-oboljenja lista. srednje negovana sastojina.																			
				Stabla srebrna lipa su zakrivljena i sa srednjim padom precnika (srednja																			
				punodrvnost), sa srednje dugim krošnjama (dužine izmedu 1/3 i 1/2 visine																			
				stabala) i ekscentricnim krošnjama, zdravstveno stanje stabala ove vrste																			
				drveca je dobro. Stabla kitnjaka su zakrivljena i sa srednjim padom																			
				precnika (srednja punodrvnost), sa srednje dugim krošnjama (dužine izmedu																			
				1/3 i 1/2 visine stabala) i ekscentricnim krošnjama, od 11-25% oštecenih																			
				stabala od insekata i fitopatoloških obolenja, suvih i sihovrhih stabala																			
21	a	59307484	6,92	ima od 11-25%, zdravstveno stanje stabala ove vrste drveca je osrednje.																			
				Šuma - nalazi se na strani i na vrlo strmom terenu(nagiba od 16° do	1. Kit	0,7		90	35	20,0	10	7,5		196	9	9	48	19	281	1,2		4,1	0,2
				20°) - nagib valovit. Nadmorska visina 350 do 400m. Ekspozicija 1	2. SrLip	0,3			12	10,0	8	12,5		120	9	24			154	1,9		11,0	1,1
				zapadna. Mrtvi pokrivac srednje zastupljen - povoljan proces	3. Brk				10	8,0	10	22,5		9					9	0,4		2,4	
				humifikacije. Retka prizemna vegetacija. Retko žbunje. Slaba	4. Gr				11	8,9	10	27,5	9	37					46	2,8	5,1	19,4	
				zakorovljenost. tip šuma kitnjaka i graba sa lazarkinjom (Querco -	5. Cjas				8	5,9	10	32,5	43						43	3,5	38,7		
				Carpinetum asperulosum) na gajnjaci do lesiviranoj gajnjaci i lesiviranom	6. OTL				8	5,9	10	37,5	67						67	7,4	79,2		
				smedem zemljištu na serpentinitu ..								47,5		9					9	1,6		15,4	
												UKUP.	119	372	19	33	48	19	609	18,8	122,9	52,2	1,3
				Izdanacka mešovita šuma kitnjaka (izdanacka šuma kitnjaka i lipe) -																			
				jednodobna (u fazi razgradnje). Razredjena sastojina. Mešovita sastojina																			
				(smeša stablimicna) nepotpunog sklopa (0.5-0.6). u celini zdravstveno																			
				stanje sastojine je osrednje. po kvalitetu malo vredna sastojina (ima do																			
				20% tehnickog drveta). Srednja ugroženost od insekata. Srednja ugroženost																			
				od fitopatoloških oboljenja-oboljenja lista. pogrešno negovana sastojina.																			
				Stabla srebrna lipa su zakrivljena i sa srednjim padom precnika (srednja																			
				punodrvnost), sa srednje dugim krošnjama (dužine izmedu 1/3 i 1/2 visine																			
				stabala) i ekscentricnim krošnjama, zdravstveno stanje stabala ove vrste																			
				drveca je dobro. Stabla kitnjaka su zakrivljena i sa srednjim padom																			
				precnika (srednja punodrvnost), sa srednje dugim krošnjama (dužine izmedu																			
				1/3 i 1/2 visine stabala) i ekscentricnim krošnjama, od 11-25% oštecenih																			
				stabala od insekata i fitopatoloških obolenja, suvih i sihovrhih stabala																			
21	b	59307261	0,63	ima od 11-25%, zdravstveno stanje stabala ove vrste drveca je osrednje.																			
				Put.																			

ОПИС СТАНИШТА И САСТОЈИНА

Ozn.mesta		gazdi-	površ-	OPIS	Osnovni taksacioni elementi						visi	deb.	Broj stabala po hektaru							G	Zapremina po		
ode-	od-	nska	ina		vrsta	sme	obr	sta-	sred.stablo		nski			Vrsta drveta						po		Vrsta drv	
ljenje	sek	klasa	ha		drveća	sa	ast	rost	Ds	Hs	step.	st.	1	2	3	4	5	6	svg.	ha	1	2	3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
21	1	59	0,19																				

ОПИС СТАНИШТА И САСТОЈИНА

Ozn.mesta		gazdi-	površ-	OPIS	Osnovni taksacioni elementi						visi	deb.	Broj stabala po hektaru							G	Zapremina po		
ode-	od-	nska	ina		vrsta	sme	obr	sta-	sred.stablo		nski			Vrsta drveta						po		Vrsta drv	
ljenje	sek	klasa	ha		drveća	sa	ast	rost	Ds	Hs	step.	st.	1	2	3	4	5	6	svg.	ha	1	2	3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
				Šuma - nalazi se na strani i na srednje strmom terenu (nagiba od 6° do	1. SrLip	0,5		88	17	12,3	9	7,5	222		48	64	45	22	401	1,8	5,2		0,8
				10°) - nagib valovit. Nadmorska visina 310 do 380m. Ekspozicija 1 jug -	2. Kit	0,4			39	20,0	11	12,5	89						89	1,1	6,6		
				jugozapad. Mrtvi pokrivac slabo zastupljen - povoljan proces	3. Gr				9	7,0	11	17,5	26						26	0,6	4,0		
				humifikacije. Gusta prizemna vegetacija. Gusto žbunje. Slaba	4. Klen				8	5,4	11	22,5	8						8	0,3	2,2		
				zakorovljenost. tip šume kitnjaka (Quercetum montanum cariecetosum	5. OTL				8	5,4	11	27,5	9	2	5				16	1,0	3,9	0,9	3,1
				pilosae) na gajnjaci do lesiviranoj gajnjaci..	6. Cjas				8	5,4	11	32,5	15	11					26	2,1	12,1	8,1	
												37,5	23	54					77	8,5	23,4	63,7	
				Izdanacka mešovita šuma lipa (izdanacka šuma lipa i kitnjaka) -								42,5	14	16					30	4,3	20,5	25,2	
				jednodobna (u fazi razgradnje). Razredjena sastojina. Mešovita sastojina								47,5	13	16					29	5,1	22,4	31,1	
				(smeša stablimicna) retkog sklopa (0.5). u celini zdravstveno stanje								52,5	18						18	3,9	39,7		
				sastojine je osrednje. po kvalitetu malo vredna sastojina (ima do 20%								57,5	5						5	1,4	15,0		
				tehnickog drveta). Srednja ugroženost od insekata. Srednja ugroženost od								62,5	2						2	0,7	7,2		
				fitopatoloških oboljenja-oboljenja kore. pogrešno negovana sastojina.								UKUP.	444	99	53	64	45	22	727	30,8	162,3	128,9	3,9
				Stabla srebrna lipa su zakrivljena i sa srednjim padom precnika (srednja																			
				punodrvnost), sa srednje dugim krošnjama (dužine izmedu 1/3 i 1/2 visine																			
				stabala) i ekscentricnim krošnjama, zdravstveno stanje stabala ove vrste																			
				drveca je osrednje. Stabla kitnjaka su zakrivljena i sa srednjim padom																			
				precnika (srednja punodrvnost), sa srednje dugim krošnjama (dužine izmedu																			
				1/3 i 1/2 visine stabala) i normalno razvijenim krošnjama, od 11-25%																			
				oštecenih stabala od insekata, od 11-25% oštecenih stabala od																			
				fitopatoloških obolenja, suvih i suhovrhih stabala ima do 10%,																			
22	a	60288484	8,70	zdravstveno stanje stabala ove vrste drveca je osrednje.																			
				Šuma - nalazi se i na srednje strmom terenu (nagiba od 6° do 10°) -	1. SrLip	0,8		88	23	17,2	6	7,5	163		31	45	14	28	280	1,2	4,1		0,4
				nagib valovit. Nadmorska visina 335 do 425m. Ekspozicija 1 zapadna.	2. Kit	0,2			39	22,2	9	12,5	21			2		5	28	0,3	1,6		
				Mrtvi pokrivac srednje zastupljen - povoljan proces humifikacije. Gusta	3. Bk	0,1			16	12,1	12	17,5	12			5			17	0,4	2,4		
				prizemna vegetacija. Gusto žbunje. Nema zakorovljenosti. tip šume	4. OTL				9	6,7	9	22,5	15				6		20	0,8	5,8		
				kitnjaka (Quercetum montanum cariecetosum pilosae) na gajnjaci do	5. Gr				12	9,2	9	27,5	13						13	0,8	7,7		
				lesiviranoj gajnjaci..	6. Cjas				8	6,3	9	32,5	28	15					43	3,6	23,2	13,7	
												37,5	36		5				42	4,6	43,5		6,2
				Izdanacka mešovita šuma lipa (izdanacka šuma lipa i kitnjaka) -								42,5	24	15	5				44	6,3	39,4	26,0	9,4
				jednodobna (u fazi razgradnje). Razredjena sastojina. Mešovita sastojina								47,5	18	7					25	4,4	35,4	15,8	
				(smeša stablimicna) retkog sklopa (0.5). u celini zdravstveno stanje								52,5	29						29	6,2	69,3		
				sastojine je osrednje. po kvalitetu malo vredna sastojina (ima do 20%								57,5	2						2	0,5	5,8		
				tehnickog drveta). Srednja ugroženost od insekata. Srednja ugroženost od								UKUP.	360	38	41	52	20	33	543	29,1	238,1	55,6	16,0
				vetra. pogrešno negovana sastojina. Stabla srebrna lipa su zakrivljena i																			
				sa srednjim padom precnika (srednja punodrvnost), sa srednje dugim																			
				krošnjama (dužine izmedu 1/3 i 1/2 visine stabala) i ekscentricnim																			
				krošnjama, do 10% oštecenih stabala od vetra, snega i leda, suvih i																			
				suhovrhih stabala ima do 10%, zdravstveno stanje stabala ove vrste																			
				drveca je osrednje. Stabla kitnjaka su zakrivljena i sa srednjim padom																			
				precnika (srednja punodrvnost), sa srednje dugim krošnjama (dužine izmedu																			
				1/3 i 1/2 visine stabala) i ekscentricnim krošnjama, do 10% oštecenih																			
				stabala od insekata, do 10% oštecenih stabala od fitopatoloških obolenja,																			
				suvih i suhovrhih stabala ima do 10%, zdravstveno stanje stabala ove																			
22	b	59288484	8,20	vrste drveca je osrednje.																			
				Šuma - nalazi se na strani i na vrlo strmom terenu (nagiba od 21° do	1. Kit	0,5		88	39	20,2	11	7,5		81	41	34	35	33	224	1,0		1,5	1,0
				25°) - nagib valovit. Nadmorska visina 290 do 380m. Ekspozicija 1	2. SrLip	0,5			22	15,6	9	12,5		23	11	11			45	0,5		1,2	1,2
				zapadna. Ugroženost zemljišta vodnom erozijom - klizišta. Mrtvi pokrivac	3. Gr				12	10,5	11	17,5		21	11				32	0,8		3,7	2,5

ОПИС СТАНИШТА И САСТОЈИНА

Ozn.mesta		gazdi-	površ-	OPIS	Osnovni taksacioni elementi						visi	deb.	Broj stabala po hektaru							G	Zapremina po		
ode-	od-	nska	ina		vrsta	sme	obr	sta-	sred.stablo		nski			Vrsta drveta						po		Vrsta drv	
ljenje	sek	klasa	ha		drveća	sa	ast	rost	Ds	Hs	step.	st.	1	2	3	4	5	6	svg.	ha	1	2	3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
				slabo zastupljen - povoljan proces humifikacije. Gusta prizemna	4. OTL				13	11,5	11	22,5		12	11				23	0,9		3,9	2,8
				vegetacija. Gusto žbunje. tip šume bukve i kitnjaka (Querco-Fagetum	5. Bag				8	6,9	17	27,5	5	33					38	2,3	3,1	16,3	
				typicum) na gajnjaci do lesiviranoj gajnjaci i eutricnim smedim do	6. Mle				8	6,9	11	32,5	16			11			27	2,2	12,1		
				lesiviranim eutricnim smedjim zemljištima..								37,5	27	34					61	6,7	32,6	34,4	
												42,5	26	23					49	6,9	40,7	33,0	
				Izdanacka mešovita šuma kitnjaka (izdanacka šuma kitnjaka i lipe) -								47,5		11					11	2,0		19,3	
				jednodobna (u fazi razgradnje). Razredjena sastojina. Mešovita sastojina								52,5	11						11	2,3	28,0		
				(smeša stablimicna) retkog sklopa (0.5). u celini zdravstveno stanje								UKUP.	84	237	74	56	35	33	519	25,6	116,4	113,3	7,5
				sastojine je osrednje. po kvalitetu malo vredna sastojina (ima do 20%																			
				tehnickog drveta). Srednja ugroženost od insekata. Srednja ugroženost od																			
				vetra. pogrešno negovana sastojina. Stabla srebrna lipa su zakrivljena i																			
				sa srednjim padom precnika (srednja punodrvnost), sa srednje dugim																			
				krošnjama (dužine izmedu 1/3 i 1/2 visine stabala) i ekscentricnim																			
				krošnjama, do 10% oštecenih stabala od vetra, snega i leda, zdravstveno																			
				stanje stabala ove vrste drveca je osrednje. Stabla kitnjaka su																			
				zakrivljena i sa srednjim padom precnika (srednja punodrvnost), sa																			
				srednje dugim krošnjama (dužine izmedu 1/3 i 1/2 visine stabala) i																			
				ekscentricnim krošnjama, do 10% oštecenih stabala od vetra, snega i leda,																			
				do 10% oštecenih stabala od insekata i fitopatoloških obolenja, suvih i																			
				suhovrhih stabala ima do 10%, zdravstveno stanje stabala ove vrste																			
22	c	59307601	2,05	drveca je osrednje.																			

ОПИС СТАНИШТА И САСТОЈИНА

Ozn.mesta		gazdi-	površ-	OPIS	Osnovni taksacioni elementi						visi	deb.	Broj stabala po hektaru							G	Zapremina po		
ode-	od-	nska	ina		vrsta	sme	obr	sta-	sred.stablo		nski			Vrsta drveta						po		Vrsta drv	
ljenje	sek	klasa	ha		drveća	sa	ast	rost	Ds	Hs	step.	st.	1	2	3	4	5	6	svg.	ha	1	2	3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
				Šumsko zemljište.																			
22	1	60	0,66																				
				Livada.																			
22	2	60	0,04																				
				Put.																			
22	3	59	0,46																				
				Šuma - nalazi se na strani i na srednje strmom terenu (nagiba od 6° do	1. Kit	0,7		109	40	21,9	10	7,5		102	17	40	48	10	217	1,0		2,4	0,4
				10°) - nagib valovit. Nadmorska visina 320 do 402m. Ekspozicija 1	2. SrLip	0,2			16	12,9	9	12,5		61		4	7	2	75	0,9		4,2	
				istocna. Srednje gusta prizemna vegetacija. Gusto žbunje. Slaba	3. OTL				17	13,8	10	17,5		16		2			18	0,4		3,0	
				zakorovljenost. tip šume kitnjaka (Quercetum montanum cariecetosum	4. Gr				10	9,3	10	22,5	4	10					14	0,6	1,7	3,0	
				pilosae) na gajnjaci do lesiviranoj gajnjaci..	5. Tre				8	7,3	13	27,5	5	5		5			16	0,9	2,6	2,6	
					6. Klen				8	7,6	10	32,5	26	8					34	2,8	21,8	5,3	
				Izdanacka mešovita šuma kitnjaka (izdanacka šuma kitnjaka i lipe) -								37,5	56						56	6,2	68,8		
				jednodobna (u fazi razgradnje). Ocuvana sastojina. Mešovita sastojina								42,5	23	16					39	5,5	36,2	22,5	
				(smeša stablimicna) potpunog sklopa (0.7). u celini zdravstveno stanje								47,5	20	6					26	4,5	41,1	8,7	
				sastojine je osrednje. po kvalitetu malo vredna sastojina (ima do 20%								52,5	15		2				17	3,7	40,2		5,3
				tehnickog drveta). Srednja ugroženost od insekata. Srednja ugroženost od								57,5		6	2				8	2,0		14,5	6,3
				fitopatoloških oboljenja-oboljenja kore. srednje negovana sastojina.								62,5	2						2	0,7	7,9		
				Stabla srebrna lipa su zakrivljena i sa srednjim padom precnika (srednja								UKUP.	152	229	22	52	56	12	522	29,2	220,2	66,2	12,0
				punodrvnost), sa srednje dugim krošnjama (dužine izmedu 1/3 i 1/2 visine																			
				stabala) i ekscentricnim krošnjama, zdravstveno stanje stabala ove vrste																			
				drveca je dobro. Stabla kitnjaka su zakrivljena i sa srednjim padom																			
				precnika (srednja punodrvnost), sa srednje dugim krošnjama (dužine izmedu																			
				1/3 i 1/2 visine stabala) i normalno razvijenim krošnjama, od 11-25%																			
				oštecenih stabala od insekata i fitopatoloških obolenja, zdravstveno																			
23	a	60307484	7,04	stanje stabala ove vrste drveca je osrednje.																			
				Šuma - nalazi se na strani i na strmom terenu (nagiba od 11° do 15°) -	1. Bk	0,7		109	23	21,8	6	7,5	125		19	28			172	0,8	3,4		0,5
				nagib valovit. Nadmorska visina 300 do 400m. Ekspozicija 1 istocna.	2. Kit	0,2			38	25,5	7	12,5	19		9				28	0,3	1,5		1,1
				Mrtvi pokrivac slabo zastupljen - povoljan proces humifikacije. Srednje	3. SrLip	0,1			26	22,2	4	17,5	9						9	0,2	2,1		
				gusta prizemna vegetacija. Srednje gusto žbunje. Slaba zakorovljenost.	4. Gr				11	12,8	5	22,5	38				3		41	1,6	16,0		
				tip šume bukve i kitnjaka (Querco-Fagetum typicum) na gajnjaci do	5. Brk				23	20,6	5	27,5	17	9					26	1,6	11,2	6,9	
				lesiviranoj gajnjaci i eutricnim smedim do lesiviranim eutricnim smedjim								32,5	17						17	1,4	18,4		
				zemljištima..								37,5	17	22		3			43	4,7	23,7	33,3	
												42,5	21	28					49	6,9	44,4	48,4	
				Izdanacka mešovita šuma bukve (izdanacka šuma bukve i kitnjaka) -								47,5	12		13				25	4,4	32,5		26,6
				jednodobna (u fazi razgradnje). Razredjena sastojina. Mešovita sastojina								52,5	12		4				15	3,3	36,6		10,1
				(smeša stablimicna) nepotpunog sklopa (0.5-0.6). u celini zdravstveno								57,5	12		3				15	3,9	45,8		10,0
				stanje sastojine je osrednje. po kvalitetu malo vredna sastojina (ima do								62,5	4						4	1,2	19,2		
				20% tehnickog drveta). Srednja ugroženost od insekata. Mala ugroženost od								67,5	4						4	1,4	20,1		
				vetra. pogrešno negovana sastojina. Stabla srebrna lipa su zakrivljena i								UKUP.	305	60	48	31	3		448	31,7	274,8	88,6	48,4
				sa srednjim padom precnika (srednja punodrvnost), sa srednje dugim																			
				krošnjama (dužine izmedu 1/3 i 1/2 visine stabala) i ekscentricnim																			

ОПИС СТАНИШТА И САСТОЈИНА

Ozn.mesta		gazdi-	površ-	OPIS	Osnovni taksacioni elementi						visi	deb.	Broj stabala po hektaru							G	Zapremina po		
ode-	od-	nska	ina		vrsta	sme	obr	sta-	sred.stablo		nski			Vrsta drveta						po		Vrsta drv	
ljenje	sek	klasa	ha		drveća	sa	ast	rost	Ds	Hs	step.	st.	1	2	3	4	5	6	svg.	ha	1	2	3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
				krošnjama, zdravstveno stanje stabala ove vrste drveca je dobro. Stabla																			
				kitnjaka su zakrivljena i sa srednjim padom precnika (srednja																			
				punodrvnost), sa srednje dugim krošnjama (dužine izmedu 1/3 i 1/2 visine																			
				stabala) i normalno razvijenim krošnjama, od 11-25% oštecenih stabala od																			
				insekata i fitopatoloških obolenja, zdravstveno stanje stabala ove vrste																			
				drveca je osrednje. Stabla bukve su zakrivljena i sa srednjim padom																			
				precnika (srednja punodrvnost), sa srednje dugim krošnjama (dužine izmedu																			
				1/3 i 1/2 visine stabala) i ekscentricnim krošnjama, do 10% oštecenih																			
				stabala od vetra, snega i leda, zdravstveno stanje stabala ove vrste																			
23	b	59361601	3,91	drveca je dobro.																			

Ozn.mesta		gazdi-	površ-	OPIS	Osnovni taksacioni elementi						visi	deb.	Broj stabala po hektaru							G	Zapremina po		
ode-	od-	nska	ina		vrsta	sme	obr	sta-	sred.stablo		nski			Vrsta drveta						po		Vrsta drv	
ljenje	sek	klasa	ha		drveća	sa	ast	rost	Ds	Hs	step.	st.	1	2	3	4	5	6	svg.	ha	1	2	3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
				Šuma - nalazi se na strani i na strmom terenu (nagiba od 11° do 15°) -	1. Kit	0,3		109	25	15,5	12	7,5	12		112	262	23	12	421	1,9	0,1		2,2
				nagib valovit. Nadmorska visina 385 do 445m. Ekspozicija 1 istocna.	2. Cer	0,5			36	18,2	11	12,5	12		24	41	58		136	1,7	0,5		1,3
				Mrtvi pokrivac slabo zastupljen - povoljan proces humifikacije. Srednje	3. SrLip	0,1			12	9,7	10	17,5			34	12		5	51	1,2			4,4
				gusta prizemna vegetacija. Srednje gusto žbunje. Slaba zakorovljenost.	4. Cjas	0,1			9	6,9	12	22,5	24		12				36	1,4	7,3		2,8
				tip šume kitnjaka i cera (Quercetum petraea-cerris pauperum) na kiselim	5. Brk				11	8,9	12	27,5	27	23	15				65	3,9	12,3	14,5	6,6
				smedim i lesiviranim kiselim smedjim zemljištima..	6. OTL				10	8,4	12	32,5	27	23					50	4,1	20,6	20,3	
												37,5	12	24					36	4,0	13,8	27,0	
				Izdanacka mešovita šuma kitnjaka (izdanacka šuma kitnjaka i cera) -								47,5		23					23	4,1		40,7	
				jednodobna (u fazi razgradnje). Ocuvana sastojina. Mešovita sastojina								UKUP.	114	93	197	315	81	17	818	22,3	54,7	102,5	17,2
				(smeša stablimicna) gustog sklopa (0.8 - 0.9). u celini zdravstveno																			
				stanje sastojine je osrednje. po kvalitetu malo vredna sastojina (ima do																			
				20% tehnickog drveta). Srednja ugroženost od insekata. Srednja ugroženost																			
				od fitopatoloških oboljenja-oboljenja kore. srednje negovana sastojina.																			
				Stabla cera su zakrivljena i sa srednjim padom precnika (srednja																			
				punodrvnost), sa srednje dugim krošnjama (dužine izmedu 1/3 i 1/2 visine																			
				stabala) i ekscentricnim krošnjama, od 11-25% oštecenih stabala od																			
				insekata i fitopatoloških obolenja, zdravstveno stanje stabala ove vrste																			
				drveca je osrednje. Stabla srebrna lipa su zakrivljena i sa srednjim																			
				padom precnika (srednja punodrvnost), sa srednje dugim krošnjama (dužine																			
				izmedu 1/3 i 1/2 visine stabala) i ekscentricnim krošnjama, zdravstveno																			
				stanje stabala ove vrste drveca je dobro. Stabla kitnjaka su zakrivljena																			
				i sa srednjim padom precnika (srednja punodrvnost), sa srednje dugim																			
				krošnjama (dužine izmedu 1/3 i 1/2 visine stabala) i normalno razvijenim																			
				krošnjama, od 11-25% oštecenih stabala od insekata i fitopatoloških																			
23	c	59307465	2,78	obolenja, zdravstveno stanje stabala ove vrste drveca je osrednje.																			
				Šuma - nalazi se na strani i na strmom terenu (nagiba od 11° do 15°) -	1. Kit	0,6		109	37	23,0	8	7,5		265	18	48	29	9	369	1,6		7,1	0,3
				nagib valovit. Nadmorska visina 375 do 450m. Ekspozicija 1 istok -	2. SrLip	0,4			14	13,6	6	12,5		115	20	10			144	1,8		9,8	1,5
				severoistok. Mrtvi pokrivac slabo zastupljen - povoljan proces	3. Brk				10	10,3	8	17,5		20					20	0,5		3,3	
				humifikacije. Srednje gusta prizemna vegetacija. Srednje gusto žbunje.	4. Cjas				8	8,6	8	22,5		9					9	0,4		3,1	
				Srednja zakorovljenost. tip šume kitnjaka (Quercetum montanum	5. Gr				8	7,7	8	27,5	20						20	1,2	11,8		
				cariecetosum pilosae) na gajnjaci do lesiviranoj gajnjaci..	6. Mle				8	7,7	8	32,5	38	10					48	3,9	32,5	8,8	
												37,5	39						39	4,3	48,6		
				Izdanacka mešovita šuma kitnjaka (izdanacka šuma kitnjaka i lipe) -								42,5	29	10					39	5,5	51,7	16,9	
				jednodobna (u fazi razgradnje). Ocuvana sastojina. Mešovita sastojina								47,5	18	29					47	8,4	44,0	55,9	
				(smeša stablimicna) gustog sklopa (0.8 - 0.9). u celini zdravstveno								52,5		10					10	2,1		22,7	
				stanje sastojine je osrednje. po kvalitetu malo vredna sastojina (ima do								UKUP.	143	467	38	57	29	9	743	29,6	188,6	127,6	1,8
				20% tehnickog drveta). Srednja ugroženost od insekata. Srednja ugroženost																			
				od fitopatoloških oboljenja-oboljenja kore. srednje negovana sastojina.																			
				Stabla srebrna lipa su zakrivljena i sa srednjim padom precnika (srednja																			
				punodrvnost), sa srednje dugim krošnjama (dužine izmedu 1/3 i 1/2 visine																			
				stabala) i ekscentricnim krošnjama, zdravstveno stanje stabala ove vrste																			
				drveca je dobro. Stabla kitnjaka su zakrivljena i sa srednjim padom																			
				precnika (srednja punodrvnost), sa srednje dugim krošnjama (dužine izmedu																			
				1/3 i 1/2 visine stabala) i normalno razvijenim krošnjama, do 10%																			
				oštecenih stabala od insekata i fitopatoloških obolenja, zdravstveno																			
23	d	59307484	3,09	stanje stabala ove vrste drveca je osrednje.																			
				Put.																			

ОПИС СТАНИШТА И САСТОЈИНА

Ozn.mesta		gazdi-	površ-	OPIS	Osnovni taksacioni elementi						visi	deb.	Broj stabala po hektaru							G	Zapremina po		
ode-	od-	nska	ina		vrsta	sme	obr	sta-	sred.stablo		nski			Vrsta drveta						po		Vrsta drv	
ljenje	sek	klasa	ha		drveća	sa	ast	rost	Ds	Hs	step.	st.	1	2	3	4	5	6	svg.	ha	1	2	3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
23	1	60	0,16																				
				Šuma - nalazi se na strani i na blago nagnutom terenu (nagiba do 5°) -	1. SrLip	0,6		109	40	20,3	9	7,5	4		8	12	12	16	52	0,2	0,1		0,1
				nagib ujednacen. Nadmorska visina 430 do 465m. Ekspozicija l južna.	2. Kit	0,4			41	20,1	11	12,5				4	8	4	16	0,2			
				Mrtvi pokrivac slabo zastupljen - povoljan proces humifikacije. Retka	3. OTL				23	15,7	11	17,5	8			12			20	0,5	1,3		
				prizemna vegetacija. Retko žbunje. Jaka zakorovljenost. tip šuma kitnjaka	4. Gr				15	12,4	11	22,5	4	4		4			12	0,5	1,3	1,4	
				i graba sa lazarkinjom (Querco - Carpinetum asperulosum) na gajnjaci do	5. Mle				10	8,4	11	27,5	12	12		4			28	1,7	6,2	6,0	
				lesiviranoj gajnjaci i lesiviranom smedem zemljištu na serpentinitu ..	6. Brk				8	7,6	11	32,5	28	16					44	3,6	21,7	12,7	
												37,5	12	12					24	2,6	12,9	13,8	
				Izdanacka mešovita šuma lipa (izdanacka šuma lipa i kitnjaka) -								42,5	36	24					60	8,5	46,7	37,0	
				jednodobna (u fazi razgradnje). Ocuvana sastojina. Mešovita sastojina								47,5	28	12					40	7,0	50,4	24,2	
				(smeša stablimicna) potpunog sklopa (0.7). u celini zdravstveno stanje								52,5	20	16	4				40	8,6	43,3	38,6	9,1
				sastojine je osrednje. po kvalitetu malo vredna sastojina (ima do 20%								57,5	12	4					16	4,1	30,9	11,3	
				tehnickog drveta). Srednja ugroženost od insekata. Srednja ugroženost od								62,5	4						4	1,2	13,1		
				fitopatoloških oboljenja-oboljenja kore. srednje negovana sastojina.								UKUP.	167	100	12	36	20	20	354	38,7	227,8	145,0	9,2
				Stabla srebrna lipa su zakrivljena i sa srednjim padom precnika (srednja																			
				punodrvnost), sa srednje dugim krošnjama (dužine izmedu 1/3 i 1/2 visine																			
				stabala) i ekscentricnim krošnjama, do 10% oštecenih stabala od guljenja																			
				kore, zdravstveno stanje stabala ove vrste drveca je dobro. Stabla																			
				kitnjaka su zakrivljena i sa srednjim padom precnika (srednja																			
				punodrvnost), sa srednje dugim krošnjama (dužine izmedu 1/3 i 1/2 visine																			
				stabala) i normalno razvijenim krošnjama, od 11-25% oštecenih stabala od																			
				insekata i fitopatoloških obolenja, do 10% oštecenih stabala od guljenja																			
24	a	59288261	3,03	kore, zdravstveno stanje stabala ove vrste drveca je osrednje.																			

Ozn.mesta		gazdi-	površ-	OPIS	Osnovni taksacioni elementi						visi	deb.	Broj stabala po hektaru							G	Zapremina po		
ode-	od-	nska	ina		vrsta	sme	obr	sta-	sred.stablo		nski			Vrsta drveta						po		Vrsta drv	
ljenje	sek	klasa	ha		drveća	sa	ast	rost	Ds	Hs	step.	st.	1	2	3	4	5	6	svg.	ha	1	2	3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
				Šuma - nalazi se na strani i na srednje strmom terenu (nagiba od 6° do	1. Kit	0,7		109	38	20,8	10	7,5		181	35	65	28	28	335	1,5		5,1	1,2
				10°) - nagib valovit. Nadmorska visina 380 do 445m. Ekspozicija 1	2. SrLip	0,2			14	13,7	5	12,5		75	48	13	14	7	157	1,9		6,5	3,0
				južna. Mrtvi pokrivac slabo zastupljen - povoljan proces humifikacije.	3. Gr				11	10,6	9	17,5		46	7			13	66	1,6		8,6	1,0
				Retka prizemna vegetacija. Retko žbunje. Srednja zakorovljenost. tip šume	4. OTL				11	10,5	9	22,5		26	3		3		31	1,2		8,7	1,0
				kitnjaka (Quercetum montanum cariecetosum pilosae) na gajnjaci do	5. Brk				10	9,5	9	27,5	10	26		13			49	2,9	5,9	16,5	
				lesiviranoj gajnjaci..	6. Cjas				11	10,4	9	32,5	48						48	4,0	39,8		
												37,5	67	20					87	9,6	79,8	25,3	
				Izdanacka mešovita šuma kitnjaka (izdanacka šuma kitnjaka i lipe) -								42,5	50						50	7,1	81,1		
				jednodobna (u fazi razgradnje). Ocuvana sastojina. Mešovita sastojina								47,5	23	3					26	4,6	45,8	4,9	
				(smeša stablimicna) gustog sklopa (0.8 - 0.9). u celini zdravstveno								UKUP.	198	376	92	91	44	47	848	34,3	252,5	75,6	6,2
				stanje sastojine je osrednje. po kvalitetu malo vredna sastojina (ima do																			
				20% tehnickog drveta). Srednja ugroženost od insekata. Srednja ugroženost																			
				od fitopatoloških oboljenja-oboljenja kore. srednje negovana sastojina.																			
				Stabla srebrna lipa su zakrivljena i sa srednjim padom precnika (srednja																			
				punodrvnost), sa srednje dugim krošnjama (dužine izmedu 1/3 i 1/2 visine																			
				stabala) i ekscentricnim krošnjama, zdravstveno stanje stabala ove vrste																			
				drveca je dobro. Stabla kitnjaka su zakrivljena i sa srednjim padom																			
				precnika (srednja punodrvnost), sa srednje dugim krošnjama (dužine izmedu																			
				1/3 i 1/2 visine stabala) i normalno razvijenim krošnjama, do 10%																			
				oštecenih stabala od insekata, suvih i suhovrhih stabala ima do 10%,																			
24	b	59307484	5,34	zdravstveno stanje stabala ove vrste drveca je osrednje.																			
				Šuma - nalazi se na strani i na vrlo strmom terenu (nagiba od 21° do	1. Kit	0,7		109	29	16,1	12	7,5		227	409	45	45	89	815	3,6		4,8	8,9
				25°) - nagib valovit. Nadmorska visina 345 do 415m. Ekspozicija 1	2. SrLip	0,2			11	7,9	10	12,5		36	126	18	18		198	2,4		1,9	8,6
				južna. Mrtvi pokrivac slabo zastupljen - povoljan proces humifikacije.	3. Cjas	0,1			9	6,3	12	17,5	18	18					36	0,9	3,3	3,7	
				Retka prizemna vegetacija. Retko žbunje. Slaba zakorovljenost. tip šume	4. Brk				9	6,1	12	22,5	54	27					82	3,2	15,6	7,5	
				kitnjaka i cera (Quercetum petraeae-cerris typicum) na lesiviranim	5. OTL				9	6,1	12	27,5	45	27	18				89	5,3	22,6	13,4	7,1
				gajnjacama i beskarbonatnom deluvijumu..	6. Gr				8	4,9	12	32,5	54						54	4,5	40,9		
												42,5	27						27	3,9	40,4		
				Izdanacka mešovita šuma kitnjaka (izdanacka šuma kitnjaka i lipe) -								UKUP.	199	335	552	63	63	89	1302	23,8	122,7	31,3	24,6
				jednodobna (u fazi razgradnje). Ocuvana sastojina. Mešovita sastojina																			
				(smeša stablimicna) potpunog sklopa (0.7). u celini zdravstveno stanje																			
				sastojine je osrednje. po kvalitetu malo vredna sastojina (ima do 20%																			
				tehnickog drveta). Srednja ugroženost od insekata. Srednja ugroženost od																			
				fitopatoloških oboljenja-oboljenja kore. srednje negovana sastojina.																			
				Stabla srebrna lipa su zakrivljena i sa srednjim padom precnika (srednja																			
				punodrvnost), sa srednje dugim krošnjama (dužine izmedu 1/3 i 1/2 visine																			
				stabala) i ekscentricnim krošnjama, zdravstveno stanje stabala ove vrste																			
				drveca je dobro. Stabla kitnjaka su zakrivljena i sa srednjim padom																			
				precnika (srednja punodrvnost), sa srednje dugim krošnjama (dužine izmedu																			
				1/3 i 1/2 visine stabala) i ekscentricnim krošnjama, od 11-25% oštecenih																			
				stabala od insekata i fitopatoloških obolenja, zdravstveno stanje																			
24	c	59307463	2,99	stabala ove vrste drveca je osrednje.																			
				Put.																			
24	1	59	0,04																				
				Šuma - nalazi se u uvali i na srednje strmom terenu (nagiba od 6° do	1. SrLip	0,3		93	14	12,1	9	7,5	395		296				691	3,1	8,6		6,9
				10°) - nagib ujednacen. Nadmorska visina 400 do 455m. Ekspozicija 1	2. Tre	0,4			43	16,6	17	12,5	99		296				395	4,8	5,1		23,0

ОПИС СТАНИШТА И САСТОЈИНА

Ozn.mesta		gazdi-	površ-	OPIS	Osnovni taksacioni elementi						visi	deb.	Broj stabala po hektaru							G	Zapremina po		
ode-	od-	nska	ina		vrsta	sme	obr	sta-	sred.stablo		nski			Vrsta drveta						po		Vrsta drv	
ljenje	sek	klasa	ha		drveća	sa	ast	rost	Ds	Hs	step.	st.	1	2	3	4	5	6	svg.	ha	1	2	3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
				južna. Mrtvi pokrivac srednje zastupljen - povoljan proces humifikacije.	3. Bag	0,3			13	11,6	15	17,5			99				99	2,4			22,1
				Srednje gusta prizemna vegetacija. Retko žbunje. Slaba zakorovljenost.								22,5	99		99				198	7,9	23,9		28,4
				tip šume bukve i kitnjaka (Querco-Fagetum caricetosum silvaticae) na								32,5	99						99	8,2	71,7		
				beskarbonatnom deluvijumu..								42,5		99					99	14,0		128,6	
												UKUP.	691	99	790				1580	40,3	109,3	128,6	80,5
				Izdanacka mešovita šuma lipa - jednodobna (u fazi razgradnje). Ocuvana																			
				sastojina. Mešovita sastojina (smeša stablimicna) potpunog sklopa (0.7).																			
				u celini zdravstveno stanje sastojine je osrednje. po kvalitetu sastojina																			
				bez vrednosti (bez ucešca tehnickog drveta). Srednja ugroženost od																			
				insekata. Srednja ugroženost od fitopatoloških oboljenja-oboljenja kore.																			
				srednje negovana sastojina. Stabla srebrna lipa su zakrivljena i sa																			
				srednjim padom precnika (srednja punodrvnost), sa srednje dugim krošnjama																			
				(dužine izmedu 1/3 i 1/2 visine stabala) i ekscentricnim krošnjama,																			
				zdravstveno stanje stabala ove vrste drveca je dobro. Stabla bagrema su																			
				prava i sa malim padom precnika (velika punodrvnost), sa srednje dugim																			
				krošnjama (dužine izmedu 1/3 i 1/2 visine stabala) i ekscentricnim																			
				krošnjama, do 10% oštecenih stabala od insekata i fitopatoloških																			
25	a	60288603	0,26	obolenja, zdravstveno stanje stabala ove vrste drveca je dobro.																			

Ozn.mesta		gazdi-	površ-	OPIS	Osnovni taksacioni elementi						visi	deb.	Broj stabala po hektaru							G	Zapremina po		
ode-	od-	nska	ina		vrsta	sme	obr	sta-	sred.stablo		nski			Vrsta drveta						po		Vrsta drv	
ljenje	sek	klasa	ha		drveća	sa	ast	rost	Ds	Hs	step.	st.	1	2	3	4	5	6	svg.	ha	1	2	3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
				Šuma - nalazi se na strani i na vrlo strmom terenu(nagiba od 16° do	1. Kit	0,8		93	37	22,7	9	7,5		211	61	46	15		332	1,5		5,8	1,3
				20°) - nagib ujednacen. Nadmorska visina 395 do 465m. Ekspozicija 1	2. SrLip	0,2			13	11,2	6	12,5		84	48	10	10	5	158	1,9		6,6	4,0
				južna. Mrtvi pokrivac srednje zastupljen - povoljan proces humifikacije.	3. Brk				10	8,8	9	17,5		43	5	5		5	58	1,4		7,1	0,8
				Srednje gusta prizemna vegetacija. Retko žbunje. Slaba zakorovljenost.	4. Cjas				10	8,4	9	22,5	10	15		2			26	1,0	3,9	5,3	
				tip šume kitnjaka (Quercetum montanum typicum) na kiselom smedem i	5. OTL				11	9,6	8	27,5		8			2		10	0,6		3,9	
				lesiviranom kiselom smedjem zemljištu..	6. Gr				15	12,8	9	32,5	55						55	4,6	47,1		
												37,5	68	25					93	10,2	83,5	29,6	
				Izdanacka mešovita šuma kitnjaka (izdanacka šuma kitnjaka i lipe) -								42,5	51	2					53	7,6	83,4	3,1	
				jednodobna (u fazi razgradnje). Ocuvana sastojina. Mešovita sastojina								47,5	5						5	0,9	10,1		
				(smeša stablimicna) vrlo gustog sklopa (1.0). u celini zdravstveno stanje								UKUP.	189	387	114	64	27	11	791	29,7	227,9	61,3	6,1
				sastojine je osrednje. po kvalitetu malo vredna sastojina (ima do 20%																			
				tehnickog drveta). Srednja ugroženost od insekata. Srednja ugroženost od																			
				fitopatoloških oboljenja-oboljenja kore. srednje negovana sastojina.																			
				Stabla srebrna lipa su kriva i sa velikim padom precnika (mala																			
				punodrvnost), sa dugim krošnjama (dužine izmedu 1/2 i 2/3 visine stabala)																			
				i ekscentricnim krošnjama, zdravstveno stanje stabala ove vrste drveca																			
				je dobro. Stabla kitnjaka su zakrivljena i sa srednjim padom precnika																			
				(srednja punodrvnost), sa srednje dugim krošnjama (dužine izmedu 1/3 i																			
				1/2 visine stabala) i normalno razvijenim krošnjama, od 11-25% oštecenih																			
				stabala od insekata i fitopatoloških obolenja, zdravstveno stanje																			
25	b	59307482	5,10	stabala ove vrste drveca je osrednje.																			
				Šuma - nalazi se na strani i na vrlo strmom terenu(nagiba od 21° do	1. Cer	0,8		82	26	13,1	14	7,5			205				205	0,9			4,2
				25°) - nagib ujednacen. Nadmorska visina 370 do 405m. Ekspozicija 1	2. Kit	0,2			21	11,0	14	12,5	23	45	45				114	1,4	2,2	2,5	2,0
				zapadna. Mrtvi pokrivac srednje zastupljen - povoljan proces	3. Cjas				8	4,3	15	17,5	114						114	2,7	20,2		
				humifikacije. Retka prizemna vegetacija. Gusto žbunje. Slaba								22,5		23					23	0,9		6,8	
				zakorovljenost. tip šume kitnjaka i cera (Quercetum petraea-cerris								27,5	69	46					115	6,8	30,7	21,3	
				pauperum) na kiselim smedim i lesiviranim kiselim smedjim zemljištima..								32,5	23						23	1,9	13,8		
												37,5	23						23	2,5	22,7		
				Izdanacka mešovita šuma cera (izdanacka šuma cera i kitnjaka) -								57,5	23						23	5,9	54,6		
				jednodobna (u optimalnoj fazi). Ocuvana sastojina. Mešovita sastojina								UKUP.	275	114	251				640	23,1	144,3	30,7	6,2
				(smeša stablimicna) gustog sklopa (0.8 - 0.9). u celini zdravstveno																			
				stanje sastojine je osrednje. po kvalitetu malo vredna sastojina (ima do																			
				20% tehnickog drveta). Srednja ugroženost od insekata. Srednja ugroženost																			
				od fitopatoloških oboljenja-oboljenja kore. srednje negovana sastojina.																			
				Stabla cera su zakrivljena i sa srednjim padom precnika (srednja																			
				punodrvnost), sa kratkim krošnjama (dužine izmedu 1/4 i1/3 visine																			
				stabala) i uskim krošnjama, od 11-25% oštecenih stabala od insekata i																			
				fitopatoloških obolenja, zdravstveno stanje stabala ove vrste drveca je																			
				osrednje. Stabla kitnjaka su zakrivljena i sa srednjim padom precnika																			
				(srednja punodrvnost), sa srednje dugim krošnjama (dužine izmedu 1/3 i																			
				1/2 visine stabala) i ekscentricnim krošnjama, od 11-25% oštecenih																			
				stabala od insekata i fitopatoloških obolenja, zdravstveno stanje																			
25	c	59196465	0,39	stabala ove vrste drveca je osrednje.																			
				Šuma - nalazi se na strani i na vrlo strmom terenu(nagiba od 16° do	1. SrLip	0,6		82	14	12,5	7	7,5	266			77	31		374	1,6	7,8		
				20°) - nagib ujednacen. Nadmorska visina 365 do 415m. Ekspozicija 1	2. Kit	0,2			25	17,5	10	12,5	109			30	31		170	2,1	8,9		
				zapadna. Mrtvi pokrivac srednje zastupljen - povoljan proces	3. Cer	0,1			33	19,4	9	17,5	63	30		15			108	2,6	12,4	3,9	
				humifikacije. Retka prizemna vegetacija. Retko žbunje. Slaba	4. Cjas				10	9,8	10	22,5	31	30					61	2,4	9,8	11,1	
				zakorovljenost. tip šume kitnjaka (Quercetum montanum serpentinicum) na	5. Brk				10	9,8	10	27,5	32						32	1,9	19,5		

ОПИС СТАНИШТА И САСТОЈИНА

Ozn.mesta		gazdi-	površ-	OPIS	Osnovni taksacioni elementi						visi	deb.	Broj stabala po hektaru							G	Zapremina po		
ode-	od-	nska	ina		vrsta	sme	obr	sta-	sred.stablo		nski			Vrsta drveta						po		Vrsta drv	
ljenje	sek	klasa	ha		drveća	sa	ast	rost	Ds	Hs	step.	st.	1	2	3	4	5	6	svg.	ha	1	2	3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
				lesiviranom smedem zemljištu na serpentinitu..								32,5	16	16	30				62	5,2	11,0	11,4	27,0
												37,5		16					16	1,7		19,7	
				Izdanacka mešovita šuma lipa - jednodobna (u optimalnoj fazi). Ocuvana								42,5	32						32	4,5	46,8		
				sastojina. Mešovita sastojina (smeša stablimicna) vrlo gustog sklopa								UKUP.	547	92	30	122	62		854	22,0	116,1	46,1	27,0
				(1.0). u celini zdravstveno stanje sastojine je osrednje. po kvalitetu																			
				malo vredna sastojina (ima do 20% tehnickog drveta). Srednja ugroženost																			
				od insekata. Srednja ugroženost od fitopatoloških oboljenja-oboljenja																			
				kore. srednje negovana sastojina. Stabla srebrna lipa su zakrivljena i																			
				sa srednjim padom precnika (srednja punodrvnost), sa srednje dugim																			
				krošnjama (dužine izmedu 1/3 i 1/2 visine stabala) i ekscentricnim																			
				krošnjama, zdravstveno stanje stabala ove vrste drveca je dobro. Stabla																			
				kitnjaka su zakrivljena i sa srednjim padom precnika (srednja																			
				punodrvnost), sa srednje dugim krošnjama (dužine izmedu 1/3 i 1/2 visine																			
				stabala) i ekscentricnim krošnjama, do 10% oštecenih stabala od insekata																			
				i fitopatoloških obolenja, zdravstveno stanje stabala ove vrste drveca																			
25	d	59288485	1,05	je osrednje.																			

Ozn.mesta		gazdi-	površ-	OPIS	Osnovni taksacioni elementi						visi	deb.	Broj stabala po hektaru							G	Zapremina po		
ode-	od-	nska	ina		vrsta	sme	obr	sta-	sred.stablo		nski			Vrsta drveta						po		Vrsta drv	
ljenje	sek	klasa	ha		drveća	sa	ast	rost	Ds	Hs	step.	st.	1	2	3	4	5	6	svg.	ha	1	2	3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
				Šuma - nalazi se na strani i na vrlo strmom terenu (nagiba od 21° do	1. Kit	0,5		103	28	15,3	13	7,5			94	284	15	15	408	1,8			2,0
				25°) - nagib ujednacen. Nadmorska visina 370 do 440m. Ekspozicija 1	2. Cer	0,2			29	16,0	11	12,5	15		23	69	8	8	123	1,5	0,7		1,8
				zapadna. Mrtvi pokrivac srednje zastupljen - povoljan proces	3. SrLip	0,1			13	11,7	9	17,5	8	8	8	15	8	8	54	1,3	1,3	1,9	1,3
				humifikacije. Retka prizemna vegetacija. Gusto žbunje. Slaba	4. Cjas	0,1			9	9,1	12	22,5	23	15	24				62	2,5	7,2	5,3	7,0
				zakorovljenost. tip šume kitnjaka i cera (Quercetum petraea-cerris	5. OTL				11	10,6	11	27,5	46	23					69	4,1	21,3	11,4	
				pauperum) na kiselim smedim i lesiviranim kiselim smedjim zemljištima..	6. Brk				11	10,6	12	32,5	38		16				54	4,5	27,8		10,7
												37,5	8	8					16	1,7	6,8	8,4	
				Izdanacka mešovita šuma kitnjaka - jednodobna (u optimalnoj fazi).								42,5	8						8	1,1	9,4		
				Ocuvana sastojina. Mešovita sastojina (smeša stablimicna) gustog sklopa								47,5	8	8					15	2,7	12,4	12,5	
				(0.8 - 0.9). u celini zdravstveno stanje sastojine je osrednje. po								UKUP.	153	62	164	367	31	31	808	21,2	86,9	39,5	22,8
				kvalitetu malo vredna sastojina (ima do 20% tehnickog drveta). Srednja																			
				ugroženost od insekata. Srednja ugroženost od fitopatoloških																			
				oboljenja-oboljenja kore. srednje negovana sastojina. Stabla cera su																			
				zakrivljena i sa srednjim padom precnika (srednja punodrvnost), sa																			
				kratkim krošnjama (dužine izmedu 1/4 i1/3 visine stabala) i preširokim																			
				krošnjama, do 10% oštecenih stabala od insekata i fitopatoloških																			
				obolenja, zdravstveno stanje stabala ove vrste drveca je dobro. Stabla																			
				kitnjaka su zakrivljena i sa srednjim padom precnika (srednja																			
				punodrvnost), sa srednje dugim krošnjama (dužine izmedu 1/3 i 1/2 visine																			
				stabala) i normalno razvijenim krošnjama, do 10% oštecenih stabala od																			
				insekata i fitopatoloških obolenja, zdravstveno stanje stabala ove vrste																			
25	e	59307465	3,73	drveca je dobro.																			
				Šuma - nalazi se na strani i na srednje strmom terenu (nagiba od 6° do	1. SrLip	0,5		93	20	18,1	6	7,5	95		71	12	5	5	188	0,8	2,4		2,9
				10°) - nagib ujednacen. Nadmorska visina 365 do 385m. Ekspozicija 1	2. Kit	0,4			34	22,1	8	12,5	47		17	12			76	0,9	4,4		1,2
				severozapadna. Retka prizemna vegetacija. Nema žbunja. Slaba	3. Gr				11	13,3	8	17,5	83		41				124	3,0	17,2		6,5
				zakorovljenost. tip šuma kitnjaka i graba sa lazarkinjom (Querco -	4. Brk				10	12,2	8	22,5	66	5					71	2,8	23,1	1,8	
				Carpinetum asperulosum) na gajnjaci do lesiviranoj gajnjaci i lesiviranom	5. Bk				8	9,7	11	27,5	47	24					71	4,2	24,8	14,6	
				smedem zemljištu na serpentinitu ..	6. PlBr				8	9,7	8	32,5	34	46					80	6,7	27,9	40,4	
												37,5	17	37					54	5,9	22,0	43,6	
				Izdanacka mešovita šuma lipa (izdanacka šuma lipa i kitnjaka) -								42,5	5	12					17	2,4	8,0	20,4	
				jednodobna (u fazi razgradnje). Ocuvana sastojina. Mešovita sastojina								47,5	5	5					10	1,7	9,3	10,7	
				(smeša stablimicna) gustog sklopa (0.8 - 0.9). u celini zdravstveno								52,5	5						5	1,1	12,5		
				stanje sastojine je osrednje. po kvalitetu malo vredna sastojina (ima do								UKUP.	403	129	129	24	5	5	695	29,6	151,8	131,4	10,7
				20% tehnickog drveta). Srednja ugroženost od insekata. Srednja ugroženost																			
				od fitopatoloških oboljenja-oboljenja kore. srednje negovana sastojina.																			
				Stabla srebrna lipa su zakrivljena i sa srednjim padom precnika (srednja																			
				punodrvnost), sa srednje dugim krošnjama (dužine izmedu 1/3 i 1/2 visine																			
				stabala) i ekscentricnim krošnjama, do 10% oštecenih stabala od vetra,																			
				snega i leda, zdravstveno stanje stabala ove vrste drveca je dobro.																			
				Stabla kitnjaka su zakrivljena i sa srednjim padom precnika (srednja																			
				punodrvnost), sa srednje dugim krošnjama (dužine izmedu 1/3 i 1/2 visine																			
				stabala) i ekscentricnim krošnjama, do 10% oštecenih stabala od insekata																			
				i fitopatoloških obolenja, zdravstveno stanje stabala ove vrste drveca																			
25	f	60288261	2,17	je osrednje.																			
				Šuma - nalazi se na strani i na strmom terenu (nagiba od 11° do 15°) -	1. SrLip	0,6		73	16	12,3	8	7,5	272			16	11	5	304	1,3	6,4		
				nagib ujednacen. Nadmorska visina 350 do 410m. Ekspozicija 1 zapad -	2. Kit	0,4			29	17,6	11	12,5	70		6				76	0,9	4,9		0,6
				jugozapad. Mrtvi pokrivac srednje zastupljen - povoljan proces	3. Bag				13	9,7	16	17,5	80						80	1,9	14,7		
				humifikacije. Srednje gusta prizemna vegetacija. Srednje gusto žbunje.	4. Klen				8	5,7	11	22,5	64	43					107	4,2	20,0	13,1	

ОПИС СТАНИШТА И САСТОЈИНА

Ozn.mesta		gazdi-	površ-	OPIS	Osnovni taksacioni elementi						visi	deb.	Broj stabala po hektaru							G	Zapremina po		
ode-	od-	nska	ina		vrsta	sme	obr	sta-	sred.stablo		nski			Vrsta drveta						po		Vrsta drv	
ljenje	sek	klasa	ha		drveća	sa	ast	rost	Ds	Hs	step.	st.	1	2	3	4	5	6	svg.	ha	1	2	3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
				Slaba zakorovljenost. tip šume kitnjaka (Quercetum montanum typicum) na	5. Tre				8	5,7	14	27,5	49	42					91	5,4	24,6	23,2	
				kiselom smedem i lesiviranom kiselom smedjem zemljištu..	6. OTL				8	5,7	11	32,5	26	48					75	6,2	21,0	37,5	
												37,5	31	16					47	5,2	31,2	16,5	
				Izdanacka mešovita šuma lipa (izdanacka šuma lipa i kitnjaka) -								42,5	21	5					26	3,7	27,9	8,1	
				jednodobna (u optimalnoj fazi). Ocuvana sastojina. Mešovita sastojina								UKUP.	613	155	6	16	11	5	805	29,0	150,6	98,4	0,6
				(smeša stablimicna) vrlo gustog sklopa (1.0). u celini zdravstveno stanje																			
				sastojine je osrednje. po kvalitetu sastojina bez vrednosti (bez ucešca																			
				tehnickog drveta). Srednja ugroženost od insekata. Srednja ugroženost od																			
				fitopatoloških oboljenja-oboljenja kore. srednje negovana sastojina.																			
				Stabla srebrna lipa su zakrivljena i sa srednjim padom precnika (srednja																			
				punodrvnost), sa srednje dugim krošnjama (dužine izmedu 1/3 i 1/2 visine																			
				stabala) i ekscentricnim krošnjama, do 10% oštecenih stabala od vetra,																			
				snega i leda, zdravstveno stanje stabala ove vrste drveca je dobro.																			
				Stabla kitnjaka su zakrivljena i sa srednjim padom precnika (srednja																			
				punodrvnost), sa srednje dugim krošnjama (dužine izmedu 1/3 i 1/2 visine																			
				stabala) i normalno razvijenim krošnjama, do 10% oštecenih stabala od																			
				insekata i fitopatoloških obolenja, zdravstveno stanje stabala ove vrste																			
25	g	60288482	4,64	drveca je osrednje.																			

ОПИС СТАНИШТА И САСТОЈИНА

Ozn.mesta		gazdi-	površ-	OPIS	Osnovni taksacioni elementi						visi	deb.	Broj stabala po hektaru							G	Zapremina po		
ode-	od-	nska	ina		vrsta	sme	obr	sta-	sred.stablo		nski			Vrsta drveta						po		Vrsta drv	
ljenje	sek	klasa	ha		drveća	sa	ast	rost	Ds	Hs	step.	st.	1	2	3	4	5	6	svg.	ha	1	2	3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
				Šuma - nalazi se na platou i na srednje strmom terenu (nagiba od 6° do	1. SrLip	0,4		16	9	9,2	11	7,5	1280	187	138	391	33	32	2060	9,1	22,4	5,3	2,0
				10°) - nagib ujednacen. Nadmorska visina 320 do 385m. . Mrtvi pokrivac	2. Bag	0,3			12	15,0	12	12,5	33	143	97	64	32		369	4,5	2,5	15,2	6,2
				srednje zastupljen - povoljan proces humifikacije. Retka prizemna	3. Tre	0,2			12	11,6	16	17,5		66	21				87	2,1		14,0	3,2
				vegetacija. Gusto žbunje. Slaba zakorovljenost. tip šume kitnjaka	4. Kit	0,1			8	8,8	12	22,5	22	11	33		10		76	3,0	4,8	3,9	9,6
				(Quercetum montanum typicum) na kiselom smedem i lesiviranom kiselom	5. OTL				12	11,2	12	32,5		11	11				22	1,8		10,6	7,6
				smedjem zemljištu..	6. Klen				8	8,3	12	47,5	11						11	1,9	18,7		
												57,5	11						11	2,9	25,0		
				Izdanacka mešovita šuma lipa - jednodobna (u fazi izgradnje). Ocuvana								UKUP.	1356	417	299	455	75	32	2634	25,3	73,5	49,0	28,6
				sastojina. Mešovita sastojina (smeša i grupimicna i stablimicna) vrlo																			
				gustog sklopa (1.0). u celini zdravstveno stanje sastojine je osrednje.																			
				po kvalitetu sastojina bez vrednosti (bez ucešca tehnickog drveta).																			
				Srednja ugroženost od insekata. Srednja ugroženost od fitopatoloških																			
				oboljenja-oboljenja kore. nenegovana sastojina. Stabla srebrna lipa su																			
				zakrivljena i sa srednjim padom precnika (srednja punodrvnost), sa																			
				srednje dugim krošnjama (dužine izmedu 1/3 i 1/2 visine stabala) i																			
				ekscentricnim krošnjama, , zdravstveno stanje stabala ove vrste drveca																			
				je dobro. Stabla kitnjaka su prava i sa srednjim padom precnika (srednja																			
				punodrvnost), sa srednje dugim krošnjama (dužine izmedu 1/3 i 1/2 visine																			
				stabala) i normalno razvijenim krošnjama, do 10% oštecenih stabala od																			
				insekata i fitopatoloških obolenja, zdravstveno stanje stabala ove vrste																			
				drveca je dobro. Stabla bagrema su prava i sa srednjim padom precnika																			
				(srednja punodrvnost), sa srednje dugim krošnjama (dužine izmedu 1/3 i																			
				1/2 visine stabala) i normalno razvijenim krošnjama, do 10% oštecenih																			
				stabala od insekata i fitopatoloških obolenja, zdravstveno stanje																			
25	h	60288482	5,61	stabala ove vrste drveca je dobro.																			
				Jalovište.																			
25	1	60	0,04																				
				Livada.																			
25	2	60	1,01																				
				Livada.																			
25	3	60	0,08																				
				Put.																			
25	4	60	0,06																				
				Šuma - nalazi se na strani i na vrlo strmom terenu(nagiba od 16° do	1. Kit	0,5		91	36	23,2	8	7,5		6	9	3	32	77	128	0,6		0,2	0,3
				20°) - nagib konveksan (ispupcen). Nadmorska visina 400 do 450m.	2. Bk	0,3			38	23,7	10	12,5	3	3	11			19	37	0,5	0,2	0,2	0,7
				Ekspozicija 1 jugoistocna. Mrtvi pokrivac slabo zastupljen - povoljan	3. SrLip	0,1			29	20,6	5	17,5		3		6			10	0,2		0,5	
				proces humifikacije. Retka prizemna vegetacija. Srednje gusto žbunje.	4. Gr	0,1			27	20,0	7	22,5		6	7	11			24	1,0		2,8	2,7
				Slaba zakorovljenost. tip šume bukve i kitnjaka (Querco-Fagetum	5. OTL				11	9,6	8	27,5	16			8			24	1,4	8,3		
				caricetosum silvaticae) na beskarbonatnom deluvijumu..	6. PlBr				8	7,1	8	32,5	56	8		6			70	5,8	51,4	6,3	
												37,5	42	6		10			58	6,4	54,7	9,0	

ОПИС СТАНИШТА И САСТОЈИНА

Ozn.mesta		gazdi-	površ-	OPIS	Osnovni taksacioni elementi						visi	deb.	Broj stabala po hektaru							G	Zapremina po		
ode-	od-	nska	ina		vrsta	sme	obr	sta-	sred.stablo		nski			Vrsta drveta						po		Vrsta drv	
ljenje	sek	klasa	ha		drveća	sa	ast	rost	Ds	Hs	step.	st.	1	2	3	4	5	6	svg.	ha	1	2	3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
				Izdanacka mešovita šuma kitnjaka (izdanacka šuma kitnjaka i bukve) -							42,5	37	8	6	3			54	7,7	62,5	14,4	9,7
				jednodobna (u fazi razgradnje). Ocuvana sastojina. Mešovita sastojina							47,5	3	6	6		3		19	3,4	7,9	15,9	12,7
				(smeša stablimicna) potpunog sklopa (0.7). u celini zdravstveno stanje							52,5		16	9				25	5,4		46,0	22,3
				sastojine je osrednje. po kvalitetu malo vredna sastojina (ima do 20%							57,5	3	3					6	1,6	11,8	11,5	
				tehnickog drveta). Srednja ugroženost od insekata. Srednja ugroženost od							62,5		3					3	1,0		12,9	
				fitopatoloških oboljenja-oboljenja kore. srednje negovana sastojina.							UKUP.	160	70	49	48	35	96	458	34,9	196,8	119,6	48,5
				Stabla srebrna lipa su zakrivljena i sa srednjim padom precnika (srednja																		
				punodrvnost), sa srednje dugim krošnjama (dužine izmedu 1/3 i 1/2 visine																		
				stabala) i ekscentricnim krošnjama, do 10% oštecenih stabala od vetra,																		
				snega i leda, zdravstveno stanje stabala ove vrste drveca je dobro.																		
				Stabla kitnjaka su zakrivljena i sa srednjim padom precnika (srednja																		
				punodrvnost), sa srednje dugim krošnjama (dužine izmedu 1/3 i 1/2 visine																		
				stabala) i ekscentricnim krošnjama, do 10% oštecenih stabala od insekata,																		
				do 10% oštecenih stabala od fitopatoloških obolenja, suvih i suhovrhih																		
				stabala ima do 10%, zdravstveno stanje stabala ove vrste drveca je																		
				osrednje. Stabla bukve su zakrivljena i sa srednjim padom precnika																		
				(srednja punodrvnost), sa srednje dugim krošnjama (dužine izmedu 1/3 i																		
				1/2 visine stabala) i normalno razvijenim krošnjama, do 10% oštecenih																		
				stabala od vetra, snega i leda, zdravstveno stanje stabala ove vrste																		
26	a	59307603	2,23	drveca je dobro.																		

Ozn.mesta		gazdi-	površ-	OPIS	Osnovni taksacioni elementi						visi	deb.	Broj stabala po hektaru							G	Zapremina po		
ode-	od-	nska	ina		vrsta	sme	obr	sta-	sred.stablo		nski			Vrsta drveta						po		Vrsta drv	
ljenje	sek	klasa	ha		drveća	sa	ast	rost	Ds	Hs	step.	st.	1	2	3	4	5	6	svg.	ha	1	2	3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
				Šuma - nalazi se na strani i na vrlo strmom terenu(nagiba od 16° do	1. Kit	0,6		82	26	17,3	10	7,5	10		197	200	47	11	464	2,1	0,3		5,1
				20°) - nagib valovit. Nadmorska visina 350 do 450m. Ekspozicija 1	2. Cer	0,2			31	19,5	8	12,5	5		75	34	5	16	134	1,6	0,3		6,1
				jugoistocna. Mrtvi pokrivac slabo zastupljen - povoljan proces	3. SrLip	0,1			11	10,3	7	17,5	45	5		10	5		65	1,6	8,3	1,5	
				humifikacije. Srednje gusta prizemna vegetacija. Srednje gusto žbunje.	4. Cjas				9	8,3	9	22,5	51	10					61	2,4	18,5	5,0	
				Slaba zakorovljenost. tip šume kitnjaka i cera (Quercetum petraea-cerris	5. OTL				11	10,4	9	27,5	68	10	11				88	5,2	38,9	6,7	5,7
				pauperum) na kiselim smedim i lesiviranim kiselim smedjim zemljištima..	6. Brk				10	10,0	9	32,5	84	5	10		6		105	8,7	65,3	5,3	9,0
												37,5	5	16	5				26	2,9	5,3	21,1	5,0
				Izdanacka mešovita šuma kitnjaka (izdanacka šuma kitnjaka i cera) -								42,5		6					6	0,8		8,3	
				jednodobna (u optimalnoj fazi). Razredjena sastojina. Mešovita sastojina								UKUP.	268	52	297	244	62	26	950	25,3	136,8	47,9	30,9
				(smeša stablimicna) nepotpunog sklopa (0.5-0.6). u celini zdravstveno																			
				stanje sastojine je osrednje. po kvalitetu malo vredna sastojina (ima do																			
				20% tehnickog drveta). Srednja ugroženost od insekata. Jaka ugroženost od																			
				coveka. srednje negovana sastojina. Stabla cera su zakrivljena i sa																			
				srednjim padom precnika (srednja punodrvnost), sa dugim krošnjama (dužine																			
				izmedu 1/2 i 2/3 visine stabala) i ekscentricnim krošnjama, od 11-25%																			
				oštecenih stabala od insekata, od 11-25% oštecenih stabala od																			
				fitopatoloških obolenja, suvih i suhovrhih stabala ima do 10%,																			
				zdravstveno stanje stabala ove vrste drveca je osrednje. Stabla kitnjaka																			
				su zakrivljena i sa srednjim padom precnika (srednja punodrvnost), sa																			
				dugim krošnjama (dužine izmedu 1/2 i 2/3 visine stabala) i ekscentricnim																			
				krošnjama, od 11-25% oštecenih stabala od insekata, od 11-25% oštecenih																			
				stabala od fitopatoloških obolenja, suvih i suhovrhih stabala ima do 10%,																			
26	b	59307465	5,89	zdravstveno stanje stabala ove vrste drveca je osrednje.																			
				Šuma - nalazi se na strani i na vrlo strmom terenu(nagiba od 16° do	1. CB	0,4		82	38	18,7	14	7,5		61	588		231	77	956	4,2		1,3	11,9
				20°) - nagib konveksan (ispupcen). Nadmorska visina 400 do 445m.	2. OTL	0,2			15	12,0	13	12,5		15	81		99		195	2,4		0,7	5,6
				Ekspozicija 1 istocna. Mrtvi pokrivac slabo zastupljen - povoljan proces	3. Cjas	0,1			8	8,4	12	22,5				31			31	1,2			
				humifikacije. Srednje gusta prizemna vegetacija. Gusto žbunje. Srednja	4. Kit	0,1			24	17,3	11	27,5				15			15	0,9			
				zakorovljenost. tip šume kitnjaka i cera (Quercetum petraea-cerris	5. Klen	0,1			9	8,5	11	37,5	48						48	5,3	54,7		
				pauperum) na kiselim smedim i lesiviranim kiselim smedjim zemljištima..	6. SrLip				8	7,0	9	47,5		15					15	2,7		30,1	
												UKUP.	48	91	669	46	329	77	1260	16,8	54,7	32,1	17,5
				Izdanacka mešovita šuma lipa - jednodobna (u fazi izgradnje). Ocuvana																			
				sastojina. Mešovita sastojina (smeša stablimicna) potpunog sklopa (0.7).																			
				u celini zdravstveno stanje sastojine je dobro. po kvalitetu sastojina																			
				bez vrednosti (bez ucešca tehnickog drveta). Srednja ugroženost od																			
				coveka. Srednja ugroženost od insekata. nenegovana sastojina. 0. Stabla																			
				srebrna lipa su kriva i sa srednjim padom precnika (srednja punodrvnost),																			
				sa srednje dugim krošnjama (dužine izmedu 1/3 i 1/2 visine stabala) i																			
				ekscentricnim krošnjama, zdravstveno stanje stabala ove vrste drveca je																			
				dobro. Stabla kitnjaka su zakrivljena i sa srednjim padom precnika																			
				(srednja punodrvnost), sa dugim krošnjama (dužine izmedu 1/2 i 2/3 visine																			
				stabala) i ekscentricnim krošnjama, od 11-25% oštecenih stabala od																			
				insekata, od 11-25% oštecenih stabala od fitopatoloških obolenja, suvih i																			
				suhovrhih stabala ima do 10%, zdravstveno stanje stabala ove vrste																			
26	c	59288465	1,45	drveca je osrednje.																			
				Šuma - nalazi se na ravnom terenu. i na blago nagnutom terenu (nagiba do	1. Bag	0,8		26	13	12,1	15	7,5	194	485					679	3,0	3,5	9,6	
				5°) - nagib ujednacen. Nadmorska visina 345 do 360m. Ekspozicija 1 bez	2. SrLip	0,2			8	7,8	9	12,5	485	97					582	7,1	46,0	7,5	
				jasno izražene ekspozicije. Mrtvi pokrivac slabo zastupljen - nepovoljan								17,5	97						97	2,3	14,2		
				proces humifikacije. Retka prizemna vegetacija. Srednje gusto žbunje.								22,5	97						97	3,9	27,9		

ОПИС СТАНИШТА И САСТОЈИНА

Ozn.mesta		gazdi-	površ-	OPIS	Osnovni taksacioni elementi						visi	deb.	Broj stabala po hektaru							G	Zapremina po		
ode-	od-	nska	ina		vrsta	sme	obr	sta-	sred.stablo		nski			Vrsta drveta						po		Vrsta drv	
ljenje	sek	klasa	ha		drveća	sa	ast	rost	Ds	Hs	step.	st.	1	2	3	4	5	6	svg.	ha	1	2	3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
				Srednja zakorovljenost. tip šume kitnjaka (Quercetum montanum								UKUP.	873	582					1455	16,3	91,6	17,1	
				cariecetosum pilosae) na gajnjaci do lesiviranoj gajnjaci..																			
				Izdanacka mešovita šuma bagrema (izdanacka mešovita šuma bagrema) -																			
				jednodobna (u fazi izgradnje). Ocuvana sastojina. Mešovita sastojina																			
				(smeša stablimicna) gustog sklopa (0.8 - 0.9). u celini zdravstveno																			
				stanje sastojine je dobro. po kvalitetu sastojina bez vrednosti (bez																			
				ucešca tehnickog drveta). Srednja ugroženost od insekata. Srednja																			
				ugroženost od drugih štetnih uticaja. srednje negovana sastojina. Stabla																			
				bagrema su zakrivljena i sa srednjim padom precnika (srednja																			
				punodrvnost), sa dugim krošnjama (dužine izmedu 1/2 i 2/3 visine stabala)																			
				i normalno razvijenim krošnjama, do 10% oštecenih stabala od insekata,																			
26	d	59326484	0,20	zdravstveno stanje stabala ove vrste drveca je dobro.																			

Ozn.mesta		gazdi-	površ-	OPIS	Osnovni taksacioni elementi						visi	deb.	Broj stabala po hektaru							G	Zapremina po		
ode-	od-	nska	ina		vrsta	sme	obr	sta-	sred.stablo		nski			Vrsta drveta						po		Vrsta drv	
ljenje	sek	klasa	ha		drveća	sa	ast	rost	Ds	Hs	step.	st.	1	2	3	4	5	6	svg.	ha	1	2	3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
				Šuma - nalazi se na strani i na strmom terenu (nagiba od 11° do 15°) -	1. SrLip	0,3		82	21	17,3	7	7,5	51		33	28	11	43	167	0,7	1,1		0,6
				nagib valovit. Nadmorska visina 320 do 375m. Ekspozicija 1 jugoistocna.	2. Kit	0,3			29	20,8	8	12,5	37		6	15	27	17	102	1,3	3,2		0,5
				Mrtvi pokrivac slabo zastupljen - povoljan proces humifikacije. Retka	3. Bk	0,3			22	17,0	11	17,5	28	5	19	11	22	10	94	2,3	5,0	1,0	3,1
				prizemna vegetacija. Srednje gusto žbunje. Nema zakorovljenosti. tip šume	4. OTL	0,1			15	13,3	8	22,5	13	17	35	7			72	2,8	4,6	7,0	12,6
				bukve i kitnjaka (Querco-Fagetum typicum) na kiselom smedem i lesiviranom	5. Bag				13	12,4	15	27,5	20	56	7				83	4,9	11,8	32,9	4,2
				kiselom smedjem zemljištu..	6. Gr				10	9,7	8	32,5	32	27	17				76	6,3	26,6	21,7	13,0
												37,5	7	18	12				37	4,1	8,4	21,5	17,5
				Izdanacka mešovita šuma lipa - jednodobna (u optimalnoj fazi). Ocuvana								42,5	4	4		5			14	1,9	6,6	7,1	
				sastojina. Mešovita sastojina (smeša stablimicna) gustog sklopa (0.8 -								47,5	5		5				10	1,8	9,3		10,9
				0.9). u celini zdravstveno stanje sastojine je dobro. po kvalitetu								52,5	4		2				6	1,4	9,8		6,0
				sastojina bez vrednosti (bez ucešca tehnickog drveta). Srednja ugroženost								57,5	2		2				4	1,1	6,5		6,5
				od insekata. Mala ugroženost od drugih štetnih uticaja. srednje negovana								UKUP.	203	127	139	67	59	71	666	28,6	93,0	91,2	74,8
				sastojina. Stabla srebrna lipa su zakrivljena i sa srednjim padom																			
				precnika (srednja punodrvnost), sa srednje dugim krošnjama (dužine izmedu																			
				1/3 i 1/2 visine stabala) i ekscentricnim krošnjama, do 10% oštecenih																			
				stabala od vetra, snega i leda, zdravstveno stanje stabala ove vrste																			
				drveca je dobro. Stabla kitnjaka su zakrivljena i sa srednjim padom																			
				precnika (srednja punodrvnost), sa srednje dugim krošnjama (dužine izmedu																			
				1/3 i 1/2 visine stabala) i normalno razvijenim krošnjama, do 10%																			
				oštecenih stabala od vetra, snega i leda, do 10% oštecenih stabala od																			
				insekata i fitopatoloških obolenja, suvih i suhovrhih stabala ima do 10%,																			
26	e	59288602	4,77	zdravstveno stanje stabala ove vrste drveca je osrednje.																			
				Šuma - nalazi se na strani i na strmom terenu (nagiba od 11° do 15°) -	1. Kit	0,6		102	39	22,3	9	7,5		222	7	55	17	16	317	1,4		5,7	0,1
				nagib konveksan (ispupcen). Nadmorska visina 335 do 360m. Ekspozicija 1	2. SrLip	0,3			14	11,0	7	12,5		96	7			7	109	1,3		7,9	0,8
				jugoistocna. Mrtvi pokrivac slabo zastupljen - nepovoljan proces	3. Klen	0,1			22	15,7	9	17,5		29		7			36	0,9		5,8	
				humifikacije. Srednje gusta prizemna vegetacija. Srednje gusto žbunje.	4. Tre				9	6,7	12	22,5		42	7		7		56	2,2		14,7	3,0
				Slaba zakorovljenost. tip šume kitnjaka (Quercetum montanum cariecetosum	5. OTL				12	9,5	9	27,5	3	23	14				40	2,4	1,3	12,0	7,8
				pilosae) na gajnjaci do lesiviranoj gajnjaci..	6. Cjas				9	7,0	9	32,5	46		7				53	4,4	39,7		5,3
												37,5	30	7					37	4,1	36,3	6,9	
				Izdanacka mešovita šuma kitnjaka (izdanacka šuma kitnjaka i lipe) -								42,5	22	14					37	5,2	39,2	22,1	
				jednodobna (u fazi razgradnje). Ocuvana sastojina. Mešovita sastojina								47,5	27						27	4,8	57,8		
				(smeša stablimicna) gustog sklopa (0.8 - 0.9). u celini zdravstveno								52,5	3						3	0,6	7,5		
				stanje sastojine je osrednje. po kvalitetu sastojina bez vrednosti (bez								57,5		7					7	1,7		19,3	
				ucešca tehnickog drveta). Srednja ugroženost od insekata. Srednja								UKUP.	131	441	41	62	24	22	722	29,0	181,9	94,3	17,1
				ugroženost od fitopatoloških oboljenja-oboljenja kore. srednje negovana																			
				sastojina. Stabla srebrna lipa su zakrivljena i sa srednjim padom																			
				precnika (srednja punodrvnost), sa srednje dugim krošnjama (dužine izmedu																			
				1/3 i 1/2 visine stabala) i ekscentricnim krošnjama, zdravstveno stanje																			
				stabala ove vrste drveca je dobro. Stabla kitnjaka su zakrivljena i sa																			
				srednjim padom precnika (srednja punodrvnost), sa srednje dugim krošnjama																			
				(dužine izmedu 1/3 i 1/2 visine stabala) i ekscentricnim krošnjama, od																			
				11-25% oštecenih stabala od insekata, od 11-25% oštecenih stabala od																			
				fitopatoloških obolenja, suvih i suhovrhih stabala ima do 10%,																			
26	f	60307484	3,16	zdravstveno stanje stabala ove vrste drveca je osrednje.																			
				Šuma - nalazi se na platou i na blago nagnutom terenu (nagiba do 5°) -	1. SrLip	0,8		102	19	16,2	7	7,5	142				17		159	0,7	3,7		
				nagib ujednacen. Nadmorska visina 310 do 335m. Ekspozicija 1 bez jasno	2. Kit	0,2			53	23,3	10	12,5	70				17	17	103	1,3	7,1		
				izražene ekspozicije. Mrtvi pokrivac slabo zastupljen - povoljan proces	3. Tre				28	19,1	12	17,5	37			17			53	1,3	6,6		
				humifikacije. Srednje gusta prizemna vegetacija. Srednje gusto žbunje.	4. OTL				18	15,4	10	22,5	76						76	3,0	24,7		

ОПИС СТАНИШТА И САСТОЈИНА

Ozn.mesta		gazdi-	površ-	OPIS	Osnovni taksacioni elementi						visi	deb.	Broj stabala po hektaru							G	Zapremina po		
ode-	od-	nska	ina		vrsta	sme	obr	sta-	sred.stablo		nski			Vrsta drveta						po		Vrsta drv	
ljenje	sek	klasa	ha		drveća	sa	ast	rost	Ds	Hs	step.	st.	1	2	3	4	5	6	svg.	ha	1	2	3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
				Srednja zakorovljenost. tip šume kitnjaka (Quercetum montanum	5. Klen				10	10,6	9	27,5	50		7				56	3,3	29,8		4,5
				cariecetosum pilosae) na gajnjaci do lesiviranoj gajnjaci..	6. Bag				13	12,5	16	32,5	33						33	2,8	28,9		
												37,5	7						7	0,7	7,4		
				Izdanacka mešovita šuma lipa (izdanacka šuma lipa i kitnjaka) -								42,5	23						23	3,3	33,3		
				jednodobna (u optimalnoj fazi). Ocuvana sastojina. Mešovita sastojina								52,5		13					13	2,9		35,8	
				(smeša stablimicna) gustog sklopa (0.8 - 0.9). u celini zdravstveno								57,5	7						7	1,7	20,7		
				stanje sastojine je dobro. po kvalitetu sastojina bez vrednosti (bez								UKUP.	444	13	7	17	33	17	530	21,0	162,1	35,8	4,5
				ucešca tehnickog drveta). Srednja ugroženost od insekata. Srednja																			
				ugroženost od fitopatoloških oboljenja-oboljenja kore. dobro negovana																			
				sastojina. Stabla srebrna lipa su zakrivljena i sa srednjim padom																			
				precnika (srednja punodrvnost), sa srednje dugim krošnjama (dužine izmedu																			
				1/3 i 1/2 visine stabala) i normalno razvijenim krošnjama, do 10%																			
				oštecenih stabala od insekata i fitopatoloških obolenja, zdravstveno																			
26	g	60288484	0,71	stanje stabala ove vrste drveca je dobro.																			
				Livada.																			
26	1	60	0,07																				
				Put.																			
26	2	60	0,30																				

Ozn.mesta		gazdi-	površ-	OPIS	Osnovni taksacioni elementi						visi	deb.	Broj stabala po hektaru							G	Zapremina po		
					vrsta	sme	obr	sta-	sred.stablo		nski		Vrsta drveta							po	Vrsta drv		
ode-	od-	nska	ina		drveća	sa	ast	rost	Ds	Hs	step.	st.	1	2	3	4	5	6	svg.	ha	1	2	3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
				Šuma - nalazi se na strani i na vrlo strmom terenu(nagiba od 16° do	1. Kit	0,4		82	23	14,0	13	7,5		15	211	164	46		437	1,9		0,8	4,8
				20°) - nagib ujednacen. Nadmorska visina 400 do 435m. Ekspozicija 1	2. Cer	0,4			32	16,5	12	12,5	31		44	14			89	1,1	2,4		2,5
				zapad - jugozapad. Mrtvi pokrivac obilno zastupljen (tanak sloj) -	3. Cjas	0,2			12	9,5	13	17,5	61		45				107	2,6	10,0		6,3
				povoljan proces humifikacije. Srednje gusta prizemna vegetacija. Srednje	4. Bag				8	6,5	18	22,5	123		46				169	6,7	34,8		11,7
				gusto žbunje. Nema zakorovljenosti. tip šume razlicitih hrastova sa crnim	5. Klen				8	6,2	13	27,5	61		15				77	4,6	26,2		7,0
				jasenom (Orno-Polyquercetum) na slabo razvijenim zemljištima na								32,5	31	31					61	5,1	20,3	27,2	
				krecnjacima i bazicnim silikatnim stenama..								37,5		14					14	1,6		13,6	
												42,5		30					30	4,2		38,6	
				Izdanacka mešovita šuma kitnjaka (izdanacka šuma kitnjaka i cera) -								UKUP.	307	90	362	179	46		984	27,7	93,6	80,2	32,3
				jednodobna (u optimalnoj fazi). Ocuvana sastojina. Mešovita sastojina																			
				(smeša stablimicna) vrlo gustog sklopa (1.0). u celini zdravstveno stanje																			
				sastojine je osrednje. po kvalitetu malo vredna sastojina (ima do 20%																			
				tehnickog drveta). Srednja ugroženost od insekata. Srednja ugroženost od																			
				fitopatoloških oboljenja-oboljenja lista. srednje negovana sastojina.																			
				Stabla cera su zakrivljena i sa srednjim padom precnika (srednja																			
				punodrvnost), sa dugim krošnjama (dužine izmedu 1/2 i 2/3 visine stabala)																			
				i ekscentricnim krošnjama, od 11-25% oštecenih stabala od insekata i																			
				fitopatoloških obolenja, suvih i sihovrhih stabala ima od 11-25%,																			
				zdravstveno stanje stabala ove vrste drveca je osrednje. Stabla kitnjaka																			
				su zakrivljena i sa srednjim padom precnika (srednja punodrvnost), sa																			
				dugim krošnjama (dužine izmedu 1/2 i 2/3 visine stabala) i ekscentricnim																			
				krošnjama, od 11-25% oštecenih stabala od insekata i fitopatoloških																			
				obolenja, suvih i sihovrhih stabala ima od 11-25%, zdravstveno stanje																			
27	a	59307371	0,87	stabala ove vrste drveca je osrednje.																			
				Šuma - nalazi se na strani i na vrlo strmom terenu (nagiba od 21° do	1. Cer	0,6		89	31	18,1	11	7,5		296	283		80		658	2,9		5,4	5,0
				25°) - nagib ujednacen. Nadmorska visina 405 do 425m. Ekspozicija 1	2. Bag	0,2			10	6,2	17	12,5		151	91	22	11		276	3,4		11,3	5,3
				južna. Mrtvi pokrivac srednje zastupljen - povoljan proces humifikacije.	3. Cjas	0,1			9	5,5	13	17,5		22	24				46	1,1		3,1	2,9
				Gusta prizemna vegetacija. Srednje gusto žbunje. Nema zakorovljenosti.	4. Kit	0,1			20	12,7	11	22,5	12	11					23	0,9	5,4	3,9	
				tip šume kitnjaka i cera (Quercetum petraea-cerris pauperum) na kiselim	5. SrLip				8	4,8	9	27,5	11						11	0,7	7,5		
				smedim i lesiviranim kiselim smedjim zemljištima..								32,5	55			12			67	5,6	46,5		
												37,5	12						12	1,3	14,8		
				Izdanacka mešovita šuma cera - jednodobna (u fazi razgradnje). Ocuvana								UKUP.	90	480	398	34	91		1093	15,8	74,2	23,6	13,3
				sastojina. Mešovita sastojina (smeša stablimicna) vrlo gustog sklopa																			
				(1.0). u celini zdravstveno stanje sastojine je osrednje. po kvalitetu																			
				malo vredna sastojina (ima do 20% tehnickog drveta). Srednja ugroženost																			
				od insekata. Srednja ugroženost od fitopatoloških oboljenja-oboljenja																			
				lista. srednje negovana sastojina. Stabla cera su zakrivljena i sa																			
				srednjim padom precnika (srednja punodrvnost), sa dugim krošnjama (dužine																			
				izmedu 1/2 i 2/3 visine stabala) i ekscentricnim krošnjama, od 11-25%																			
				oštecenih stabala od insekata i fitopatoloških obolenja, suvih i																			
				sihovrhih stabala ima od 11-25%, zdravstveno stanje stabala ove vrste																			
				drveca je osrednje. Stabla kitnjaka su zakrivljena i sa velikim padom																			
				precnika (mala punodrvnost), sa srednje dugim krošnjama (dužine izmedu																			
				1/3 i 1/2 visine stabala) i normalno razvijenim krošnjama, od 11-25%																			
				oštecenih stabala od insekata i fitopatoloških obolenja, suvih i																			
				sihovrhih stabala ima od 11-25%, zdravstveno stanje stabala ove vrste																			
27	b	59196465	1,80	drveca je osrednje.																			
				Šuma - nalazi se na strani i na strmom terenu (nagiba od 11° do 15°) -	1. SrLip	0,4		82	16	12,7	7	7,5	225		91	27	91	58	492	2,2	5,4		2,2

ОПИС СТАНИШТА И САСТОЈИНА

Ozn.mesta		gazdi-	površ-	OPIS	Osnovni taksacioni elementi						visi	deb.	Broj stabala po hektaru							G	Zapremina po		
ode-	od-	nska	ina		vrsta	sme	obr	sta-	sred.stablo		nski			Vrsta drveta						po		Vrsta drv	
ljenje	sek	klasa	ha		drveća	sa	ast	rost	Ds	Hs	step.	st.	1	2	3	4	5	6	svg.	ha	1	2	3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
				nagib ujednacen. Nadmorska visina 375 do 400m. Ekspozicija l južna.	2. Kit	0,3			28	19,2	9	12,5	91	10	8	27	37	5	178	2,2	7,3	0,8	0,6
				Mrtvi pokrivac srednje zastupljen - povoljan proces humifikacije. Srednje	3. OTL	0,2			18	13,8	9	17,5	22	10	2	27	5		67	1,6	3,7	1,4	0,3
				gusta prizemna vegetacija. Srednje gusto žbunje. Nema zakorovljenosti.	4. Brk				13	10,0	12	22,5	45	11	11		10		77	3,1	17,2	3,7	3,6
				tip šume kitnjaka i cera (Quercetum petraea-cerris pauperum) na kiselim	5. Cjas				10	7,7	9	27,5	19	43	8			6	75	4,4	10,8	27,6	4,9
				smedim i lesiviranim kiselim smedjim zemljištima..	6. Klen				9	7,1	9	32,5	60	32	5				97	8,0	51,0	25,7	4,3
												37,5	19	21	5				46	5,1	20,9	27,1	7,1
				Izdanacka mešovita šuma lipa (izdanacka šuma lipa i kitnjaka) -								42,5	2		16				18	2,6	2,9		27,7
				jednodobna (u optimalnoj fazi). Ocuvana sastojina. Mešovita sastojina								47,5	5		11				16	2,8	9,4		21,5
				(smeša stablimicna) vrlo gustog sklopa (1.0). u celini zdravstveno stanje								52,5	2						2	0,5	4,7		
				sastojine je osrednje. po kvalitetu malo vredna sastojina (ima do 20%								UKUP.	491	127	157	81	144	69	1068	32,4	133,2	86,3	72,3
				tehnickog drveta). Srednja ugroženost od insekata. Srednja ugroženost od																			
				fitopatoloških oboljenja-oboljenja lista. srednje negovana sastojina.																			
				Stabla srebrna lipa su zakrivljena i sa srednjim padom precnika (srednja																			
				punodrvnost), sa srednje dugim krošnjama (dužine izmedu 1/3 i 1/2 visine																			
				stabala) i ekscentricnim krošnjama, zdravstveno stanje stabala ove vrste																			
				drveca je dobro. Stabla kitnjaka su zakrivljena i sa srednjim padom																			
				precnika (srednja punodrvnost), sa srednje dugim krošnjama (dužine izmedu																			
				1/3 i 1/2 visine stabala) i ekscentricnim krošnjama, do 10% oštecenih																			
				stabala od insekata i fitopatoloških obolenja, suvih i suhovrhih stabala																			
27	c	59288465	4,25	ima do 10%, zdravstveno stanje stabala ove vrste drveca je osrednje.																			

Ozn.mesta		gazdi-	površ-	OPIS	Osnovni taksacioni elementi						visi	deb.	Broj stabala po hektaru							G	Zapremina po		
					vrsta	sme	obr	sta-	sred.stablo		nski			Vrsta drveta						po		Vrsta drv	
ode- ljenje	od- sek	nska klasa	ina ha		drveća	sa	ast	rost	Ds	Hs	step.	st.	1	2	3	4	5	6	svg.	ha	1	2	3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
				Šuma - nalazi se na strani i na vrlo strmom terenu(nagiba od 16° do	1. Bk	0,5		82	24	20,2	9	7,5	38	9					47	0,2	1,3	0,5	
				20°) - nagib ujednacen. Nadmorska visina 365 do 390m. Ekspozicija 1	2. SrLip	0,2			21	18,4	4	12,5	10	28					38	0,5	0,5	2,9	
				istocna. Mrtvi pokrivac slabo zastupljen - povoljan proces humifikacije.	3. Kit	0,2			29	22,3	7	17,5	38	28					66	1,6	6,1	5,8	
				Srednje gusta prizemna vegetacija. Nema žbunja. Nema zakorovljenosti. tip	4. Cer	0,2			63	29,4	6	22,5	19	19	29				67	2,7	6,9	6,9	12,1
				šume bukve i kitnjaka (Querco-Fagetum typicum) na kiselom smedem i								27,5	19	19					38	2,3	12,8	11,5	
				lesiviranom kiselom smedjem zemljištu..								32,5	39	10	10				58	4,8	33,1	8,0	10,6
												37,5	19	10	19				48	5,3	24,0	10,6	25,0
				Izdanacka mešovita šuma bukve (izdanacka šuma bukve i lipe) - jednodobna								42,5	9						9	1,3	15,5		
				(u optimalnoj fazi). Ocuvana sastojina. Mešovita sastojina (smeša								47,5	9						9	1,7	23,5		
				stablimicna) potpunog sklopa (0.7). u celini zdravstveno stanje sastojine								62,5				10			10	2,9			
				je dobro. po kvalitetu malo vredna sastojina (ima do 20% tehnickog								UKUP.	200	124	58	10			390	23,2	123,6	46,1	47,7
				drveta). Srednja ugroženost od insekata. Srednja ugroženost od vetra.																			
				srednje negovana sastojina. Stabla srebrna lipa su zakrivljena i sa																			
				srednjim padom precnika (srednja punodrvnost), sa srednje dugim krošnjama																			
				(dužine izmedu 1/3 i 1/2 visine stabala) i ekscentricnim krošnjama, do																			
				10% oštecenih stabala od vetra, snega i leda, zdravstveno stanje stabala																			
				ove vrste drveca je dobro. Stabla kitnjaka su zakrivljena i sa srednjim																			
				padom precnika (srednja punodrvnost), sa srednje dugim krošnjama (dužine																			
				izmedu 1/3 i 1/2 visine stabala) i ekscentricnim krošnjama, do 10%																			
				oštecenih stabala od vetra, snega i leda, do 10% oštecenih stabala od																			
				insekata i fitopatoloških obolenja, suvih i suhovrhih stabala ima do 10%,																			
				zdravstveno stanje stabala ove vrste drveca je dobro. Stabla bukve su																			
				zakrivljena i sa srednjim padom precnika (srednja punodrvnost), sa																			
				srednje dugim krošnjama (dužine izmedu 1/3 i 1/2 visine stabala) i																			
				preširokim krošnjama, zdravstveno stanje stabala ove vrste drveca je																			
27	d	59361602	0,45	dobro.																			
				Šuma - nalazi se na grebenu i na strmom terenu (nagiba od 11° do 15°) -	1. Kit	0,6		82	32	22,0	8	7,5		165	20	32	7		224	1,0		3,9	0,5
				nagib ujednacen. Nadmorska visina 325 do 390m. Ekspozicija 1 istocna.	2. SrLip	0,4			16	18,3	6	12,5		13					13	0,2		1,2	
				Mrtvi pokrivac srednje zastupljen - povoljan proces humifikacije. Srednje	3. Brk				8	12,3	8	17,5		39					39	0,9		8,3	
				gusta prizemna vegetacija. Srednje gusto žbunje. Nema zakorovljenosti.	4. Tre				8	12,3	11	22,5	33	7					39	1,5	13,1	2,5	
				tip šume kitnjaka (Quercetum montanum typicum) na kiselom smedem i	5. Mle				8	12,3	8	27,5	26	7					33	1,9	15,6	3,0	
				lesiviranom kiselom smedjem zemljištu..								32,5	36	52					88	7,3	31,9	43,1	
												37,5	62	7					68	7,5	80,1	8,5	
				Izdanacka mešovita šuma kitnjaka (izdanacka šuma kitnjaka i lipe) -								42,5		7					7	0,9		10,0	
				jednodobna (u optimalnoj fazi). Ocuvana sastojina. Mešovita sastojina								52,5		7					7	1,4		16,6	
				(smeša stablimicna) gustog sklopa (0.8 - 0.9). u celini zdravstveno								UKUP.	156	301	20	32	7		515	22,6	140,8	97,0	0,5
				stanje sastojine je dobro. po kvalitetu malo vredna sastojina (ima do 20%																			
				tehnickog drveta). Srednja ugroženost . Srednja ugroženost od																			
				fitopatoloških oboljenja-oboljenja lista. srednje negovana sastojina.																			
				Stabla srebrna lipa su zakrivljena i sa srednjim padom precnika (srednja																			
				punodrvnost), sa srednje dugim krošnjama (dužine izmedu 1/3 i 1/2 visine																			
				stabala) i ekscentricnim krošnjama, zdravstveno stanje stabala ove vrste																			
				drveca je dobro. Stabla kitnjaka su zakrivljena i sa srednjim padom																			
				precnika (srednja punodrvnost), sa srednje dugim krošnjama (dužine izmedu																			
				1/3 i 1/2 visine stabala) i ekscentricnim krošnjama, do 10% oštecenih																			
				stabala od insekata i fitopatoloških obolenja, suvih i suhovrhih stabala																			
27	e	59307482	0,92	ima do 10%, zdravstveno stanje stabala ove vrste drveca je dobro.																			
				Šuma - nalazi se na strani i na strmom terenu (nagiba od 11° do 15°) -	1. SrLip	0,3		82	25	16,5	8	7,5	13						13	0,1	0,4		

ОПИС СТАНИШТА И САСТОЈИНА

Ozn.mesta		gazdi-	površ-	OPIS	Osnovni taksacioni elementi						visi	deb.	Broj stabala po hektaru							G	Zapremina po		
ode-	od-	nska	ina		vrsta	sme	obr	sta-	sred.stablo		nski			Vrsta drveta						po		Vrsta drv	
ljenje	sek	klasa	ha		drveća	sa	ast	rost	Ds	Hs	step.	st.	1	2	3	4	5	6	svg.	ha	1	2	3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
				nagib ujednacen. Nadmorska visina 325 do 365m. Ekspozicija 1 istocna.	2. Kit	0,4			30	19,1	10	12,5	25				33		58	0,7	2,1		
				Mrtvi pokrivac srednje zastupljen - povoljan proces humifikacije. Srednje	3. Bk	0,1			63	24,7	13	17,5	42				16		58	1,4	7,7		
				gusta prizemna vegetacija. Retko žbunje. Nema zakorovljenosti. tip šume	4. Cer	0,1			58	24,2	9	22,5	18	23			16		57	2,3	4,8	7,9	
				kitnjaka i graba sa klokocikom (Querco-Carpinetum staphyletosum) na	5. Gr	0,1			19	14,4	10	27,5	23	68			16		108	6,4	12,4	36,1	
				kiselom smedem do lesiviranom kiselom smedjem zemljištu..	6. Tre				38	20,9	13	32,5	11	52					63	5,2	8,3	41,8	
												37,5	23	39				6	67	7,4	22,8	44,8	
				Izdanacka mešovita šuma kitnjaka (izdanacka šuma kitnjaka i lipe) -								42,5	28					28	3,9	40,7		
				jednodobna (u fazi razgradnje). Razredjena sastojina. Mešovita sastojina								57,5				6		6	1,5			
				(smeša stablimicna) nepotpunog sklopa (0.5-0.6). u celini zdravstveno								62,5			6			6	1,7			19,9
				stanje sastojine je dobro. po kvalitetu malo vredna sastojina (ima do 20%								UKUP.	183	181	6	6	82	6	463	30,6	99,2	130,7	19,9
				tehnickog drveta). Srednja ugroženost od insekata. Srednja ugroženost od																			
				fitopatoloških oboljenja-oboljenja lista. pogrešno negovana sastojina.																			
				Stabla srebrna lipa su zakrivljena i sa srednjim padom precnika (srednja																			
				punodrvnost), sa srednje dugim krošnjama (dužine izmedu 1/3 i 1/2 visine																			
				stabala) i ekscentricnim krošnjama, do 10% oštecenih stabala od vetra,																			
				snega i leda, suvih i suhovrhih stabala ima do 10%, zdravstveno stanje																			
				stabala ove vrste drveca je dobro. Stabla kitnjaka su zakrivljena i sa																			
				srednjim padom precnika (srednja punodrvnost), sa srednje dugim krošnjama																			
				(dužine izmedu 1/3 i 1/2 visine stabala) i ekscentricnim krošnjama, do																			
				10% oštecenih stabala od insekata i fitopatoloških obolenja, suvih i																			
				suhovrhih stabala ima do 10%, zdravstveno stanje stabala ove vrste																			
27	f	59307263	1,06	drveca je dobro.																			

Ozn.mesta		gazdi-	površ-	OPIS	Osnovni taksacioni elementi						visi	deb.	Broj stabala po hektaru							G	Zapremina po		
ode-	od-	nska	ina		vrsta	sme	obr	sta-	sred.stablo		nski			Vrsta drveta						po		Vrsta drv	
ljenje	sek	klasa	ha		drveća	sa	ast	rost	Ds	Hs	step.	st.	1	2	3	4	5	6	svg.	ha	1	2	3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
				Šuma - nalazi se na strani i na srednje strmom terenu (nagiba od 6° do	1. SrLip	0,6		82	24	17,1	7	7,5	132		42	49	11	65	299	1,3	3,0		0,9
				10°) - nagib ujednacen. Nadmorska visina 310 do 360m. Ekspozicija 1	2. Kit	0,3			36	21,3	10	12,5	32		8	49	9	11	109	1,3	2,7		0,4
				zapadna. Mrtvi pokrivac srednje zastupljen - povoljan proces	3. OTL	0,1			18	13,5	10	17,5	10	5		11	6	6	37	0,9	2,0	0,9	
				humifikacije. Srednje gusta prizemna vegetacija. Srednje gusto žbunje.	4. Bag				11	9,1	16	22,5	27	5		6	8		46	1,8	8,5	2,0	
				Nema zakorovljenosti. tip šuma kitnjaka i graba sa lazarkinjom (Querco -	5. Gr				16	12,5	9	27,5	24	8			6		37	2,2	12,8	4,0	
				Carpinetum asperulosum) na gajnjaci do lesiviranoj gajnjaci i lesiviranom	6. Klen				9	7,0	9	32,5	18	22					40	3,3	14,0	18,4	
				smedem zemljištu na serpentinitu ..								37,5	27	18					44	4,9	29,5	20,7	
												42,5	16	37					53	7,5	24,2	61,9	
				Izdanacka mešovita šuma lipa (izdanacka šuma lipa i kitnjaka) -								47,5	38	8	2				48	8,4	70,3	15,0	4,6
				jednodobna (u fazi razgradnje). Ocuvana sastojina. Mešovita sastojina								52,5	22		2				24	5,2	50,1		5,3
				(smeša stablimicna) gustog sklopa (0.8 - 0.9). u celini zdravstveno								57,5	5		6				11	2,8	16,3		16,8
				stanje sastojine je dobro. po kvalitetu malo vredna sastojina (ima do 20%								62,5			2				2	0,7			8,5
				tehnickog drveta). Srednja ugroženost od insekata. Srednja ugroženost od								67,5	6						6	2,0	23,6		
				drugih štetnih uticaja. srednje negovana sastojina. Stabla srebrna lipa								UKUP.	356	102	62	114	38	81	754	42,2	257,1	122,9	36,6
				su zakrivljena i sa srednjim padom precnika (srednja punodrvnost), sa																			
				srednje dugim krošnjama (dužine izmedu 1/3 i 1/2 visine stabala) i																			
				ekscentricnim krošnjama, do 10% oštecenih stabala od vetra, snega i leda,																			
				suvih i suhovrhih stabala ima do 10%, zdravstveno stanje stabala ove																			
				vrste drveca je dobro. Stabla kitnjaka su zakrivljena i sa srednjim padom																			
				precnika (srednja punodrvnost), sa srednje dugim krošnjama (dužine izmedu																			
				1/3 i 1/2 visine stabala) i normalno razvijenim krošnjama, do 10%																			
				oštecenih stabala od vetra, snega i leda, do 10% oštecenih stabala od																			
				insekata i fitopatoloških obolenja, suvih i suhovrhih stabala ima do 10%,																			
27	g	59288261	12,43	zdravstveno stanje stabala ove vrste drveca je dobro.																			
				Šuma - nalazi se na strani i na blago nagnutom terenu (nagiba do 5°) -	1. Bag	0,7		82	22	15,2	16	7,5	40	170	41	12	17		279	1,2	1,0	5,0	1,1
				nagib ujednacen. Nadmorska visina 300 do 315m. Ekspozicija 1 istok -	2. SrLip	0,3			15	13,5	8	12,5	42	90	12				143	1,8	4,3	7,4	1,1
				jugoistok. Mrtvi pokrivac srednje zastupljen - povoljan proces	3. Klen				12	10,8	10	17,5	156	111	25	17	8		317	7,6	27,8	21,1	3,8
				humifikacije. Retka prizemna vegetacija. Gusto žbunje. Nema	4. Tre				13	11,4	13	22,5	106	61	8				176	7,0	34,2	19,6	2,5
				zakorovljenosti. tip šuma kitnjaka i graba sa lazarkinjom (Querco -	5. Gr				11	9,6	10	27,5	120	17					136	8,1	66,3	7,8	
				Carpinetum asperulosum) na gajnjaci do lesiviranoj gajnjaci i lesiviranom								32,5	43	25					68	5,6	36,0	19,9	
				smedem zemljištu na serpentinitu ..								37,5	28						28	3,1	31,0		
												57,5	3						3	0,9	13,6		
				Izdanacka mešovita šuma bagrema - jednodobna (u optimalnoj fazi). Ocuvana								UKUP.	538	474	86	28	25		1151	35,3	214,2	80,8	8,5
				sastojina. Mešovita sastojina (smeša stablimicna) potpunog sklopa (0.7).																			
				u celini zdravstveno stanje sastojine je dobro. po kvalitetu malo vredna																			
				sastojina (ima do 20% tehnickog drveta). Srednja ugroženost od insekata.																			
				Mala ugroženost od vetra. srednje negovana sastojina. Stabla srebrna																			
				lipa su zakrivljena i sa srednjim padom precnika (srednja punodrvnost),																			
				sa srednje dugim krošnjama (dužine izmedu 1/3 i 1/2 visine stabala) i																			
				ekscentricnim krošnjama, do 10% oštecenih stabala od vetra, snega i leda,																			
				suvih i suhovrhih stabala ima do 10%, zdravstveno stanje stabala ove																			
				vrste drveca je dobro. Stabla bagrema su zakrivljena i sa srednjim padom																			
				precnika (srednja punodrvnost), sa srednje dugim krošnjama (dužine izmedu																			
				1/3 i 1/2 visine stabala) i ekscentricnim krošnjama, zdravstveno stanje																			
27	h	60326261	2,50	stabala ove vrste drveca je dobro.																			
				Šuma - nalazi se na strani i na vrlo strmom terenu(nagiba od 16° do	1. SrLip	0,6		102	20	13,1	10	7,5	212			7	7	17	242	1,1	3,4		
				20°) - nagib ujednacen. Nadmorska visina 310 do 330m. Ekspozicija 1	2. Kit	0,4			51	21,4	12	12,5	7						7	0,1	0,3		
				zapadna. Mrtvi pokrivac srednje zastupljen - povoljan proces	3. Tre	0,1			43	19,9	14	17,5	7						7	0,2	1,2		

ОПИС СТАНИШТА И САСТОЈИНА

Ozn.mesta		gazdi-	površ-	OPIS	Osnovni taksacioni elementi						visi	deb.	Broj stabala po hektaru							G	Zapremina po		
ode-	od-	nska	ina		vrsta	sme	obr	sta-	sred.stablo		nski			Vrsta drveta						po		Vrsta drv	
ljenje	sek	klasa	ha		drveća	sa	ast	rost	Ds	Hs	step.	st.	1	2	3	4	5	6	svg.	ha	1	2	3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
				humifikacije. Srednje gusta prizemna vegetacija. Srednje gusto žbunje.	4. Brk				8	5,1	11	22,5	33						33	1,3	10,6		
				Nema zakorovljenosti. tip šume kitnjaka i cera (Quercetum petraeae-cerris	5. Klen				8	5,1	11	27,5	7						7	0,4	3,0		
				typicum) na lesiviranim gajnjacama i beskarbonatnom deluvijumu..	6. Gr				8	5,1	11	32,5	20	7					26	2,2	13,7	5,0	
												37,5	17	7					23	2,6	18,3	6,1	
				Izdanacka mešovita šuma kitnjaka (izdanacka šuma kitnjaka i lipe) -								42,5	13	7	13				33	4,7	18,1	10,1	18,1
				jednodobna (u fazi razgradnje). Razredjena sastojina. Mešovita sastojina								47,5	33	7					40	7,1	57,2	13,6	
				(smeša stablimicna) nepotpunog sklopa (0.5-0.6). u celini zdravstveno								52,5	17	7					23	5,0	33,4	14,9	
				stanje sastojine je osrednje. po kvalitetu malo vredna sastojina (ima do								57,5		7					7	1,7		18,3	
				20% tehnickog drveta). Srednja ugroženost od insekata. Srednja ugroženost								67,5		7					7	2,4		26,5	
				od fitopatoloških oboljenja-oboljenja lista. pogrešno negovana sastojina.								72,5		7					7	2,7		33,8	
				Stabla srebrna lipa su zakrivljena i sa srednjim padom precnika (srednja								77,5	7						7	3,1	31,3		
				punodrvnost), sa srednje dugim krošnjama (dužine izmedu 1/3 i 1/2 visine								UKUP.	371	53	13	7	7	17	466	34,3	190,4	128,3	18,1
				stabala) i ekscentricnim krošnjama, zdravstveno stanje stabala ove vrste																			
				drveca je dobro. Stabla kitnjaka su zakrivljena i sa srednjim padom																			
				precnika (srednja punodrvnost), sa srednje dugim krošnjama (dužine izmedu																			
				1/3 i 1/2 visine stabala) i ekscentricnim krošnjama, do 10% oštecenih																			
				stabala od insekata i fitopatoloških obolenja, suvih i suhovrhih stabala																			
27	i	60307463	1,00	ima do 10%, zdravstveno stanje stabala ove vrste drveca je osrednje.																			

ОПИС СТАНИШТА И САСТОЈИНА

Ozn.mesta		gazdi-	površ-	OPIS	Osnovni taksacioni elementi						visi	deb.	Broj stabala po hektaru							G	Zapremina po		
ode-	od-	nska	ina		vrsta	sme	obr	sta-	sred.stablo		nski			Vrsta drveta						po		Vrsta drv	
ljenje	sek	klasa	ha		drveća	sa	ast	rost	Ds	Hs	step.	st.	1	2	3	4	5	6	svg.	ha	1	2	3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
				Šuma - nalazi se na strani i na blago nagnutom terenu (nagiba do 5°) -	1. Kit	0,7		102	50	21,9	11	7,5		176	29	10			216	1,0		4,0	0,9
				nagib ujednacen. Nadmorska visina 305 do 310m. Ekspozicija 1 zapadna.	2. SrLip	0,2			12	11,0	9	12,5		20	39				59	0,7		1,9	3,5
				Mrtvi pokrivac srednje zastupljen - povoljan proces humifikacije. Srednje	3. Gr				12	9,1	9	22,5		10	10				20	0,8		3,6	3,1
				gusta prizemna vegetacija. Srednje gusto žbunje. Nema zakorovljenosti.	4. Klen				8	7,2	11	37,5		10					10	1,1		8,7	
				tip šume kitnjaka i cera (Quercetum petraeae-cerris typicum) na								42,5	20						20	2,8	30,1		
				lesiviranim gajnjacama i beskarbonatnom deluvijumu..								47,5	10						10	1,7	18,6		
												52,5	29						29	6,4	72,6		
				Izdanacka mešovita šuma kitnjaka (izdanacka šuma kitnjaka i lipe) -								62,5	10	10					20	6,0	38,7	30,2	
				jednodobna (u fazi razgradnje). Razredjena sastojina. Mešovita sastojina								UKUP.	69	225	78	10			382	20,4	160,0	48,5	7,4
				(smeša stablimicna) nepotpunog sklopa (0.5-0.6). u celini zdravstveno																			
				stanje sastojine je osrednje. po kvalitetu malo vredna sastojina (ima do																			
				20% tehnickog drveta). Srednja ugroženost od insekata. Srednja ugroženost																			
				od fitopatoloških oboljenja-oboljenja lista. pogrešno negovana sastojina.																			
				Stabla graba su kriva i sa velikim padom precnika (mala punodrvnost), sa																			
				dugim krošnjama (dužine izmedu 1/2 i 2/3 visine stabala) i preširokim																			
				krošnjama, do 10% oštecenih stabala od vetra, snega i leda, suvih i																			
				suhovrhih stabala ima do 10%, zdravstveno stanje stabala ove vrste																			
				drveca je dobro. Stabla srebrna lipa su zakrivljena i sa srednjim padom																			
				precnika (srednja punodrvnost), sa srednje dugim krošnjama (dužine izmedu																			
				1/3 i 1/2 visine stabala) i ekscentricnim krošnjama, do 10% oštecenih																			
				stabala od insekata i fitopatoloških obolenja, suvih i suhovrhih stabala																			
				ima do 10%, zdravstveno stanje stabala ove vrste drveca je dobro. Stabla																			
				kitnjaka su zakrivljena i sa srednjim padom precnika (srednja																			
				punodrvnost), sa srednje dugim krošnjama (dužine izmedu 1/3 i 1/2 visine																			
				stabala) i ekscentricnim krošnjama, do 10% oštecenih stabala od insekata																			
				i fitopatoloških obolenja, suvih i suhovrhih stabala ima do 10%,																			
27	j	60307463	0,37	zdravstveno stanje stabala ove vrste drveca je osrednje.																			
				Šuma - nalazi se na strani i na strmom terenu (nagiba od 11° do 15°) -	1. Kit	0,5		102	38	22,7	9	7,5		52	114	57	5	6	234	1,0		1,1	2,7
				nagib valovit. Nadmorska visina 275 do 350m. Ekspozicija 1 jugozapadna.	2. Bk	0,2			24	17,5	11	12,5		13	30	19			61	0,8		1,2	2,6
				Mrtvi pokrivac srednje zastupljen - povoljan proces humifikacije. Srednje	3. SrLip	0,1			16	12,7	6	17,5		8	6	28			41	1,0		1,6	0,8
				gusta prizemna vegetacija. Srednje gusto žbunje. Nema zakorovljenosti.	4. Gr	0,1			14	11,7	8	22,5	11		13	13			37	1,5	3,8		4,9
				tip šume bukve i kitnjaka (Querco-Fagetum typicum) na gajnjaci do	5. Tre				23	16,8	11	27,5	17	8	8	6			38	2,3	9,8	5,2	4,2
				lesiviranoj gajnjaci i eutricnim smedim do lesiviranim eutricnim smedjim	6. Brk				8	5,9	8	32,5	45	12	8	4			69	5,7	39,3	11,0	6,8
				zemljištima..								37,5	37	11	8	2	5		63	7,0	48,3	14,1	8,6
												42,5	23	15	8				46	6,5	36,3	23,9	11,4
				Izdanacka mešovita šuma kitnjaka (izdanacka šuma kitnjaka, bukve i lipe)								47,5	20	2	8				29	5,2	41,9	4,8	16,2
				- jednodobna (u fazi razgradnje). Ocuvana sastojina. Mešovita sastojina								52,5	6	10					15	3,3	15,1	28,8	
				(smeša stablimicna) gustog sklopa (0.8 - 0.9). u celini zdravstveno								57,5	10	2					12	3,1	32,8	7,3	
				stanje sastojine je osrednje. po kvalitetu malo vredna sastojina (ima do								62,5	2	2	2				7	2,0	9,1	9,0	7,6
				20% tehnickog drveta). Srednja ugroženost od insekata. Srednja ugroženost								UKUP.	170	135	202	130	11	6	653	39,3	236,5	108,0	65,7
				od fitopatoloških oboljenja-oboljenja lista. srednje negovana sastojina.																			
				Stabla srebrna lipa su zakrivljena i sa srednjim padom precnika (srednja																			
				punodrvnost), sa srednje dugim krošnjama (dužine izmedu 1/3 i 1/2 visine																			
				stabala) i ekscentricnim krošnjama, do 10% oštecenih stabala od vetra,																			
				snega i leda, suvih i suhovrhih stabala ima do 10%, zdravstveno stanje																			
				stabala ove vrste drveca je dobro. Stabla kitnjaka su zakrivljena i sa																			
				srednjim padom precnika (srednja punodrvnost), sa srednje dugim krošnjama																			
				(dužine izmedu 1/3 i 1/2 visine stabala) i normalno razvijenim krošnjama,																			

ОПИС СТАНИШТА И САСТОЈИНА

Ozn.mesta		gazdi-	površ-	OPIS	Osnovni taksacioni elementi						visi	deb.	Broj stabala po hektaru							G	Zapremina po		
ode-	od-	nska	ina		vrsta	sme	obr	sta-	sred.stablo		nski			Vrsta drveta						po		Vrsta drv	
ljenje	sek	klasa	ha		drveća	sa	ast	rost	Ds	Hs	step.	st.	1	2	3	4	5	6	svg.	ha	1	2	3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
				do 10% oštecenih stabala od vetra, snega i leda, do 10% oštecenih stabala																			
				od insekata i fitopatoloških obolenja, suvih i suhovrhih stabala ima do																			
				10%, zdravstveno stanje stabala ove vrste drveca je osrednje. Stabla																			
				bukve su zakrivljena i sa srednjim padom precnika (srednja punodrvnost),																			
				sa srednje dugim krošnjama (dužine izmedu 1/3 i 1/2 visine stabala) i																			
				normalno razvijenim krošnjama, do 10% oštecenih stabala od vetra, snega i																			
				leda, suvih i suhovrhih stabala ima do 10%, zdravstveno stanje stabala																			
27	k	60307601	9,08	ove vrste drveca je dobro.																			

Ozn.mesta		gazdi-	površ-	OPIS	Osnovni taksacioni elementi						visi	deb.	Broj stabala po hektaru							G	Zapremina po		
ode-	od-	nska	ina		vrsta	sme	obr	sta-	sred.stablo		nski			Vrsta drveta						po		Vrsta drv	
ljenje	sek	klasa	ha		drveća	sa	ast	rost	Ds	Hs	step.	st.	1	2	3	4	5	6	svg.	ha	1	2	3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
				Šuma - nalazi se na strani i na srednje strmom terenu (nagiba od 6° do	1. Kit	0,6		102	43	22,7	10	7,5			148	141	33	38	360	1,6			3,3
				10°) - nagib ujednacen. Nadmorska visina 270 do 310m. Ekspozicija 1	2. Cer	0,2			50	23,9	9	12,5			22	82		6	110	1,3			1,9
				jugozapadna. Mrtvi pokrivac srednje zastupljen - povoljan proces	3. Gr	0,1			13	11,2	9	17,5			11	4		6	21	0,5			2,3
				humifikacije. Retka prizemna vegetacija. Srednje gusto žbunje. Nema	4. SrLip	0,1			11	9,6	8	22,5			12	6			18	0,7			4,4
				zakorovljenosti. tip šume kitnjaka i cera (Quercetum petraeae-cerris	5. OTL				10	9,3	10	27,5	6			4			10	0,6	3,0		
				typicum) na lesiviranim gajnjacama i beskarbonatnom deluvijumu..	6. Klen				9	8,3	9	32,5	14		9				23	1,9	13,0		7,0
												37,5	27	6	10	5			48	5,3	31,5	7,3	10,3
				Izdanacka mešovita šuma kitnjaka (izdanacka šuma kitnjaka, cera i graba)								42,5	38	2					40	5,7	60,8	3,6	
				- jednodobna (u fazi razgradnje). Ocuvana sastojina. Mešovita sastojina								47,5	17		5				22	3,9	35,4		9,0
				(smeša stablimicna) potpunog sklopa (0.7). u celini zdravstveno stanje								52,5	19	11			2		32	6,9	49,1	26,8	
				sastojine je dobro. po kvalitetu malo vredna sastojina (ima do 20%								57,5	6	2					8	2,0	17,9	6,6	
				tehnickog drveta). Srednja ugroženost od insekata. Srednja ugroženost od								67,5	2	2					4	1,6	9,5	8,4	
				fitopatoloških oboljenja-oboljenja lista. srednje negovana sastojina.								UKUP.	128	23	216	243	35	50	695	32,0	220,2	52,7	38,2
				Stabla srebrna lipa su zakrivljena i sa srednjim padom precnika (srednja																			
				punodrvnost), sa srednje dugim krošnjama (dužine izmedu 1/3 i 1/2 visine																			
				stabala) i ekscentricnim krošnjama, do 10% oštecenih stabala od insekata																			
				i fitopatoloških obolenja, suvih i suhovrhih stabala ima do 10%,																			
				zdravstveno stanje stabala ove vrste drveca je dobro. Stabla kitnjaka su																			
				zakrivljena i sa srednjim padom precnika (srednja punodrvnost), sa																			
				srednje dugim krošnjama (dužine izmedu 1/3 i 1/2 visine stabala) i																			
				normalno razvijenim krošnjama, do 10% oštecenih stabala od insekata i																			
				fitopatoloških obolenja, suvih i suhovrhih stabala ima do 10%,																			
27	1	60307463	6,60	zdravstveno stanje stabala ove vrste drveca je dobro.																			
				Vidikovac.																			
27	1	60	0,19																				
				Šumsko zemljište.																			
27	2	60	0,12																				
				Livada.																			
27	3	60	0,34																				
				Livada.																			
27	4	60	0,59																				
				Put.																			
27	5	60	0,16																				
				Dalekovod.																			
27	6	60	0,63																				
				Šuma - nalazi se na grebenu i na strmom terenu (nagiba od 11° do 15°) -	1. Kit	0,6		89	30	18,8	11	7,5		274	48	16	64	49	450	2,0		6,3	1,5

ОПИС СТАНИШТА И САСТОЈИНА

Ozn.mesta		gazdi-	površ-	OPIS	Osnovni taksacioni elementi						visi	deb.	Broj stabala po hektaru							G	Zapremina po		
ode-	od-	nska	ina		vrsta	sme	obr	sta-	sred.stablo		nski			Vrsta drveta						po		Vrsta drv	
ljenje	sek	klasa	ha		drveća	sa	ast	rost	Ds	Hs	step.	st.	1	2	3	4	5	6	svg.	ha	1	2	3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
				nagib ujednacen. Nadmorska visina 325 do 400m. Ekspozicija 1	2. SrLip	0,4			14	12,3	9	12,5		195	16				211	2,6		15,2	1,0
				jugozapadna. Mrtvi pokrivac obilno zastupljen (tanak sloj) - povoljan	3. Klen				9	8,3	11	17,5		65		16			81	1,9		10,8	
				proces humifikacije. Gusta prizemna vegetacija. Gusto žbunje. Slaba	4. Cjas				13	11,2	12	22,5	97	49					145	5,8	36,2	16,3	
				zakorovljenost. tip šume kitnjaka (Quercetum montanum typicum) na kiselom	5. Brk				8	8,5	14	27,5	32	32					64	3,8	19,8	16,9	
				smedem i lesiviranom kiselom smedjem zemljištu..	6. OTL				8	6,9	13	32,5	130	32					162	13,5	101,8	23,1	
												42,5	32						32	4,5	43,5		
				Izdanacka mešovita šuma kitnjaka (izdanacka šuma kitnjaka i lipe) -								52,5		16					16	3,4		33,4	
				jednodobna (u fazi razgradnje). Ocuvana sastojina. Mešovita sastojina								UKUP.	291	662	64	32	64	49	1161	37,5	201,4	122,0	2,5
				(smeša stablimicna) gustog sklopa (0.8 - 0.9). u celini zdravstveno																			
				stanje sastojine je osrednje. po kvalitetu malo vredna sastojina (ima do																			
				20% tehnickog drveta). Srednja ugroženost od insekata. Srednja ugroženost																			
				od fitopatoloških oboljenja-oboljenja kore. srednje negovana sastojina.																			
				Stabla srebrna lipa su zakrivljena i sa srednjim padom precnika (srednja																			
				punodrvnost), sa srednje dugim krošnjama (dužine izmedu 1/3 i 1/2 visine																			
				stabala) i ekscentricnim krošnjama, zdravstveno stanje stabala ove vrste																			
				drveca je dobro. Stabla kitnjaka su zakrivljena i sa srednjim padom																			
				precnika (srednja punodrvnost), sa srednje dugim krošnjama (dužine izmedu																			
				1/3 i 1/2 visine stabala) i normalno razvijenim krošnjama, do 10%																			
				oštecenih stabala od insekata i fitopatoloških obolenja, zdravstveno																			
28	a	59307482	1,12	stanje stabala ove vrste drveca je osrednje.																			

Ozn.mesta		gazdi-	površ-	OPIS	Osnovni taksacioni elementi						visi	deb.	Broj stabala po hektaru							G	Zapremina po		
ode-	od-	nska	ina		vrsta	sme	obr	sta-	sred.stablo		nski			Vrsta drveta						po		Vrsta drv	
ljenje	sek	klasa	ha		drveća	sa	ast	rost	Ds	Hs	step.	st.	1	2	3	4	5	6	svg.	ha	1	2	3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
				Šuma - nalazi se na strani i na strmom terenu (nagiba od 11° do 15°) -	1. SrLip	0,8		89	26	17,6	6	7,5	85		7		16		108	0,5	2,0		0,1
				nagib ujednacen. Nadmorska visina 355 do 395m. Ekspozicija 1 istocna.	2. Kit	0,1			37	22,5	8	12,5	16		7	7			29	0,4	1,7		0,6
				Mrtvi pokrivac srednje zastupljen - povoljan proces humifikacije. Srednje	3. Bk				23	15,5	11	17,5	39			6			46	1,1	7,0		
				gusta prizemna vegetacija. Srednje gusto žbunje. Slaba zakorovljenost.	4. Gr				22	15,2	8	22,5	23			6			29	1,2	7,3		
				tip šume kitnjaka i graba sa klokocikom (Querco-Carpinetum staphyletosum)	5. Mle				8	4,3	8	27,5		6	13	16			36	2,1		3,5	7,8
				na kiselom smedem do lesiviranom kiselom smedjem zemljištu..								32,5	59						59	4,9	51,5		
												37,5	23	20	7				49	5,4	25,8	26,1	7,3
				Izdanacka mešovita šuma lipa (izdanacka šuma lipa i kitnjaka) -								42,5	6	6					13	1,8	11,0	12,0	
				jednodobna (u fazi razgradnje). Razredjena sastojina. Mešovita sastojina								47,5	36						36	6,3	77,3		
				(smeša stablimicna) nepotpunog sklopa (0.5-0.6). u celini zdravstveno								52,5	20						20	4,2	47,3		
				stanje sastojine je dobro. po kvalitetu malo vredna sastojina (ima do 20%								57,5	7						7	1,7	21,1		
				tehnickog drveta). Srednja ugroženost od insekata. Srednja ugroženost od								UKUP.	313	33	33	36	16		430	29,6	252,1	41,6	15,8
				vetra. pogrešno negovana sastojina. Stabla srebrna lipa su zakrivljena i																			
				sa srednjim padom precnika (srednja punodrvnost), sa srednje dugim																			
				krošnjama (dužine izmedu 1/3 i 1/2 visine stabala) i ekscentricnim																			
				krošnjama, do 10% oštecenih stabala od vetra, snega i leda, zdravstveno																			
				stanje stabala ove vrste drveca je dobro. Stabla kitnjaka su zakrivljena																			
				i sa srednjim padom precnika (srednja punodrvnost), sa srednje dugim																			
				krošnjama (dužine izmedu 1/3 i 1/2 visine stabala) i ekscentricnim																			
				krošnjama, do 10% oštecenih stabala od insekata i fitopatoloških																			
28	b	59288263	1,74	obolenja, zdravstveno stanje stabala ove vrste drveca je osrednje.																			
				Šuma - nalazi se na strani i na strmom terenu (nagiba od 11° do 15°) -	1. Kit	0,6		89	39	19,9	11	7,5		175	52	5	19	30	281	1,2		3,0	1,0
				nagib ujednacen. Nadmorska visina 310 do 360m. Ekspozicija 1 istocna.	2. SrLip	0,3			17	14,2	12	12,5		46	13	2		2	63	0,8		3,1	1,3
				Mrtvi pokrivac srednje zastupljen - povoljan proces humifikacije. Gusta	3. Gr	0,1			17	13,7	11	17,5		6	19		2		26	0,6		0,6	3,7
				prizemna vegetacija. Gusto žbunje. Slaba zakorovljenost. tip šuma	4. Bk				27	17,5	14	22,5		22	12				34	1,3		5,8	4,1
				kitnjaka i graba sa lazarkinjom (Querco - Carpinetum asperulosum) na	5. Tre				9	8,3	14	27,5	15		10				25	1,5	8,2		5,0
				gajnjaci do lesiviranoj gajnjaci i lesiviranom smedem zemljištu na	6. OTL				8	7,7	11	32,5	40	16	2				59	4,9	33,1	10,2	1,5
				serpentinitu ..								37,5	32	26	6				63	6,9	35,7	24,5	6,2
												42,5	39	16	8				63	8,9	62,8	19,6	9,7
				Izdanacka mešovita šuma kitnjaka (izdanacka šuma kitnjaka i lipe) -								47,5	27	11					38	6,8	51,0	17,9	
				jednodobna (u fazi razgradnje). Ocuvana sastojina. Mešovita sastojina								52,5		8		5			13	2,8		14,1	
				(smeša stablimicna) potpunog sklopa (0.7). u celini zdravstveno stanje								57,5	8						8	2,0	21,6		
				sastojine je osrednje. po kvalitetu malo vredna sastojina (ima do 20%								62,5		2					2	0,7		5,9	
				tehnickog drveta). Srednja ugroženost od insekata. Srednja ugroženost od								UKUP.	161	327	121	13	21	33	675	38,4	212,4	104,7	32,6
				fitopatoloških oboljenja-oboljenja kore. srednje negovana sastojina.																			
				Stabla srebrna lipa su zakrivljena i sa srednjim padom precnika (srednja																			
				punodrvnost), sa srednje dugim krošnjama (dužine izmedu 1/3 i 1/2 visine																			
				stabala) i ekscentricnim krošnjama, zdravstveno stanje stabala ove vrste																			
				drveca je dobro. Stabla kitnjaka su zakrivljena i sa srednjim padom																			
				precnika (srednja punodrvnost), sa srednje dugim krošnjama (dužine izmedu																			
				1/3 i 1/2 visine stabala) i normalno razvijenim krošnjama, do 10%																			
				oštecenih stabala od insekata i fitopatoloških obolenja, zdravstveno																			
28	c	59307261	8,00	stanje stabala ove vrste drveca je osrednje.																			
				Šuma - nalazi se na strani i na blago nagnutom terenu (nagiba do 5°) -	1. Bag	0,4		26	15	13,2	15	7,5	149	50	149	149			497	2,2	4,5	2,1	3,8
				nagib ujednacen. Nadmorska visina 305 do 315m. Ekspozicija 1 bez jasno	2. SrLip	0,5			21	15,8	9	12,5	223	75	50				348	4,3	19,7	6,6	4,8
				izražene ekspozicije. Mrtvi pokrivac slabo zastupljen - povoljan proces	3. PBr				9	7,5	9	17,5	50			25	25		100	2,4	10,0		
				humifikacije. Retka prizemna vegetacija. Retko žbunje. Slaba	4. Gr				9	6,5	9	22,5	100	25					125	4,9	35,4	6,0	
				zakorovljenost. tip šuma kitnjaka i graba sa lazarkinjom (Querco -	5. Klen				18	13,7	11	27,5	50	25					75	4,4	29,0	11,1	

ОПИС СТАНИШТА И САСТОЈИНА

Ozn.mesta		gazdi-	površ-	OPIS	Osnovni taksacioni elementi						visi	deb.	Broj stabala po hektaru							G	Zapremina po		
ode-	od-	nska	ina		vrsta	sme	obr	sta-	sred.stablo		nski			Vrsta drveta						po		Vrsta drv	
ljenje	sek	klasa	ha		drveća	sa	ast	rost	Ds	Hs	step.	st.	1	2	3	4	5	6	svg.	ha	1	2	3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
				Carpinetum asperulosum) na gajnjaci do lesiviranoj gajnjaci i lesiviranom								37,5		75				75	8,2		77,5	
				smedem zemljištu na serpentinitu ..								UKUP.	572	249	199	174	25		1218	26,5	98,6	103,3	8,6
				Izdanacka mešovita šuma bagrema - jednodobna (u optimalnoj fazi). Ocuvana																			
				sastojina. Mešovita sastojina (smeša stablimicna) gustog sklopa (0.8 -																			
				0.9). u celini zdravstveno stanje sastojine je dobro. po kvalitetu																			
				sastojina bez vrednosti (bez ucešca tehnickog drveta). Srednja ugroženost																			
				od insekata. Srednja ugroženost od fitopatoloških oboljenja-oboljenja																			
				kore. nenegovana sastojina. Stabla bagrema su prava i sa srednjim padom																			
				precnika (srednja punodrvnost), sa kratkim krošnjama (dužine izmedu 1/4																			
				i1/3 visine stabala) i uskim krošnjama, do 10% oštecenih stabala od																			
				insekata i fitopatoloških obolenja, zdravstveno stanje stabala ove vrste																			
28	d	60326261	0,39	drveca je dobro.																			

ОПИС СТАНИШТА И САСТОЈИНА

Ozn.mesta		gazdi-	površ-	OPIS	Osnovni taksacioni elementi						visi	deb.	Broj stabala po hektaru							G	Zapremina po		
ode-	od-	nska	ina		vrsta	sme	obr	sta-	sred.stablo		nski			Vrsta drveta						po		Vrsta drv	
ljenje	sek	klasa	ha		drveća	sa	ast	rost	Ds	Hs	step.	st.	1	2	3	4	5	6	svg.	ha	1	2	3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
				Šuma - nalazi se na strani i na vrlo strmom terenu(nagiba od 16° do	1. Bk	0,4		89	31	20,7	12	7,5	16		33	41	41	25	156	0,7	0,4		0,6
				20°) - nagib ujednacen. Nadmorska visina 285 do 335m. Ekspozicija 1	2. Kit	0,4			37	20,0	11	12,5	15		24	8	17	25	88	1,1	1,0		1,8
				istok - severoistok. Mrtvi pokrivac srednje zastupljen - povoljan proces	3. OTL				14	10,2	11	17,5	15		8	3	66	25	117	2,8	2,6		1,0
				humifikacije. Srednje gusta prizemna vegetacija. Retko žbunje. Slaba	4. SrLip				15	10,8	9	22,5	8				8		16	0,6	3,4		
				zakorovljenost. tip šume bukve i kitnjaka (Querco-Fagetum typicum) na	5. Bag				14	10,5	17	27,5	10	16				17	42	2,5	5,6	9,1	
				gajnjaci do lesiviranoj gajnjaci i eutricnim smedim do lesiviranim	6. Gr				15	11,3	10	32,5	21	49	6				76	6,3	17,3	40,6	5,6
				eutricnim smedjim zemljištima..								37,5	15	36	3	3			58	6,4	18,4	43,9	3,8
												42,5	38	49		8			95	13,5	62,6	71,3	
				Izdanacka mešovita šuma bukve (izdanacka šuma bukve i kitnjaka) -								47,5	10						10	1,7	20,2		
				jednodobna (u fazi razgradnje). Ocuvana sastojina. Mešovita sastojina								52,5	7	6					13	2,8	16,4	15,2	
				(smeša stablimicna) potpunog sklopa (0.7). u celini zdravstveno stanje								62,5	3						3	1,0	13,0		
				sastojine je dobro. po kvalitetu malo vredna sastojina (ima do 20%								UKUP.	157	157	75	63	132	91	675	39,4	160,9	180,1	12,9
				tehnickog drveta). Mala ugroženost od insekata. Mala ugroženost od vetra.																			
				srednje negovana sastojina. Stabla kitnjaka su zakrivljena i sa srednjim																			
				padom precnika (srednja punodrvnost), sa srednje dugim krošnjama (dužine																			
				izmedu 1/3 i 1/2 visine stabala) i normalno razvijenim krošnjama, do 10%																			
				oštecenih stabala od insekata i fitopatoloških obolenja, zdravstveno																			
				stanje stabala ove vrste drveca je dobro. Stabla bukve su zakrivljena i																			
				sa srednjim padom precnika (srednja punodrvnost), sa srednje dugim																			
				krošnjama (dužine izmedu 1/3 i 1/2 visine stabala) i normalno razvijenim																			
				krošnjama, do 10% oštecenih stabala od vetra, snega i leda, zdravstveno																			
28	e	60361601	2,86	stanje stabala ove vrste drveca je dobro.																			
				Šuma - nalazi se na ravnom terenu. i na blago nagnutom terenu (nagiba do	1. Kit	0,4		89	39	23,7	8	7,5		78	13	7	8	26	132	0,6		2,0	0,4
				5°) - nagib ujednacen. Nadmorska visina 300 do 315m. Ekspozicija 1 bez	2. SrLip	0,3			21	17,3	6	12,5		3	7		8	18	36	0,4		0,2	0,6
				jasno izražene ekspozicije. Mrtvi pokrivac srednje zastupljen - povoljan	3. Gr	0,2			25	18,8	8	17,5		15	23	7	25		70	1,7		3,2	4,8
				proces humifikacije. Srednje gusta prizemna vegetacija. Retko žbunje.	4. Bk	0,1			30	20,8	11	22,5			13		17		30	1,2			4,8
				Slaba zakorovljenost. tip šuma kitnjaka i graba sa lazarkinjom (Querco -	5. Bag	0,1			19	15,8	15	27,5		8	8			3	20	1,2		4,6	4,1
				Carpinetum asperulosum) na gajnjaci do lesiviranoj gajnjaci i lesiviranom	6. OTL				11	10,0	8	32,5	15		3	7	8		33	2,7	15,5		3,3
				smedem zemljištu na serpentinitu ..								37,5	21	12	23	3			59	6,6	27,7	13,4	27,7
												42,5	35	17	8	3			63	8,9	65,3	25,6	12,0
				Izdanacka mešovita šuma kitnjaka - jednodobna (u fazi razgradnje).								47,5	3	8		3			15	2,6	7,9	14,8	
				Ocuvana sastojina. Mešovita sastojina (smeša stablimicna) potpunog sklopa								52,5		12		3			15	3,2		27,4	
				(0.7). u celini zdravstveno stanje sastojine je dobro. po kvalitetu malo								UKUP.	74	152	99	33	67	48	473	29,1	116,4	91,4	57,6
				vredna sastojina (ima do 20% tehnickog drveta). Srednja ugroženost od																			
				insekata. Srednja ugroženost od fitopatoloških oboljenja-oboljenja kore.																			
				srednje negovana sastojina. Stabla kitnjaka su zakrivljena i sa srednjim																			
				padom precnika (srednja punodrvnost), sa srednje dugim krošnjama (dužine																			
				izmedu 1/3 i 1/2 visine stabala) i normalno razvijenim krošnjama, do 10%																			
				oštecenih stabala od insekata i fitopatoloških obolenja, zdravstveno																			
				stanje stabala ove vrste drveca je dobro. Stabla bukve su zakrivljena i																			
				sa srednjim padom precnika (srednja punodrvnost), sa srednje dugim																			
				krošnjama (dužine izmedu 1/3 i 1/2 visine stabala) i ekscentricnim																			
				krošnjama, do 10% oštecenih stabala od vetra, snega i leda, zdravstveno																			
28	f	60307261	2,19	stanje stabala ove vrste drveca je dobro.																			
				Šuma - nalazi se na strani i na srednje strmom terenu (nagiba od 6° do	1. Kit	0,7		89	47	25,4	8	7,5		151	106	55	3	17	332	1,5		4,0	2,1
				10°) - nagib ujednacen. Nadmorska visina 270 do 310m. Ekspozicija 1	2. SrLip	0,2			13	11,9	6	12,5		67	21	17		7	112	1,4		5,7	2,1
				istocna. Mrtvi pokrivac srednje zastupljen - povoljan proces	3. Gr	0,1			12	10,7	7	17,5		61	14		3	7	85	2,0		12,4	2,2
				humifikacije. Gusta prizemna vegetacija. Srednje gusto žbunje. Slaba	4. Klen				9	8,2	7	22,5		14	3	3	6		26	1,0		4,5	1,2

ОПИС СТАНИШТА И САСТОЈИНА

Ozn.mesta		gazdi-	površ-	OPIS	Osnovni taksacioni elementi						visi	deb.	Broj stabala po hektaru							G	Zapremina po		
ode-	od-	nska	ina		vrsta	sme	obr	sta-	sred.stablo		nski			Vrsta drveta						po		Vrsta drv	
ljenje	sek	klasa	ha		drveća	sa	ast	rost	Ds	Hs	step.	st.	1	2	3	4	5	6	svg.	ha	1	2	3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
				zakorovljenost. tip šuma kitnjaka i graba sa lazarkinjom (Querco -	5. Bag				18	14,8	16	27,5		23					23	1,3		12,6	
				Carpinetum asperulosum) na gajnjaci do lesiviranoj gajnjaci i lesiviranom	6. OTL				11	9,8	8	32,5	14	10	7				31	2,6	15,0	8,0	5,5
				smedem zemljištu na serpentinitu ..								37,5	14						14	1,6	19,5		
												42,5	21						21	3,0	34,4		
				Izdanacka mešovita šuma kitnjaka - jednodobna (u fazi razgradnje).								47,5	28	3	3				34	6,0	68,7	5,6	6,2
				Ocuvana sastojina. Mešovita sastojina (smeša stablimicna) gustog sklopa								52,5	21		3				24	5,2	56,1		7,3
				(0.8 - 0.9). u celini zdravstveno stanje sastojine je osrednje. po								57,5	10						10	2,6	33,9		
				kvalitetu malo vredna sastojina (ima do 20% tehnickog drveta). Srednja								67,5	7						7	2,5	35,6		
				ugroženost od insekata. Srednja ugroženost od fitopatoloških								UKUP.	115	328	157	75	11	31	718	30,6	263,3	52,8	26,7
				oboljenja-oboljenja kore. srednje negovana sastojina. Stabla srebrna																			
				lipa su zakrivljena i sa srednjim padom precnika (srednja punodrvnost),																			
				sa srednje dugim krošnjama (dužine izmedu 1/3 i 1/2 visine stabala) i																			
				ekscentricnim krošnjama, zdravstveno stanje stabala ove vrste drveca je																			
				dobro. Stabla kitnjaka su zakrivljena i sa srednjim padom precnika																			
				(srednja punodrvnost), sa srednje dugim krošnjama (dužine izmedu 1/3 i																			
				1/2 visine stabala) i ekscentricnim krošnjama, od 11-25% oštecenih																			
				stabala od insekata i fitopatoloških obolenja, zdravstveno stanje																			
28	g	60307261	3,21	stabala ove vrste drveca je osrednje.																			

Ozn.mesta		gazdi-	površ-	OPIS	Osnovni taksacioni elementi						visi	deb.	Broj stabala po hektaru							G	Zapremina po		
ode-	od-	nska	ina		vrsta	sme	obr	sta-	sred.stablo		nski			Vrsta drveta						po		Vrsta drv	
ljenje	sek	klasa	ha		drveća	sa	ast	rost	Ds	Hs	step.	st.	1	2	3	4	5	6	svg.	ha	1	2	3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
				Šuma - nalazi se na ravnom terenu. i na blago nagnutom terenu (nagiba do	1. Bag	0,3		26	16	13,5	15	7,5	33		109	13	39		194	0,9	0,8		2,7
				5°) - nagib ujednacen. Nadmorska visina 305 do 320m. Ekspozicija 1 bez	2. Kit	0,4			39	17,9	13	12,5	53		53	17	23		146	1,8	4,1		3,4
				jasno izražene ekspozicije. Mrtvi pokrivac slabo zastupljen - povoljan	3. SrLip	0,1			12	10,2	11	17,5	46		33				79	1,9	9,0		5,3
				proces humifikacije. Retka prizemna vegetacija. Retko žbunje. Slaba	4. Gr	0,1			18	13,2	12	22,5	46			17			62	2,5	17,6		
				zakorovljenost. tip šuma kitnjaka i graba sa lazarkinjom (Querco -	5. Klen				9	8,5	12	27,5	7	17	17	17			56	3,3	4,8	7,7	8,7
				Carpinetum asperulosum) na gajnjaci do lesiviranoj gajnjaci i lesiviranom								32,5	7	17					23	1,9	5,2	10,9	
				smedem zemljištu na serpentinitu ..								57,5		17					17	4,3		43,8	
												UKUP.	191	50	211	63	63		577	16,6	41,6	62,5	20,0
				Izdanacka mešovita šuma bagrema - jednodobna (u fazi izgradnje). Ocuvana																			
				sastojina. Mešovita sastojina (smeša stablimicna) vrlo gustog sklopa																			
				(1.0). u celini zdravstveno stanje sastojine je dobro. po kvalitetu																			
				sastojina bez vrednosti (bez ucešca tehnickog drveta). Srednja ugroženost																			
				od insekata. Srednja ugroženost od drugih štetnih uticaja. dobro negovana																			
				sastojina. Stabla bagrema su zakrivljena i sa srednjim padom precnika																			
				(srednja punodrvnost), sa kratkim krošnjama (dužine izmedu 1/4 i1/3																			
				visine stabala) i uskim krošnjama, zdravstveno stanje stabala ove vrste																			
28	h	60326261	1,00	drveca je dobro.																			
				Vocnjak.																			
28	1	60	0,28																				
				Livada.																			
28	2	60	0,17																				
				Put.																			
28	3	60	0,08																				
				Šuma - nalazi se na strani i na strmom terenu (nagiba od 11° do 15°) -	1. Kit	0,6		120	43	25,0	8	7,5		24	67	12	72	18	192	0,8		0,7	2,3
				nagib ujednacen. Nadmorska visina 310 do 355m. Ekspozicija 1 istocna.	2. OTL	0,2			24	17,7	8	12,5	8	4	37	8	15	8	79	1,0	0,6	0,3	3,7
				Ne postoji ugroženost od erozije - stablian teren u prirodnim uslovima.	3. SrLip	0,1			15	12,3	6	17,5		4	29	12			45	1,1		0,5	5,5
				Mrtvi pokrivac slabo zastupljen - povoljan proces humifikacije. Retka	4. Bk				14	11,7	10	22,5			18			10	27	1,1			5,8
				prizemna vegetacija. Srednje gusto žbunje. Srednja zakorovljenost. tip	5. Gr				8	6,7	7	27,5	4		8	4			16	0,9	2,0		4,8
				šume kitnjaka i graba sa klokocikom (Querco-Carpinetum staphyletosum) na	6. Klen				13	10,7	7	32,5	4		8				12	1,0	3,6		6,6
				kiselom smedem do lesiviranom kiselom smedjem zemljištu..								37,5	18						18	2,0	25,0		
												42,5	18						18	2,5	30,7		
				Izdanacka mešovita šuma kitnjaka (izdanacka šuma kitnjaka i lipe) -								47,5	4		4				8	1,4	8,1		8,6
				jednodobna (u fazi razgradnje). Ocuvana sastojina. Mešovita sastojina								52,5	8						8	1,7	22,4		
				(smeša stablimicna) potpunog sklopa (0.7). u celini zdravstveno stanje								57,5	18	4					22	5,6	62,1	14,0	
				sastojine je dobro. po kvalitetu malo vredna sastojina (ima do 20%								62,5	4						4	1,2	15,1		
				tehnickog drveta). Srednja ugroženost od insekata. Srednja ugroženost od								102,5		4					4	3,2		48,8	
				fitopatoloških oboljenja-oboljenja lista. srednje negovana sastojina.								UKUP.	84	39	169	36	88	35	451	23,4	169,6	64,3	37,3
				Stabla srebrna lipa su zakrivljena i sa srednjim padom precnika (srednja																			
				punodrvnost), sa srednje dugim krošnjama (dužine izmedu 1/3 i 1/2 visine																			
				stabala) i ekscentricnim krošnjama, do 10% oštecenih stabala od guljenja																			
				kore, suvih i suhovrhih stabala ima do 10%, zdravstveno stanje stabala																			
				ove vrste drveca je dobro. Stabla kitnjaka su zakrivljena i sa srednjim																			

ОПИС СТАНИШТА И САСТОЈИНА

Ozn.mesta		gazdi-	površ-	OPIS	Osnovni taksacioni elementi						visi	deb.	Broj stabala po hektaru							G	Zapremina po		
ode-	od-	nska	ina		vrsta	sme	obr	sta-	sred.stablo		nski			Vrsta drveta						po		Vrsta drv	
ljenje	sek	klasa	ha		drveća	sa	ast	rost	Ds	Hs	step.	st.	1	2	3	4	5	6	svg.	ha	1	2	3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
				padom precnika (srednja punodrvnost), sa srednje dugim krošnjama (dužine																			
				izmedu 1/3 i 1/2 visine stabala) i normalno razvijenim krošnjama, do 10%																			
				oštecenih stabala od insekata i fitopatoloških obolenja, suvih i																			
				suhovrhih stabala ima do 10%, zdravstveno stanje stabala ove vrste																			
29	a	59307263	1,78	drveca je dobro.																			
				Šuma - nalazi se na strani i na strmom terenu (nagiba od 11° do 15°) -	1. Bag			1															
				nagib valovit. Nadmorska visina 340 do 405m. Ekspozicija 1 istocna. Ne																			
				postoji ugroženost od erozije - stablian teren u prirodnim uslovima.																			
				Mrtvi pokrivac slabo zastupljen - povoljan proces humifikacije. Retka																			
				prizemna vegetacija. Gusto žbunje. Jaka zakorovljenost. tip šume kitnjaka																			
				i graba sa klokocikom (Querco-Carpinetum staphyletosum) na kiselom smeder																			
				do lesiviranom kiselom smedjem zemljištu..																			
				Izdanacka šuma bagrema - jednodobna (u fazi izgradnje). Ocuvana																			
				sastojina. Cista sastojina (smeša stablimicna) vrlo gustog sklopa (1.0).																			
				u celini zdravstveno stanje sastojine je dobro. po kvalitetu sastojina																			
				bez vrednosti (bez ucešca tehnickog drveta). Srednja ugroženost od																			
				insekata. Srednja ugroženost od drugih štetnih uticaja. dobro negovana																			
29	b	59325263	7,84	sastojina. 0.																			

Ozn.mesta		gazdi-	površ-	OPIS	Osnovni taksacioni elementi						visi	deb.	Broj stabala po hektaru							G	Zapremina po		
ode-	od-	nska	ina		vrsta	sme	obr	sta-	sred.stablo		nski			Vrsta drveta						po		Vrsta drv	
ljenje	sek	klasa	ha		drveća	sa	ast	rost	Ds	Hs	step.	st.	1	2	3	4	5	6	svg.	ha	1	2	3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
				Šuma - nalazi se na strani i na strmom terenu (nagiba od 11° do 15°) -	1. Kit	0,6		99	35	21,2	9	7,5		49	32				81	0,4		1,7	0,9
				nagib ujednacen. Nadmorska visina 375 do 400m. Ekspozicija 1 istok -	2. SrLip	0,4			19	15,8	7	12,5		91	7				97	1,2		9,2	0,5
				jugoistok. Ne postoji ugroženost od erozije - stablian teren u prirodnim	3. Brk				8	8,1	9	17,5	16	42					59	1,4	3,9	8,1	
				uslovima. Mrtvi pokrivac slabo zastupljen - povoljan proces humifikacije.								22,5	6	29					36	1,4	2,5	10,8	
				Gusta prizemna vegetacija. Gusto žbunje. Jaka zakorovljenost. tip šume								27,5	42	39					81	4,8	22,9	21,6	
				kitnjaka i graba sa klokocikom (Querco-Carpinetum staphyletosum) na								32,5	13	7					19	1,6	10,4	4,4	
				kiselom smedem do lesiviranom kiselom smedjem zemljištu..								37,5	7	39					46	5,0	7,0	43,3	
												42,5	6						6	0,9	9,7		
				Izdanacka mešovita šuma kitnjaka (izdanacka šuma kitnjaka i lipe) -								47,5	49						49	8,7	105,8		
				dvospratna (u fazi razgradnje). Ocuvana sastojina. Mešovita sastojina								UKUP.	140	296	39				474	25,5	162,2	99,2	1,4
				(smeša stablimicna) gustog sklopa (0.8 - 0.9). u celini zdravstveno																			
				stanje sastojine je dobro. po kvalitetu malo vredna sastojina (ima do 20%																			
				tehnickog drveta). Srednja ugroženost od insekata. Srednja ugroženost od																			
				fitopatoloških oboljenja-oboljenja lista. srednje negovana sastojina.																			
				Stabla srebrna lipa su zakrivljena i sa srednjim padom precnika (srednja																			
				punodrvnost), sa srednje dugim krošnjama (dužine izmedu 1/3 i 1/2 visine																			
				stabala) i ekscentricnim krošnjama, do 10% oštecenih stabala od insekata																			
				i fitopatoloških obolenja, suvih i suhovrhih stabala ima do 10%,																			
				zdravstveno stanje stabala ove vrste drveca je dobro. Stabla kitnjaka su																			
				zakrivljena i sa srednjim padom precnika (srednja punodrvnost), sa																			
				srednje dugim krošnjama (dužine izmedu 1/3 i 1/2 visine stabala) i																			
				normalno razvijenim krošnjama, do 10% oštecenih stabala od insekata i																			
				fitopatoloških obolenja, suvih i suhovrhih stabala ima do 10%,																			
29	c	60307263	1,08	zdravstveno stanje stabala ove vrste drveca je dobro.																			
				Šuma - nalazi se na strani i na vrlo strmom terenu(nagiba od 16° do	1. Kit	0,4		99	29	19,0	9	7,5	8	190	16	85	39	40	377	1,7	0,2	6,1	0,2
				20°) - nagib valovit. Nadmorska visina 370 do 440m. Ekspozicija 1	2. SrLip	0,4			15	11,9	7	12,5		71		39	23	8	140	1,7		4,5	
				jugoistocna. Ne postoji ugroženost od erozije - stablian teren u	3. OTL	0,2			26	18,1	9	17,5		31					31	0,8		6,4	
				prirodnim uslovima. Mrtvi pokrivac slabo zastupljen - povoljan proces	4. Cjas				9	7,4	10	22,5	31	16	16				62	2,5	11,3	5,2	4,6
				humifikacije. Gusta prizemna vegetacija. Gusto žbunje. Srednja	5. Brk				9	7,7	10	27,5	39	8	8				54	3,2	22,6	3,5	4,1
				zakorovljenost. tip šume kitnjaka i cera (Quercetum petraea-cerris	6. Klen				8	6,7	10	32,5	70		16				86	7,1	60,7		15,5
				pauperum) na kiselim smedim i lesiviranim kiselim smedjim zemljištima..								37,5	15	8					23	2,5	18,2	7,7	
												42,5		16	16				32	4,5		23,8	23,9
				Izdanacka mešovita šuma kitnjaka (izdanacka šuma kitnjaka i lipe) -								52,5		16					16	3,5		37,1	
				jednodobna (u fazi razgradnje). Ocuvana sastojina. Mešovita sastojina								UKUP.	162	355	71	124	62	47	821	27,4	113,0	94,3	48,4
				(smeša stablimicna) gustog sklopa (0.8 - 0.9). u celini zdravstveno																			
				stanje sastojine je osrednje. po kvalitetu malo vredna sastojina (ima do																			
				20% tehnickog drveta). Srednja ugroženost od insekata. Srednja ugroženost																			
				od fitopatoloških oboljenja-oboljenja lista. srednje negovana sastojina.																			
				Stabla srebrna lipa su zakrivljena i sa velikim padom precnika (mala																			
				punodrvnost), sa dugim krošnjama (dužine izmedu 1/2 i 2/3 visine stabala)																			
				i ekscentricnim krošnjama, do 10% oštecenih stabala od insekata i																			
				fitopatoloških obolenja, suvih i suhovrhih stabala ima do 10%,																			
				zdravstveno stanje stabala ove vrste drveca je dobro. Stabla kitnjaka su																			
				zakrivljena i sa srednjim padom precnika (srednja punodrvnost), sa																			
				srednje dugim krošnjama (dužine izmedu 1/3 i 1/2 visine stabala) i																			
				normalno razvijenim krošnjama, do 10% oštecenih stabala od insekata i																			
				fitopatoloških obolenja, suvih i suhovrhih stabala ima do 10%,																			
29	d	60307465	1,99	zdravstveno stanje stabala ove vrste drveca je dobro.																			

ОПИС СТАНИШТА И САСТОЈИНА

Ozn.mesta		gazdi-	površ-	OPIS	Osnovni taksacioni elementi						visi	deb.	Broj stabala po hektaru							G	Zapremina po		
ode-	od-	nska	ina		vrsta	sme	obr	sta-	sred.stablo		nski			Vrsta drveta						po		Vrsta drv	
ljenje	sek	klasa	ha		drveća	sa	ast	rost	Ds	Hs	step.	st.	1	2	3	4	5	6	svg.	ha	1	2	3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
				Put.																			
29	1	59	0,03																				

Ozn.mesta		gazdi-	površ-	OPIS	Osnovni taksacioni elementi						visi	deb.	Broj stabala po hektaru							G	Zapremina po		
ode-	od-	nska	ina		vrsta	sme	obr	sta-	sred.stablo		nski			Vrsta drveta						po		Vrsta drv	
ljenje	sek	klasa	ha		drveća	sa	ast	rost	Ds	Hs	step.	st.	1	2	3	4	5	6	svg.	ha	1	2	3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
				Šuma - nalazi se na strani i na strmom terenu (nagiba od 11° do 15°) -	1. SrLip	0,5		91	30	20,5	7	7,5	46	40			8	6	100	0,4	1,1	0,9	
				nagib ujednacen. Nadmorska visina 250 do 355m. Ekspozicija 1 sever -	2. Bk	0,3			26	19,3	10	12,5	14	3					16	0,2	1,1	0,2	
				severoistok. Mrtvi pokrivac srednje zastupljen - povoljan proces	3. Kit	0,2			41	22,6	9	17,5	5	3					8	0,2	1,1	0,5	
				humifikacije. Srednje gusta prizemna vegetacija. Srednje gusto žbunje.	4. Gr				34	19,7	9	22,5	8			3			11	0,4	2,5		
				Nema zakorovljenosti. tip šume bukve i kitnjaka (Querco-Fagetum typicum)	5. OTL				20	12,4	9	27,5	5	5	5	3			19	1,1	3,2	3,6	3,0
				na kiselom smedem i lesiviranom kiselom smedjem zemljištu..	6. KrLip				18	10,8	7	32,5	6	8	8				22	1,8	4,7	7,0	7,0
												37,5	16	8	8	3		3	38	4,2	18,1	10,3	9,9
				Izdanacka mešovita šuma lipa - jednodobna (u fazi razgradnje).								42,5	19	8	5				33	4,6	28,1	13,1	9,7
				Razredjena sastojina. Mešovita sastojina (smeša stablimicna) nepotpunog								47,5	8	8	11	3			31	5,4	15,6	20,2	25,9
				sklopa (0.5-0.6). u celini zdravstveno stanje sastojine je osrednje. po								52,5	22	8	5				36	7,7	52,2	22,6	15,3
				kvalitetu malo vredna sastojina (ima do 20% tehnickog drveta). Srednja								57,5	6	3			3		11	2,8	16,1	9,2	
				ugroženost od insekata. Srednja ugroženost od vetra. pogrešno negovana								62,5	5	3					8	2,4	18,2	11,2	
				sastojina. Stabla srebrna lipa su zakrivljena i sa srednjim padom								67,5	3						3	1,0	10,5		
				precnika (srednja punodrvnost), sa srednje dugim krošnjama (dužine izmedu								UKUP.	164	96	43	11	11	9	334	32,4	172,5	98,7	70,8
				1/3 i 1/2 visine stabala) i ekscentricnim krošnjama, od 11-25% oštecenih																			
				stabala od guljenja kore, suvih i sihovrhih stabala ima od 11-25%,																			
				zdravstveno stanje stabala ove vrste drveca je osrednje. Stabla kitnjaka																			
				su zakrivljena i sa srednjim padom precnika (srednja punodrvnost), sa																			
				srednje dugim krošnjama (dužine izmedu 1/3 i 1/2 visine stabala) i																			
				normalno razvijenim krošnjama, do 10% oštecenih stabala od insekata i																			
				fitopatoloških obolenja, suvih i suhovrhih stabala ima do 10%,																			
				zdravstveno stanje stabala ove vrste drveca je dobro. Stabla bukve su																			
				zakrivljena i sa srednjim padom precnika (srednja punodrvnost), sa																			
				srednje dugim krošnjama (dužine izmedu 1/3 i 1/2 visine stabala) i																			
				normalno razvijenim krošnjama, do 10% oštecenih stabala od insekata i																			
				fitopatoloških obolenja, suvih i suhovrhih stabala ima do 10%,																			
30	a	60288602	5,75	zdravstveno stanje stabala ove vrste drveca je dobro.																			
				Šuma - nalazi se na strani i na vrlo strmom terenu(nagiba od 16° do	1. SrLip	0,6		91	18	10,0	15	7,5	267	8		25	17	33	350	1,5	3,3	0,2	
				20°) - nagib ujednacen. Nadmorska visina 310 do 370m. Ekspozicija 1	2. Kit	0,1			26	11,6	16	12,5	42	8		25			75	0,9	2,4	0,7	
				južna. Mrtvi pokrivac srednje zastupljen - povoljan proces humifikacije.	3. Gr	0,1			36	13,2	16	17,5	42	8	8	17	8		83	2,0	4,5	1,0	0,9
				Srednje gusta prizemna vegetacija. Srednje gusto žbunje. Nema	4. Cjas	0,1			17	9,5	16	22,5	67			8	17		92	3,6	14,9		
				zakorovljenosti. tip šume razlicitih hrastova sa crnim jasenom	5. Klen	0,1			22	10,8	16	27,5	67	8	8	17			100	5,9	21,8	2,7	2,6
				(Orno-Polyquercetum) na slabo razvijenim zemljištima na krecnjacima i	6. OTL				13	7,4	16	32,5	75	17		8	8	8	117	9,7	37,2	10,0	
				bazicnim silikatnim stenama..								37,5	17						17	1,8	12,0		
												42,5	8				8		17	2,4	7,4		
				Izdanacka mešovita šuma lipa - jednodobna (u fazi razgradnje).								47,5	8						8	1,5	11,4		
				Razredjena sastojina. Mešovita sastojina (smeša stablimicna) nepotpunog								52,5		8					8	1,8		15,7	
				sklopa (0.5-0.6). u celini zdravstveno stanje sastojine je osrednje. po								62,5			8				8	2,6			18,3
				kvalitetu malo vredna sastojina (ima do 20% tehnickog drveta). Srednja								UKUP.	592	58	25	100	58	42	875	33,8	114,9	30,3	21,8
				ugroženost od insekata. Srednja ugroženost od fitopatoloških																			
				oboljenja-oboljenja kore. pogrešno negovana sastojina. Stabla srebrna																			
				lipa su zakrivljena i sa velikim padom precnika (mala punodrvnost), sa																			
				srednje dugim krošnjama (dužine izmedu 1/3 i 1/2 visine stabala) i																			
				ekscentricnim krošnjama, od 11-25% oštecenih stabala od guljenja kore,																			
				suvih i sihovrhih stabala ima od 11-25%, zdravstveno stanje stabala ove																			
				vrste drveca je osrednje. Stabla kitnjaka su zakrivljena i sa srednjim																			
				padom precnika (srednja punodrvnost), sa srednje dugim krošnjama (dužine																			
				izmedu 1/3 i 1/2 visine stabala) i normalno razvijenim krošnjama, od																			

ОПИС СТАНИШТА И САСТОЈИНА

Ozn.mesta		gazdi-	površ-	OPIS	Osnovni taksacioni elementi						visi	deb.	Broj stabala po hektaru							G	Zapremina po		
ode-	od-	nska	ina		vrsta	sme	obr	sta-	sred.stablo		nski			Vrsta drveta						po		Vrsta drv	
ljenje	sek	klasa	ha		drveća	sa	ast	rost	Ds	Hs	step.	st.	1	2	3	4	5	6	svg.	ha	1	2	3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
				11-25% oštecenih stabala od insekata i fitopatoloških obolenja, suvih i																			
				sihovrhih stabala ima od 11-25%, zdravstveno stanje stabala ove vrste																			
30	b	60288371	2,29	drveca je osrednje.																			

Ozn.mesta		gazdi-	površ-	OPIS	Osnovni taksacioni elementi						visi	deb.	Broj stabala po hektaru							G	Zapremina po		
ode-	od-	nska	ina		vrsta	sme	obr	sta-	sred.stablo		nski			Vrsta drveta						po		Vrsta drv	
ljenje	sek	klasa	ha		drveća	sa	ast	rost	Ds	Hs	step.	st.	1	2	3	4	5	6	svg.	ha	1	2	3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
				Šuma - nalazi se na strani i na vrlo strmom terenu(nagiba od 16° do	1. Kit	0,4		37	39	11,7	6	12,5	15	33	173	105	40	33	398	4,9	0,9	1,7	7,3
				20°) - nagib ujednacen. Nadmorska visina 30 do 360m. Ekspozicija 1	2. CB	0,4			21	9,8	20	17,5		75	10	5			90	2,2		9,7	1,1
				južna. Mrtvi pokrivac srednje zastupljen - povoljan proces humifikacije.	3. SrLip	0,1			13	8,0	14	22,5		58	5				63	2,5		12,3	1,0
				Gusta prizemna vegetacija. Gusto žbunje. Nema zakorovljenosti. tip šume	4. Bag				13	8,3	20	27,5		48					48	2,8		20,1	
				razlicitih hrastova sa crnim jasenom (Orno-Polyquercetum) na slabo	5. Cjas				13	7,9	16	32,5		5					5	0,4		2,6	
				razvijenim zemljištima na krecnjacima i bazicnim silikatnim stenama..	6. OTL				13	7,6	6	117,5	5						5	5,4	43,1		
												UKUP.	20	218	188	110	40	33	608	18,2	44,0	46,4	9,5
				Veštacki podignuta mešovita sastojina crnog bora - jednodobna (podmladak																			
				u kasnom periodu - dobro obraslo). Ocuvana sastojina. Mešovita sastojina																			
				(smeša stablimicna) vrlo gustog sklopa (1.0). u celini zdravstveno stanje																			
				sastojine je osrednje. po kvalitetu malo vredna sastojina (ima do 20%																			
				tehnickog drveta). Srednja ugroženost od fitopatoloških																			
				oboljenja-oboljenja kore. Srednja ugroženost od drugih štetnih uticaja.																			
				pogrešno negovana sastojina. Stabla crni bor su zakrivljena i sa																			
				srednjim padom precnika (srednja punodrvnost), sa srednje dugim krošnjama																			
				(dužine izmedu 1/3 i 1/2 visine stabala) i uskim krošnjama, do 10%																			
				oštecenih stabala od fitopatoloških obolenja, zdravstveno stanje stabala																			
				ove vrste drveca je osrednje. Stabla bagrema su zakrivljena i sa srednjim																			
				padom precnika (srednja punodrvnost), sa srednje dugim krošnjama (dužine																			
				izmedu 1/3 i 1/2 visine stabala) i uskim krošnjama, do 10% oštecenih																			
				stabala od insekata i fitopatoloških obolenja, zdravstveno stanje																			
30	c	60476371	1,16	stabala ove vrste drveca je dobro.																			
				Šuma - nalazi se na grebenu i na vrlo strmom terenu (nagiba od 21° do	1. SrLip	0,9		91	24	18,3	7	7,5	100	36	20				156	0,7	2,9	0,9	0,9
				25°) - nagib ujednacen. Nadmorska visina 265 do 360m. Ekspozicija 1	2. Bk				11	9,5	12	12,5	40		60				100	1,2	3,5		4,8
				severoistok. Mrtvi pokrivac srednje zastupljen - povoljan proces	3. Cjas				13	11,1	9	17,5	38		30				68	1,6	7,9		5,3
				humifikacije. Retka prizemna vegetacija. Retko žbunje. Nema								22,5	124						124	4,9	44,1		
				zakorovljenosti. tip šume razlicitih hrastova sa crnim jasenom								27,5	92						92	5,5	49,5		
				(Orno-Polyquercetum) na slabo razvijenim zemljištima na krecnjacima i								32,5	100						100	8,3	77,0		
				bazicnim silikatnim stenama..								37,5	54						54	6,0	61,2		
												42,5	14	4					18	2,6	20,8	6,9	
				Izdanacka mešovita šuma lipa - jednodobna (u fazi razgradnje). Ocuvana								47,5	18						18	3,2	32,7		
				sastojina. Mešovita sastojina (smeša stablimicna) gustog sklopa (0.8 -								UKUP.	580	40	110				730	33,9	299,5	7,8	11,0
				0.9). u celini zdravstveno stanje sastojine je osrednje. po kvalitetu																			
				malo vredna sastojina (ima do 20% tehnickog drveta). Srednja ugroženost																			
				od insekata. Srednja ugroženost od fitopatoloških oboljenja-oboljenja																			
				lista. srednje negovana sastojina. Stabla srebrna lipa su zakrivljena i																			
				sa velikim padom precnika (mala punodrvnost), sa dugim krošnjama (dužine																			
				izmedu 1/2 i 2/3 visine stabala) i ekscentricnim krošnjama, od 11-25%																			
				oštecenih stabala od insekata i fitopatoloških obolenja, suvih i																			
				sihovrhih stabala ima od 11-25%, zdravstveno stanje stabala ove vrste																			
				drveca je osrednje. Stabla bukve su zakrivljena i sa velikim padom																			
				precnika (mala punodrvnost), sa dugim krošnjama (dužine izmedu 1/2 i 2/3																			
				visine stabala) i ekscentricnim krošnjama, zdravstveno stanje stabala																			
30	d	60288371	2,52	ove vrste drveca je osrednje.																			
				Šuma - nalazi se na strani i na vrlo strmom terenu(nagiba od 16° do	1. SrLip	0,7		91	34	19,4	9	7,5	44		60		16		119	0,5	0,8		1,2
				20°) - nagib ujednacen. Nadmorska visina 270 do 325m. Ekspozicija 1	2. Kit	0,3			43	21,1	11	12,5	16						16	0,2	0,8		
				istok - severoistok. Mrtvi pokrivac srednje zastupljen - povoljan proces	3. Bk	0,1			14	11,6	12	17,5			6	16			22	0,5			0,8
				humifikacije. Retka prizemna vegetacija. Retko žbunje. Nema	4. Gr				18	13,4	9	22,5	6						6	0,2	1,7		

ОПИС СТАНИШТА И САСТОЈИНА

Ozn.mesta		gazdi-	površ-	OPIS	Osnovni taksacioni elementi						visi	deb.	Broj stabala po hektaru							G	Zapremina po		
ode-	od-	nska	ina		vrsta	sme	obr	sta-	sred.stablo		nski			Vrsta drveta						po		Vrsta drv	
ljenje	sek	klasa	ha		drveća	sa	ast	rost	Ds	Hs	step.	st.	1	2	3	4	5	6	svg.	ha	1	2	3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
				zakorovljenosti. tip šume kitnjaka i graba sa klokocikom	5. Tre				8	7,6	17	27,5	13						13	0,7	5,4		
				(Querco-Carpinetum staphyletosum) na kiselom smedem do lesiviranom								32,5	13	16					28	2,3	8,8	14,4	
				kiselom smedjem zemljištu..								37,5	60	6	16				82	9,0	62,8	8,0	20,4
												42,5	16	6					22	3,1	20,2	9,6	
				Izdanacka mešovita šuma lipa - jednodobna (u fazi razgradnje). Ocuvana								47,5	25	16					41	7,2	44,2	28,2	
				sastojina. Mešovita sastojina (smeša stablimicna) potpunog sklopa (0.7).								52,5	6	16					22	4,7	12,6	39,2	
				u celini zdravstveno stanje sastojine je osrednje. po kvalitetu malo								57,5	35						35	9,0	89,6		
				vredna sastojina (ima do 20% tehnickog drveta). Srednja ugroženost od								UKUP.	232	60	82	16	16		405	37,6	246,8	99,5	22,4
				insekata. Srednja ugroženost od vetra. srednje negovana sastojina.																			
				Stabla srebrna lipa su zakrivljena i sa velikim padom precnika (mala																			
				punodrvnost), sa dugim krošnjama (dužine izmedu 1/2 i 2/3 visine stabala)																			
				i ekscentricnim krošnjama, od 11-25% oštecenih stabala od vetra, snega i																			
				leda, od 11-25% oštecenih stabala od guljenja kore, suvih i sihovrhih																			
				stabala ima od 11-25%, zdravstveno stanje stabala ove vrste drveca je																			
30	e	60288263	0,90	osrednje.																			

Ozn.mesta		gazdi-	površ-	OPIS	Osnovni taksacioni elementi						visi	deb.	Broj stabala po hektaru							G	Zapremina po		
					vrsta	sme	obr	sta-	sred.stablo		nski			Vrsta drveta						po		Vrsta drv	
ode-	od-	nska	ina		drveća	sa	ast	rost	Ds	Hs	step.	st.	1	2	3	4	5	6	svg.	ha	1	2	3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
				Šuma - nalazi se na strani i na srednje strmom terenu (nagiba od 6° do	1. Kit	0,3		91	38	20,3	11	7,5		17	33		32	83	164	0,7		0,2	0,5
				10°) - nagib ujednacen. Nadmorska visina 260 do 285m. Ekspozicija 1	2. Klen	0,2			20	14,8	11	12,5		17	16			33	66	0,8		1,5	1,7
				istok - severoistok. Mrtvi pokrivac srednje zastupljen - povoljan proces	3. SrLip	0,2			21	15,7	9	17,5		33		33		17	82	2,0		4,6	
				humifikacije. Srednje gusta prizemna vegetacija. Retko žbunje. Nema	4. Gr	0,2			24	17,5	9	22,5		50		33	16	17	115	4,6		15,8	
				zakorovljenosti. tip šume kitnjaka i graba sa klokocikom	5. Bk	0,1			22	16,1	12	27,5	16	17	33	17		17	98	5,8	8,4	7,7	14,6
				(Querco-Carpinetum staphyletosum) na kiselom smedem do lesiviranom	6. Bag	0,1			13	12,0	15	32,5		17	32		16		65	5,4		10,7	24,4
				kiselom smedjem zemljištu..								37,5	32			17	16		65	7,2	36,6		
												47,5	16						16	2,9	33,8		
				Izdanacka mešovita šuma kitnjaka (izdanacka šuma kitnjaka, bukve i lipe)								UKUP.	65	149	114	99	81	165	672	29,4	78,8	40,6	41,2
				- jednodobna (u fazi razgradnje). Ocuvana sastojina. Mešovita sastojina																			
				(smeša stablimicna) gustog sklopa (0.8 - 0.9). u celini zdravstveno																			
				stanje sastojine je osrednje. po kvalitetu malo vredna sastojina (ima do																			
				20% tehnickog drveta). Srednja ugroženost od insekata. Srednja ugroženost																			
				od fitopatoloških oboljenja-oboljenja lista. srednje negovana sastojina.																			
				Stabla srebrna lipa su zakrivljena i sa srednjim padom precnika (srednja																			
				punodrvnost), sa dugim krošnjama (dužine izmedu 1/2 i 2/3 visine stabala)																			
				i ekscentricnim krošnjama, od 11-25% oštecenih stabala od guljenja kore,																			
				suvih i sihovrhih stabala ima od 11-25%, zdravstveno stanje stabala ove																			
				vrste drveca je osrednje. Stabla kitnjaka su zakrivljena i sa srednjim																			
				padom precnika (srednja punodrvnost), sa dugim krošnjama (dužine izmedu																			
				1/2 i 2/3 visine stabala) i ekscentricnim krošnjama, od 11-25% oštecenih																			
				stabala od insekata i fitopatoloških obolenja, suvih i sihovrhih stabala																			
30	f	60307263	1,39	ima od 11-25%, zdravstveno stanje stabala ove vrste drveca je osrednje.																			
				Šuma - nalazi se na strani i na srednje strmom terenu (nagiba od 6° do	1. Borvc	0,6		37	22	18,1	7	12,5	50			49	25		123	1,5	3,9		
				10°) - nagib ujednacen. Nadmorska visina 260 do 290m. Ekspozicija 1	2. SrLip	0,2			24	18,6	7	17,5	49	49		24			122	2,9	8,4	11,5	
				istocna. Mrtvi pokrivac srednje zastupljen - povoljan proces	3. Kit	0,2			48	22,8	1	22,5	223						223	8,9	69,6		
				humifikacije. Gusta prizemna vegetacija. Retko žbunje. Nema	4. Cjas				14	14,7	9	27,5	98	73					171	10,2	58,8	33,6	
				zakorovljenosti. tip šume kitnjaka i graba sa klokocikom	5. CB				13	13,6	7	47,5			24				24	4,3			47,2
				(Querco-Carpinetum staphyletosum) na kiselom smedem do lesiviranom								UKUP.	420	121	24	73	25		663	27,8	140,7	45,1	47,2
				kiselom smedjem zemljištu..																			
				Veštacki podignuta sastojina ostalih cetinara - jednodobna (srednjedobna)																			
				sastojina. Ocuvana sastojina. Mešovita sastojina (smeša stablimicna) vrlo																			
				gustog sklopa (1.0). u celini zdravstveno stanje sastojine je dobro. po																			
				kvalitetu srednjevredna sastojina (ima od 21-40% tehnickog drveta). Jaka																			
				ugroženost od insekata. Srednja ugroženost od vetra. srednje negovana																			
				sastojina. Stabla borovaca su prava i sa srednjim padom precnika																			
				(srednja punodrvnost), sa kratkim krošnjama (dužine izmedu 1/4 i1/3																			
				visine stabala) i uskim krošnjama, suvih i suhovrhih stabala ima do 10%,																			
30	g	60479263	0,91	zdravstveno stanje stabala ove vrste drveca je dobro.																			
				Šuma - nalazi se na strani i na srednje strmom terenu (nagiba od 6° do	1. CB	0,7		38	22	15,8	9	12,5	56	88	41	25	7	8	224	2,8	3,4	6,6	2,6
				10°) - nagib ujednacen. Nadmorska visina 240 do 270m. Ekspozicija 1	2. SrLip	0,1			15	11,6	9	17,5	101	56	17	8			182	4,4	17,8	8,4	2,9
				istok - severoistok. Mrtvi pokrivac srednje zastupljen - povoljan proces	3. OTL	0,1			18	13,1	2	22,5	93	16	8				117	4,6	31,7	5,0	3,3
				humifikacije. Gusta prizemna vegetacija. Retko žbunje. Nema	4. Tre	0,1			18	13,1	6	27,5	57		17				74	4,4	31,1		9,0
				zakorovljenosti. tip šume kitnjaka i graba sa klokocikom	5. Klen				13	10,3	11	32,5	41			8			49	4,1	33,5		
				(Querco-Carpinetum staphyletosum) na kiselom smedem do lesiviranom	6. Gr				13	10,3	11	37,5	8						8	0,9	8,5		
				kiselom smedjem zemljištu..								UKUP.	356	161	82	41	7	8	655	21,1	126,1	20,1	17,7

ОПИС СТАНИШТА И САСТОЈИНА

Ozn.mesta		gazdi-	površ-	OPIS	Osnovni taksacioni elementi						visi	deb.	Broj stabala po hektaru							G	Zapremina po		
ode-	od-	nska	ina		vrsta	sme	obr	sta-	sred.stablo		nski			Vrsta drveta						po		Vrsta drv	
ljenje	sek	klasa	ha		drveća	sa	ast	rost	Ds	Hs	step.	st.	1	2	3	4	5	6	svg.	ha	1	2	3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
				Veštacki podignuta sastojina crnog bora - jednodobna (srednjedobna)																			
				sastojina. Ocuvana sastojina. Mešovita sastojina (smeša stablimicna) vrlo																			
				gustog sklopa (1.0). u celini zdravstveno stanje sastojine je osrednje.																			
				po kvalitetu srednjevredna sastojina (ima od 21-40% tehnickog drveta).																			
				Srednja ugroženost od insekata. Srednja ugroženost od požara. dobro																			
				negovana sastojina. Stabla crni bor su prava i sa srednjim padom																			
				precnika (srednja punodrvnost), sa kratkim krošnjama (dužine izmedu 1/4																			
				i1/3 visine stabala) i uskim krošnjama, do 10% oštecenih stabala od																			
				požara, suvih i suhovrhih stabala ima do 10%, zdravstveno stanje stabala																			
30	h	60475263	2,54	ove vrste drveca je osrednje.																			

ОПИС СТАНИШТА И САСТОЈИНА

Ozn.mesta		gazdi-	površ-	OPIS	Osnovni taksacioni elementi						visi	deb.	Broj stabala po hektaru							G	Zapremina po		
ode-	od-	nska	ina		vrsta	sme	obr	sta-	sred.stablo		nski			Vrsta drveta						po		Vrsta drv	
ljenje	sek	klasa	ha		drveća	sa	ast	rost	Ds	Hs	step.	st.	1	2	3	4	5	6	svg.	ha	1	2	3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
				Šuma - nalazi se u depresiji i na blago nagnutom terenu (nagiba do 5°)	1. Smr	0,7		37	21	18,3	8	12,5	50		98				148	1,8	5,2		9,5
				- nagib ujednacen. Nadmorska visina 250 do 265m. Ekspozicija 1 bez	2. CB	0,1			25	19,6	2	17,5	100		25	49			173	4,2	22,6		5,7
				jasno izražene ekspozicije. Mrtvi pokrivac srednje zastupljen - povoljan	3. Klen	0,1			14	12,1	8	22,5		25					25	1,0		9,2	
				proces humifikacije. Gusta prizemna vegetacija. Retko žbunje. Nema	4. OTL	0,1			18	15,2	1	27,5	124	25					149	8,8	81,2	12,8	
				zakorovljenosti. tip šume kitnjaka i graba sa klokocikom								UKUP.	274	49	123	49			495	15,8	108,9	21,9	15,2
				(Querco-Carpinetum staphyletosum) na kiselom smedem do lesiviranom																			
				kiselom smedjem zemljištu..																			
				Veštacki podignuta sastojina smrce - jednodobna (mladik u kasnom																			
				periodu). Ocuvana sastojina. Mešovita sastojina (smeša stablimicna)																			
				gustog sklopa (0.8 - 0.9). u celini zdravstveno stanje sastojine je																			
				dobro. po kvalitetu srednjevredna sastojina (ima od 21-40% tehnickog																			
				drveta). Srednja ugroženost od insekata. Srednja ugroženost od																			
				fitopatoloških oboljenja-oboljenja korena. dobro negovana sastojina.																			
				Stabla smrce su prava i sa srednjim padom precnika (srednja punodrvnost),																			
				sa kratkim krošnjama (dužine izmedu 1/4 i1/3 visine stabala) i uskim																			
				krošnjama, suvih i suhovrhih stabala ima do 10%, zdravstveno stanje																			
30	i	60470263	0,16	stabala ove vrste drveca je dobro.																			
				Šuma - nalazi se u dolini i na blago nagnutom terenu (nagiba do 5°) -	1. CB	1,0		38	21	15,1	10	12,5	92	3					96	1,2	5,5	0,2	
				nagib ujednacen. Nadmorska visina 240 do 285m. Ekspozicija 1 bez jasno	2. Smr				15	12,4	14	17,5	148	3	3				155	3,7	21,5	0,7	0,5
				izražene ekspozicije. Mrtvi pokrivac srednje zastupljen - povoljan proces	3. Klen				18	13,7	11	22,5	155						155	6,2	47,0		
				humifikacije. Gusta prizemna vegetacija. Gusto žbunje. Nema								27,5	71						71	4,2	39,4		
				zakorovljenosti. tip šume kitnjaka i graba sa klokocikom								32,5	7						7	0,5	5,2		
				(Querco-Carpinetum staphyletosum) na kiselom smedem do lesiviranom								37,5	10						10	1,1	12,7		
				kiselom smedjem zemljištu..								42,5	3						3	0,5	4,7		
												82,5	3						3	1,8	27,1		
				Veštacki podignuta sastojina crnog bora - jednodobna (srednjedobna)								UKUP.	490	7	3				500	19,1	163,0	0,9	0,5
				sastojina. Ocuvana sastojina. Cista sastojina (smeša stablimicna) vrlo																			
				gustog sklopa (1.0). u celini zdravstveno stanje sastojine je dobro. po																			
				kvalitetu srednjevredna sastojina (ima od 21-40% tehnickog drveta).																			
				Srednja ugroženost od insekata. Srednja ugroženost od požara. dobro																			
				negovana sastojina. Stabla crni bor su prava i sa srednjim padom																			
				precnika (srednja punodrvnost), sa kratkim krošnjama (dužine izmedu 1/4																			
				i1/3 visine stabala) i uskim krošnjama, suvih i suhovrhih stabala ima do																			
30	j	60475263	2,07	10%, zdravstveno stanje stabala ove vrste drveca je dobro.																			
				Šuma - nalazi se na strani i na srednje strmom terenu (nagiba od 6° do	1. SrLip	0,9		40	26	15,3	10	7,5	75						75	0,3	1,8		
				10°) - nagib ujednacen. Nadmorska visina 275 do 290m. Ekspozicija 1	2. Cer	0,1			38	18,9	11	12,5	25						25	0,3	2,6		
				istocna. Mrtvi pokrivac slabo zastupljen - povoljan proces humifikacije.	3. Gr				18	11,6	12	17,5			25				25	0,6			3,1
				Retka prizemna vegetacija. Srednje gusto žbunje. Nema zakorovljenosti.								22,5	50						50	2,0	13,7		
				tip šume kitnjaka i graba sa klokocikom (Querco-Carpinetum staphyletosum)								27,5	75						75	4,5	30,9		
				na kiselom smedem do lesiviranom kiselom smedjem zemljištu..								32,5	25						25	2,1	18,6		
												37,5	100	25					125	13,8	100,3	26,5	
				Izdanacka mešovita šuma lipa - jednodobna (u optimalnoj fazi). Ocuvana								42,5	25						25	3,5	32,5		
				sastojina. Mešovita sastojina (smeša i grupimicna i stablimicna) vrlo								UKUP.	375	25	25				425	27,1	200,5	26,5	3,1
				gustog sklopa (1.0). u celini zdravstveno stanje sastojine je osrednje.																			
				po kvalitetu malo vredna sastojina (ima do 20% tehnickog drveta). Srednja																			
				ugroženost od insekata. Srednja ugroženost od drugih štetnih uticaja.																			
				nenegovana sastojina. 0. Stabla srebrna lipa su zakrivljena i sa																			

Ozn.mesta		gazdi-	površ-	OPIS	Osnovni taksacioni elementi						visi	deb.	Broj stabala po hektaru							G	Zapremina po		
ode-	od-	nska	ina		vrsta	sme	obr	sta-	sred.stablo		nski			Vrsta drveta						po		Vrsta drv	
ljenje	sek	klasa	ha		drveća	sa	ast	rost	Ds	Hs	step.	st.	1	2	3	4	5	6	svg.	ha	1	2	3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
				velikim padom precnika (mala punodrvnost), sa dugim krošnjama (dužine																			
				izmedu 1/2 i 2/3 visine stabala) i ekscentricnim krošnjama, do 10%																			
				oštecenih stabala od vetra, snega i leda, suvih i suhovrhih stabala ima																			
30	k	60288263	0,22	do 10%, zdravstveno stanje stabala ove vrste drveca je dobro.																			
				Šuma - nalazi se na strani i na srednje strmom terenu (nagiba od 6° do	1. CB	0,8		37	20	14,5	12	12,5	80	60	10				150	1,8	5,1	4,2	1,0
				10°) - nagib ujednacen. Nadmorska visina 270 do 290m. Ekspozicija 1	2. SrLip	0,1			16	13,4	10	17,5	110	10					120	2,9	18,5	1,4	
				istocna. Mrtvi pokrivac slabo zastupljen - povoljan proces humifikacije.	3. Cjas				13	11,9	12	22,5	130						130	5,2	34,4		
				Retka prizemna vegetacija. Srednje gusto žbunje. Nema zakorovljenosti.								27,5	35						35	2,1	15,4		
				tip šume kitnjaka i graba sa klokocikom (Querco-Carpinetum staphyletosum)								32,5	25						25	2,1	16,5		
				na kiselom smedem do lesiviranom kiselom smedjem zemljištu..								37,5		10					10	1,1		9,7	
												UKUP.	380	80	10				470	15,1	89,9	15,3	1,0
				Veštacki podignuta sastojina crnog bora - jednodobna (mladik u kasnom																			
				periodu). Ocuvana sastojina. Mešovita sastojina (smeša stablimicna)																			
				gustog sklopa (0.8 - 0.9). u celini zdravstveno stanje sastojine je																			
				osrednje. po kvalitetu srednjevredna sastojina (ima od 21-40% tehnickog																			
				drveta). Srednja ugroženost od insekata. Srednja ugroženost od požara.																			
				srednje negovana sastojina. Stabla crni bor su prava i sa velikim padom																			
				precnika (mala punodrvnost), sa kratkim krošnjama (dužine izmedu 1/4 i1/3																			
				visine stabala) i uskim krošnjama, suvih i suhovrhih stabala ima do 10%,																			
30	l	60475263	0,10	zdravstveno stanje stabala ove vrste drveca je dobro.																			

ОПИС СТАНИШТА И САСТОЈИНА

Ozn.mesta		gazdi-	površ-	OPIS	Osnovni taksacioni elementi						visi	deb.	Broj stabala po hektaru							G	Zapremina po		
ode-	od-	nska	ina		vrsta	sme	obr	sta-	sred.stablo		nski			Vrsta drveta						po		Vrsta drv	
ljenje	sek	klasa	ha		drveća	sa	ast	rost	Ds	Hs	step.	st.	1	2	3	4	5	6	svg.	ha	1	2	3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
				Šuma - nalazi se na strani i na srednje strmom terenu (nagiba od 6° do	1. Borvc	0,4		37	26	21,8	1	12,5		20					20	0,2		1,7	
				10°) - nagib ujednacen. Nadmorska visina 245 do 250m. Ekspozicija 1	2. Smr	0,4			20	18,1	8	17,5		135	75				210	5,0		31,8	16,1
				istocna. Mrtvi pokrivac srednje zastupljen - povoljan proces	3. CB	0,1			20	17,5	1	22,5	70	70	50				189	7,5	29,9	31,4	18,0
				humifikacije. Retka prizemna vegetacija. Srednje gusto žbunje. Nema								27,5	60	60					120	7,1	38,2	40,4	
				zakorovljenosti. tip šume kitnjaka i graba sa klokocikom								32,5	30						30	2,5	29,7		
				(Querco-Carpinetum staphyletosum) na kiselom smedem do lesiviranom								UKUP.	159	284	125				568	22,4	97,9	105,3	34,1
				kiselom smedjem zemljištu..																			
				Veštacki podignuta sastojina smrce - jednodobna (mladik u kasnom																			
				periodu). Ocuvana sastojina. Mešovita sastojina (smeša stablimicna) vrlo																			
				gustog sklopa (1.0). u celini zdravstveno stanje sastojine je dobro. po																			
				kvalitetu srednjevredna sastojina (ima od 21-40% tehnickog drveta).																			
				Srednja ugroženost od insekata. Srednja ugroženost od fitopatoloških																			
				oboljenja-oboljenja korena. srednje negovana sastojina. Stabla smrce su																			
				prava i sa velikim padom precnika (mala punodrvnost), sa kratkim																			
				krošnjama (dužine izmedu 1/4 i1/3 visine stabala) i uskim krošnjama,																			
				suvih i suhovrhih stabala ima do 10%, zdravstveno stanje stabala ove																			
				vrste drveca je dobro. Stabla borovaca su prava i sa velikim padom																			
				precnika (mala punodrvnost), sa kratkim krošnjama (dužine izmedu 1/4 i1/3																			
				visine stabala) i uskim krošnjama, suvih i suhovrhih stabala ima do 10%,																			
30	m	60470263	0,45	zdravstveno stanje stabala ove vrste drveca je dobro.																			
				Vocnjak.																			
30	1	60	0,24																				
				Kamenolom.																			
30	2	60	0,11																				
				Pašnjak.																			
30	3	60	0,83																				
				Njiva.																			
30	4	60	0,22																				
				Put.																			
30	5	60	0,01																				
				Golet.																			
30	6	60	0,19																				
				Golet.																			

ОПИС СТАНИШТА И САСТОЈИНА

Ozn.mesta		gazdi-	površ-	OPIS	Osnovni taksacioni elementi						visi	deb.	Broj stabala po hektaru							G	Zapremina po		
ode-	od-	nska	ina		vrsta	sme	obr	sta-	sred.stablo		nski			Vrsta drveta						po		Vrsta drv	
ljenje	sek	klasa	ha		drveća	sa	ast	rost	Ds	Hs	step.	st.	1	2	3	4	5	6	svg.	ha	1	2	3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
30	7	60	1,14																				
				Šuma - nalazi se u dolini i na blago nagnutom terenu (nagiba do 5°) -	1. Gr	0,6		80	30	16,0	13	7,5	7		7			7	20	0,1	0,1		0,2
				nagib ujednacen. Nadmorska visina 250 do 290m. Ekspozicija 1 zapadna.	2. Cer	0,2			49	18,2	12	12,5	11		7				18	0,2	0,5		0,5
				Mrtvi pokrivac srednje zastupljen - povoljan proces humifikacije. Gusta	3. Bk	0,2			30	16,1	16	17,5	24					6	29	0,7	3,1		
				prizemna vegetacija. Retko žbunje. Nema zakorovljenosti. tip šume	4. Kit	0,1			33	16,6	13	22,5	12		7		6		25	1,0	3,9		2,0
				kitnjaka, graba i cera (Carpino-Quercetum petraeae-cerris typicum) na	5. OTL				31	16,3	13	27,5	37			11			48	2,9	16,3		
				intervalu zemljišta od pararendzine na lesu i laporcu do lesivirane	6. Klen				12	10,7	13	32,5	33				6		38	3,2	22,5		
				gajnjace ..								37,5	26	7			6		38	4,2	24,5	6,2	
												42,5	32		7	7			45	6,3	37,9		9,0
				Izdanacka mešovita šuma graba - jednodobna (u fazi razgradnje).								47,5	7		13				19	3,4	8,7		24,0
				Razredjena sastojina. Mešovita sastojina (smeša stablimicna) nepotpunog								52,5		7					7	1,4		13,7	
				sklopa (0.5-0.6). u celini zdravstveno stanje sastojine je osrednje. po								57,5		6					6	1,5		14,9	
				kvalitetu malo vredna sastojina (ima do 20% tehnickog drveta). Srednja								UKUP.	188	19	39	18	17	12	293	25,0	117,3	34,8	35,7
				ugroženost od insekata. Mala ugroženost od fitopatoloških																			
				oboljenja-oboljenja kore. nenegovana sastojina. Stabla graba su																			
				zakrivljena i sa srednjim padom precnika (srednja punodrvnost), sa dugim																			
				krošnjama (dužine izmedu 1/2 i 2/3 visine stabala) i preširokim																			
				krošnjama, zdravstveno stanje stabala ove vrste drveca je dobro. Stabla																			
				kitnjaka su zakrivljena i sa srednjim padom precnika (srednja																			
				punodrvnost), sa srednje dugim krošnjama (dužine izmedu 1/3 i 1/2 visine																			
				stabala) i normalno razvijenim krošnjama, do 10% oštecenih stabala od																			
				insekata i fitopatoloških obolenja, zdravstveno stanje stabala ove vrste																			
31	a	60176246	1,37	drveca je osrednje.																			

Ozn.mesta		gazdi-	površ-	OPIS	Osnovni taksacioni elementi						visi	deb.	Broj stabala po hektaru							G	Zapremina po		
ode-	od-	nska	ina		vrsta	sme	obr	sta-	sred.stablo		nski			Vrsta drveta						po		Vrsta drv	
ljenje	sek	klasa	ha		drveća	sa	ast	rost	Ds	Hs	step.	st.	1	2	3	4	5	6	svg.	ha	1	2	3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
				Šuma - nalazi se na ravnom terenu. i na blago nagnutom terenu (nagiba do	1. Bag	0,4		16	10	9,2	17	7,5	699	89		42	117	64	1012	4,5	14,7	1,2	
				5°) - nagib ujednacen. Nadmorska visina 245 do 255m. Ekspozicija 1 bez	2. OTL	0,4			16	11,2	14	12,5	337		47	49			433	5,3	22,6		3,1
				jasno izražene ekspozicije. Mrtvi pokrivac slabo zastupljen - povoljan	3. Smr	0,1			16	9,0	20	17,5	120		13	28			162	3,9	20,2		2,3
				proces humifikacije. Srednje gusta prizemna vegetacija. Gusto žbunje.	4. Jas	0,1			13	11,2	14	22,5	21		13	7			42	1,7	6,2		4,3
				Srednja zakorovljenost. tip šume kitnjaka, graba i cera	5. Gr				8	6,2	13	27,5			7				7	0,4			3,0
				(Carpino-Quercetum petraeae-cerris typicum) na intervalu zemljišta od	6. Klen				8	6,2	13	62,5		7					7	2,1		20,3	
				pararendzine na lesu i laporcu do lesivirane gajnjace ..								82,5		7					7	3,6		40,7	
												UKUP.	1177	103	81	127	117	64	1669	21,4	63,7	62,2	12,8
				Izdanacka mešovita šuma bagrema - jednodobna (u optimalnoj fazi). Ocuvana																				
				sastojina. Mešovita sastojina (smeša stablimicna) gustog sklopa (0.8 -																				
				0.9). u celini zdravstveno stanje sastojine je dobro. po kvalitetu																				
				sastojina bez vrednosti (bez ucešca tehnickog drveta). Srednja ugroženost																				
				od insekata. Srednja ugroženost od fitopatoloških oboljenja-oboljenja																				
				kore. srednje negovana sastojina. Stabla bagrema su prava i sa malim																				
				padom precnika (velika punodrvnost), sa srednje dugim krošnjama (dužine																				
				izmedu 1/3 i 1/2 visine stabala) i uskim krošnjama, do 10% oštecenih																				
				stabala od insekata i fitopatoloških obolenja, zdravstveno stanje																				
31	b	60326246	3,34	stabala ove vrste drveca je dobro.																				
				Šuma - nalazi se na strani i na srednje strmom terenu (nagiba od 6° do	1. Kit	0,5		90	31	19,0	10	7,5		97	23	10	19	23	172	0,8		2,0	0,3
				10°) - nagib ujednacen. Nadmorska visina 305 do 325m. Ekspozicija 1	2. SrLip	0,4			18	12,7	8	12,5		130	23				153	1,9		10,1	2,1
				zapadna. Mrtvi pokrivac slabo zastupljen - povoljan proces humifikacije.	3. Gr	0,1			18	12,5	11	17,5	46	23	23	23	10		125	3,0	8,1	3,5	3,0
				Gusta prizemna vegetacija. Srednje gusto žbunje. Slaba zakorovljenost.	4. OTL				15	10,6	10	22,5			23				23	0,9			9,0
				tip šume kitnjaka (Quercetum montanum typicum) na kiselom smedem i	5. Klen				11	7,8	11	27,5	19		23				42	2,5	10,8		9,8
				lesiviranom kiselom smedjem zemljištu..	6. KrLip				8	5,0	8	32,5	51	19					70	5,8	38,4	12,8	
												37,5	19	10					28	3,1	21,7	10,1	
				Izdanacka mešovita šuma kitnjaka (izdanacka šuma kitnjaka i lipe) -								42,5		23					23	3,3		29,2	
				jednodobna (u fazi razgradnje). Ocuvana sastojina. Mešovita sastojina								47,5		23					23	4,1		42,1	
				(smeša stablimicna) gustog sklopa (0.8 - 0.9). u celini zdravstveno								52,5	23						23	5,0	60,5		
				stanje sastojine je osrednje. po kvalitetu malo vredna sastojina (ima do								UKUP.	158	325	115	33	28	23	682	30,3	139,4	109,8	24,2
				20% tehnickog drveta). Srednja ugroženost od insekata. Srednja ugroženost																				
				od fitopatoloških oboljenja-oboljenja kore. srednje negovana sastojina.																				
				0. Stabla srebrna lipa su zakrivljena i sa srednjim padom precnika																				
				(srednja punodrvnost), sa srednje dugim krošnjama (dužine izmedu 1/3 i																				
				1/2 visine stabala) i ekscentricnim krošnjama, zdravstveno stanje																				
				stabala ove vrste drveca je dobro. Stabla kitnjaka su zakrivljena i sa																				
				srednjim padom precnika (srednja punodrvnost), sa srednje dugim krošnjama																				
				(dužine izmedu 1/3 i 1/2 visine stabala) i ekscentricnim krošnjama, do																				
				10% oštecenih stabala od insekata i fitopatoloških obolenja, zdravstveno																				
31	c	60307482	0,58	stanje stabala ove vrste drveca je osrednje.																				
				Šuma - nalazi se u dolini i na blago nagnutom terenu (nagiba do 5°) -	1. SrLip	0,9		65	26	16,2	9	7,5			48				48	0,2			0,6
				nagib ujednacen. Nadmorska visina 300 do 325m. Ekspozicija 1 zapadna.	2. Tre				28	16,5	15	12,5	25		24				49	0,6	1,9		2,5
				Mrtvi pokrivac slabo zastupljen - povoljan proces humifikacije. Srednje	3. Klen				9	10,2	12	17,5	73						73	1,7	12,2		
				gusta prizemna vegetacija. Srednje gusto žbunje. Nema zakorovljenosti.								22,5	195						195	7,7	61,5		
				tip šume kitnjaka, graba i cera (Carpino-Quercetum petraeae-cerris								27,5	195	24					219	13,0	87,0	14,1	
				typicum) na intervalu zemljišta od pararendzine na lesu i laporcu do								32,5	147						147	12,2	95,6		
				lesivirane gajnjace ..								37,5	25						25	2,7	28,4		
												UKUP.	658	24	72				754	38,2	286,7	14,1	3,1
				Izdanacka šuma lipa - jednodobna (u optimalnoj fazi). Ocuvana sastojina.																				

ОПИС СТАНИШТА И САСТОЈИНА

Ozn.mesta		gazdi-	površ-	OPIS	Osnovni taksacioni elementi						visi	deb.	Broj stabala po hektaru							G	Zapremina po		
ode-	od-	nska	ina		vrsta	sme	obr	sta-	sred.stablo		nski			Vrsta drveta						po		Vrsta drv	
ljenje	sek	klasa	ha		drveća	sa	ast	rost	Ds	Hs	step.	st.	1	2	3	4	5	6	svg.	ha	1	2	3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
				Cista sastojina (smeša stablimicna) potpunog sklopa (0.7). u celini																			
				zdravstveno stanje sastojine je dobro. Srednja ugroženost od insekata.																			
				Mala ugroženost od vetra. srednje negovana sastojina. Stabla srebrna																			
				lipa su zakrivljena i sa srednjim padom precnika (srednja punodrvnost),																			
				sa srednje dugim krošnjama (dužine izmedu 1/3 i 1/2 visine stabala) i																			
				ekscentricnim krošnjama, do 10% oštecenih stabala od vetra, snega i leda,																			
				do 10% oštecenih stabala od insekata, zdravstveno stanje stabala ove																			
31	d	60287246	0,38	vrste drveca je dobro.																			

Ozn.mesta		gazdi-	površ-	OPIS	Osnovni taksacioni elementi						visi	deb.	Broj stabala po hektaru							G	Zapremina po		
ode-	od-	nska	ina		vrsta	sme	obr	sta-	sred.stablo		nski			Vrsta drveta						po		Vrsta drv	
ljenje	sek	klasa	ha		drveća	sa	ast	rost	Ds	Hs	step.	st.	1	2	3	4	5	6	svg.	ha	1	2	3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
				Šuma - nalazi se na strani i na vrlo strmom terenu(nagiba od 16° do	1. Bk	0,4		90	33	19,2	13	7,5	12		8		3	6	29	0,1	0,2		0,3
				20°) - nagib ujednacen. Nadmorska visina 275 do 370m. Ekspozicija 1	2. SrLip	0,3			34	20,6	7	12,5	3				3		6	0,1	0,2		
				severna. Mrtvi pokrivac slabo zastupljen - povoljan proces humifikacije.	3. Gr	0,2			33	19,9	9	17,5	8						8	0,2	1,3		
				Srednje gusta prizemna vegetacija. Srednje gusto žbunje. Slaba	4. Kit	0,1			42	23,7	9	22,5		13	4				17	0,7		3,6	1,1
				zakorovljenost. tip šume bukve i kitnjaka (Querco-Fagetum typicum) na	5. OTL				20	13,0	9	27,5	4	14	11	2	8		39	2,3	2,3	7,7	6,1
				kiselom smedem i lesiviranom kiselom smedjem zemljištu..	6. Cjas				8	4,0	9	32,5	27	16	8	4			54	4,5	22,9	13,0	6,4
												37,5	20	9	23	5			58	6,4	24,6	9,7	26,8
				Izdanacka mešovita šuma bukve (izdanacka šuma bukve i lipe) - jednodobna								42,5	16	11	12				39	5,6	24,8	16,8	17,0
				(u fazi razgradnje). Ocuvana sastojina. Mešovita sastojina (smeša								47,5	19	11	4	4			38	6,8	39,1	22,7	6,7
				stablimicna) potpunog sklopa (0.7). u celini zdravstveno stanje sastojine								52,5				4			4	0,8			
				je dobro. po kvalitetu sastojina bez vrednosti (bez ucešca tehnickog								57,5				2			2	0,5			
				drveta). Srednja ugroženost od insekata. Mala ugroženost od vetra.								UKUP.	108	75	69	20	14	6	292	27,7	115,3	73,3	64,4
				srednje negovana sastojina. Stabla graba su zakrivljena i sa velikim																			
				padom precnika (mala punodrvnost), sa srednje dugim krošnjama (dužine																			
				izmedu 1/3 i 1/2 visine stabala) i ekscentricnim krošnjama, do 10%																			
				oštecenih stabala od vetra, snega i leda, zdravstveno stanje stabala ove																			
				vrste drveca je dobro. Stabla srebrna lipa su zakrivljena i sa srednjim																			
				padom precnika (srednja punodrvnost), sa srednje dugim krošnjama (dužine																			
				izmedu 1/3 i 1/2 visine stabala) i ekscentricnim krošnjama, do 10%																			
				oštecenih stabala od vetra, snega i leda, zdravstveno stanje stabala ove																			
				vrste drveca je dobro. Stabla bukve su zakrivljena i sa srednjim padom																			
				precnika (srednja punodrvnost), sa srednje dugim krošnjama (dužine izmedu																			
				1/3 i 1/2 visine stabala) i ekscentricnim krošnjama, do 10% oštecenih																			
				stabala od vetra, snega i leda, do 10% oštecenih stabala od insekata,																			
31	e	60361602	2,82	zdravstveno stanje stabala ove vrste drveca je dobro.																			
				Šuma - nalazi se na strani i na vrlo strmom terenu (nagiba od 21° do	1. SrLip	0,4		90	15	11,0	10	7,5	307			280		5	591	2,6	7,3		
				25°) - nagib valovit. Nadmorska visina 240 do 400m. Ekspozicija 1 jug -	2. Kit	0,3			29	15,7	13	12,5	62	9		35	9	9	124	1,5	4,1	0,7	
				jugozapad. Mrtvi pokrivac slabo zastupljen - povoljan proces	3. Cer	0,2			33	15,8	13	17,5	30	18		18	5		70	1,7	4,5	2,7	
				humifikacije. Gusta prizemna vegetacija. Gusto žbunje. Srednja	4. Cjas	0,1			9	7,1	14	22,5	48	27		9			84	3,3	14,2	7,5	
				zakorovljenost. tip šume razlicitih hrastova sa crnim jasenom	5. OTL				22	13,1	14	27,5	36	22	17	5	9	5	93	5,5	16,1	9,5	9,5
				(Orno-Polyquercetum) na slabo razvijenim zemljištima na krecnjacima i	6. Klen				19	12,0	14	32,5	48	27	26		5	5	110	9,1	34,1	19,1	18,2
				bazicnim silikatnim stenama..								37,5	9	23					31	3,4	7,3	22,2	
												42,5	17	4					21	3,0	20,5	5,2	
				Izdanacka mešovita šuma kitnjaka - jednodobna (u fazi razgradnje).								47,5			9				9	1,6			13,5
				Ocuvana sastojina. Mešovita sastojina (smeša stablimicna) gustog sklopa								52,5		9					9	1,9		19,4	
				(0.8 - 0.9). u celini zdravstveno stanje sastojine je osrednje. po								UKUP.	556	138	52	346	27	23	1141	33,8	108,2	86,4	41,2
				kvalitetu malo vredna sastojina (ima do 20% tehnickog drveta). Srednja																			
				ugroženost od insekata. Srednja ugroženost od fitopatoloških																			
				oboljenja-oboljenja kore. srednje negovana sastojina. Stabla srebrna																			
				lipa su zakrivljena i sa velikim padom precnika (mala punodrvnost), sa																			
				dugim krošnjama (dužine izmedu 1/2 i 2/3 visine stabala) i ekscentricnim																			
				krošnjama, zdravstveno stanje stabala ove vrste drveca je dobro. Stabla																			
				kitnjaka su zakrivljena i sa srednjim padom precnika (srednja																			
				punodrvnost), sa srednje dugim krošnjama (dužine izmedu 1/3 i 1/2 visine																			
				stabala) i ekscentricnim krošnjama, od 11-25% oštecenih stabala od																			
				insekata i fitopatoloških obolenja, zdravstveno stanje stabala ove vrste																			
31	f	60307371	9,63	drveca je osrednje.																			
				Šuma - nalazi se na strani i na vrlo strmom terenu (nagiba od 26° do	1. SrLip	0,5		36	12	10,3	8	7,5	334	67	420		111	153	1085	4,8	8,5	2,0	9,7

ОПИС СТАНИШТА И САСТОЈИНА

Ozn.mesta		gazdi-	površ-	OPIS	Osnovni taksacioni elementi						visi	deb.	Broj stabala po hektaru							G	Zapremina po		
ode-	od-	nska	ina		vrsta	sme	obr	sta-	sred.stablo		nski			Vrsta drveta						po		Vrsta drv	
ljenje	sek	klasa	ha		drveća	sa	ast	rost	Ds	Hs	step.	st.	1	2	3	4	5	6	svg.	ha	1	2	3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
				30°) - nagib ujednacen. Nadmorska visina 240 do 315m. Ekspozicija 1	2. Bag	0,2			15	12,0	16	12,5	196	22	21	23	67	44	374	4,6	17,9	1,2	1,1
				zapadna. Mrtvi pokrivac slabo zastupljen - povoljan proces humifikacije.	3. Cjas	0,1			8	7,2	11	17,5	196	45					241	5,8	33,5	9,3	
				Srednje gusta prizemna vegetacija. Gusto žbunje. Srednja zakorovljenost.	4. CB	0,1			20	13,9	8	22,5	43	67					110	4,4	13,0	20,2	
				tip šume razlicitih hrastova sa crnim jasenom (Orno-Polyquercetum) na	5. Gr	0,1			9	8,5	11	27,5				23			23	1,4			
				slabo razvijenim zemljištima na krecnjacima i bazicnim silikatnim	6. OTL				9	7,9	10												
				stenama..								UKUP.	770	201	441	46	178	197	1832	20,9	72,9	32,6	10,8
				Izdanacka mešovita šuma lipa - jednodobna (u fazi izgradnje). Ocuvana																			
				sastojina. Mešovita sastojina (smeša stablimicna) potpunog sklopa (0.7).																			
				u celini zdravstveno stanje sastojine je osrednje. po kvalitetu sastojina																			
				bez vrednosti (bez ucešca tehnickog drveta). Srednja ugroženost od																			
				insekata. Srednja ugroženost od fitopatoloških oboljenja-oboljenja kore.																			
				nenegovana sastojina. Stabla srebrna lipa su zakrivljena i sa malim																			
				padom precnika (velika punodrvnost), sa srednje dugim krošnjama (dužine																			
				izmedu 1/3 i 1/2 visine stabala) i ekscentricnim krošnjama, do 10%																			
				oštecenih stabala od insekata i fitopatoloških obolenja, zdravstveno																			
				stanje stabala ove vrste drveca je dobro. Stabla crni jasen su																			
				zakrivljena i sa srednjim padom precnika (srednja punodrvnost), sa																			
				srednje dugim krošnjama (dužine izmedu 1/3 i 1/2 visine stabala) i																			
				ekscentricnim krošnjama, do 10% oštecenih stabala od insekata i																			
				fitopatoloških obolenja, zdravstveno stanje stabala ove vrste drveca je																			
31	g	60288371	1,70	dobro.																			

ОПИС СТАНИШТА И САСТОЈИНА

Ozn.mesta		gazdi-	površ-	OPIS	Osnovni taksacioni elementi						visi	deb.	Broj stabala po hektaru							G	Zapremina po		
ode-	od-	nska	ina		vrsta	sme	obr	sta-	sred.stablo		nski			Vrsta drveta						po		Vrsta drv	
ljenje	sek	klasa	ha		drveća	sa	ast	rost	Ds	Hs	step.	st.	1	2	3	4	5	6	svg.	ha	1	2	3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
				Šuma - nalazi se na strani i na vrlo strmom terenu (nagiba od 26° do	1. SrLip	0,5		85	12	9,0	11	7,5	382	34	131	10	15	16	589	2,6	7,9	0,7	2,7
				30°) - nagib ujednacen. Nadmorska visina 225 do 295m. Ekspozicija 1	2. Kit	0,4			21	14,9	10	12,5	165	30	43				238	2,9	11,8	2,4	2,7
				zapadna. Mrtvi pokrivac slabo zastupljen - povoljan proces humifikacije.	3. Cjas	0,1			10	6,8	11	17,5	39	10	5				54	1,3	5,6	1,6	1,1
				Gusta prizemna vegetacija. Gusto žbunje. Slaba zakorovljenost. tip šume	4. OTL	0,1			18	12,5	11	22,5	28	10	10				48	1,9	7,3	3,2	3,6
				razlicitih hrastova sa crnim jasenom (Orno-Polyquercetum) na slabo	5. Brk				8	5,0	11	27,5	14	10					24	1,4	7,3	4,9	
				razvijenim zemljištima na krecnjacima i bazicnim silikatnim stenama..	6. Klen				8	5,0	11	32,5	14	26					40	3,3	8,8	20,9	
												37,5	16	21					37	4,1	14,7	25,5	
				Izdanacka mešovita šuma lipa (izdanacka šuma lipa i kitnjaka) -								42,5	5			5			10	1,4	6,4		
				jednodobna (u optimalnoj fazi). Ocuvana sastojina. Mešovita sastojina								UKUP.	664	140	189	15	15	16	1040	18,9	69,7	59,2	10,2
				(smeša stablimicna) gustog sklopa (0.8 - 0.9). u celini zdravstveno																			
				stanje sastojine je osrednje. po kvalitetu sastojina bez vrednosti (bez																			
				ucešca tehnickog drveta). Srednja ugroženost od insekata. Srednja																			
				ugroženost od fitopatoloških oboljenja-oboljenja kore. srednje negovana																			
				sastojina. Stabla srebrna lipa su zakrivljena i sa srednjim padom																			
				precnika (srednja punodrvnost), sa dugim krošnjama (dužine izmedu 1/2 i																			
				2/3 visine stabala) i ekscentricnim krošnjama, zdravstveno stanje																			
				stabala ove vrste drveca je dobro. Stabla kitnjaka su zakrivljena i sa																			
				srednjim padom precnika (srednja punodrvnost), sa dugim krošnjama (dužine																			
				izmedu 1/2 i 2/3 visine stabala) i ekscentricnim krošnjama, od 11-25%																			
				oštecenih stabala od insekata i fitopatoloških obolenja, zdravstveno																			
31	h	60288371	5,09	stanje stabala ove vrste drveca je osrednje.																			
				Šuma - nalazi se na strani i na blago nagnutom terenu (nagiba do 5°) -	1. Bag	0,5		36	12	10,1	16	7,5	365	265	133				763	3,4	8,1	5,9	3,4
				nagib ujednacen. Nadmorska visina 290 do 300m. Ekspozicija 1 zapad -	2. Klen	0,3			11	9,9	11	12,5	299	166	299		33		797	9,8	23,7	11,1	18,9
				severozapad. Mrtvi pokrivac slabo zastupljen - povoljan proces	3. Cjas	0,2			12	10,2	11	17,5	166		66	33			265	6,4	31,2		10,0
				humifikacije. Gusta prizemna vegetacija. Gusto žbunje. Jaka	4. SrLip				18	13,1	8	22,5	33						33	1,3	8,9		
				zakorovljenost. tip šume razlicitih hrastova sa crnim jasenom	5. PBr				13	10,6	10	37,5		33					33	3,7		31,9	
				(Orno-Polyquercetum) na slabo razvijenim zemljištima na krecnjacima i								UKUP.	863	464	498	33	33		1892	24,5	71,8	48,9	32,3
				bazicnim silikatnim stenama..																			
				Izdanacka mešovita šuma bagrema - jednodobna (u optimalnoj fazi). Ocuvana																			
				sastojina. Mešovita sastojina (smeša stablimicna) gustog sklopa (0.8 -																			
				0.9). u celini zdravstveno stanje sastojine je dobro. po kvalitetu																			
				sastojina bez vrednosti (bez ucešca tehnickog drveta). Srednja ugroženost																			
				od insekata. Srednja ugroženost od drugih štetnih uticaja. srednje																			
				negovana sastojina. Stabla bagrema su zakrivljena i sa srednjim padom																			
				precnika (srednja punodrvnost), sa kratkim krošnjama (dužine izmedu 1/4																			
				i1/3 visine stabala) i preširokim krošnjama, do 10% oštecenih stabala od																			
				insekata, suvih i suhovrhih stabala ima do 10%, zdravstveno stanje																			
31	i	60326371	1,19	stabala ove vrste drveca je dobro.																			
				Šuma - nalazi se na strani i na vrlo strmom terenu (nagiba od 21° do	1. CB	0,4		36	16	13,9	14	7,5	88	1181	267	620			2155	9,5	2,7	23,8	4,1
				25°) - nagib ujednacen. Nadmorska visina 235 do 295m. Ekspozicija 1	2. SrLip	0,3			8	7,7	9	12,5	88	175	88		44		394	4,8	4,6	9,6	6,3
				zapadna. Mrtvi pokrivac slabo zastupljen - povoljan proces humifikacije.	3. Kit	0,2			10	10,6	11	17,5			88				88	2,1			13,6
				Gusta prizemna vegetacija. Vrlo gusto žbunje. Jaka zakorovljenost. tip	4. Cjas	0,1			8	7,9	12	22,5	88						88	3,5	20,7		
				šume razlicitih hrastova sa crnim jasenom (Orno-Polyquercetum) na slabo	5. Cer				13	9,0	10	27,5	45						45	2,6	17,6		
				razvijenim zemljištima na krecnjacima i bazicnim silikatnim stenama..								UKUP.	308	1356	442	620	44		2770	22,6	45,6	33,4	24,0
				Izdanacka mešovita šuma lipa (izdanacka šuma lipa i kitnjaka) -																			
				jednodobna (u fazi izgradnje). Ocuvana sastojina. Mešovita sastojina																			

ОПИС СТАНИШТА И САСТОЈИНА

Ozn.mesta		gazdi-	površ-	OPIS	Osnovni taksacioni elementi						visi	deb.	Broj stabala po hektaru							G	Zapremina po		
ode-	od-	nska	ina		vrsta	sme	obr	sta-	sred.stablo		nski			Vrsta drveta						po		Vrsta drv	
ljenje	sek	klasa	ha		drveća	sa	ast	rost	Ds	Hs	step.	st.	1	2	3	4	5	6	svg.	ha	1	2	3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
				(smeša stablimicna) potpunog sklopa (0.7). u celini zdravstveno stanje																			
				sastojine je osrednje. po kvalitetu sastojina bez vrednosti (bez ucešca																			
				tehnickog drveta). Srednja ugroženost od insekata. Srednja ugroženost od																			
				fitopatoloških oboljenja-oboljenja kore. nenegovana sastojina. Stabla																			
				srebrna lipa su zakrivljena i sa malim padom precnika (velika																			
				punodrvnost), sa srednje dugim krošnjama (dužine izmedu 1/3 i 1/2 visine																			
				stabala) i ekscentricnim krošnjama, do 10% oštecenih stabala od insekata																			
				i fitopatoloških obolenja, zdravstveno stanje stabala ove vrste drveca																			
				je dobro. Stabla crni jasen su zakrivljena i sa srednjim padom precnika																			
				(srednja punodrvnost), sa srednje dugim krošnjama (dužine izmedu 1/3 i																			
				1/2 visine stabala) i ekscentricnim krošnjama, do 10% oštecenih stabala																			
				od insekata i fitopatoloških obolenja, zdravstveno stanje stabala ove																			
31	j	60288371	0,49	vrste drveca je dobro.																			

ОПИС СТАНИШТА И САСТОЈИНА

Ozn.mesta		gazdi-	površ-	OPIS	Osnovni taksacioni elementi						visi	deb.	Broj stabala po hektaru							G	Zapremina po		
ode-	od-	nska	ina		vrsta	sme	obr	sta-	sred.stablo		nski			Vrsta drveta						po		Vrsta drv	
ljenje	sek	klasa	ha		drveća	sa	ast	rost	Ds	Hs	step.	st.	1	2	3	4	5	6	svg.	ha	1	2	3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
				Šuma - nalazi se na strani i na vrlo strmom terenu(nagiba od 16° do	1. Kit	0,4		40	15	12,4	12	7,5	142	376	35	18	179		750	3,3	3,6	8,4	1,1
				20°) - nagib ujednacen. Nadmorska visina 220 do 295m. Ekspozicija 1 jug	2. SrLip	0,4			11	14,0	7	12,5	160	144		18	36	18	376	4,6	10,5	13,5	
				- jugozapad. Mrtvi pokrivac slabo zastupljen - povoljan proces	3. CB	0,1			18	13,3	12	17,5	72	143		35			250	6,0	10,3	29,8	
				humifikacije. Srednje gusta prizemna vegetacija. Gusto žbunje. Jaka	4. Cer	0,1			15	12,7	11	22,5	54	36		18			108	4,3	15,7	9,6	
				zakorovljenost. tip šume razlicitih hrastova sa crnim jasenom	5. Cjas				8	9,2	12	27,5	36		35				71	4,2	17,0		17,1
				(Orno-Polyquercetum) na slabo razvijenim zemljištima na krecnjacima i	6. Bag				13	11,5	17	32,5	18						18	1,5	13,5		
				bazicnim silikatnim stenama..								UKUP.	482	699	71	89	215	18	1574	24,0	70,6	61,3	18,2
				Izdanacka mešovita šuma kitnjaka (izdanacka šuma kitnjaka i lipe) -																			
				jednodobna (u fazi izgradnje). Ocuvana sastojina. Mešovita sastojina																			
				(smeša stablimicna) gustog sklopa (0.8 - 0.9). u celini zdravstveno																			
				stanje sastojine je dobro. po kvalitetu sastojina bez vrednosti (bez																			
				ucešca tehnickog drveta). Srednja ugroženost od insekata. Srednja																			
				ugroženost od požara. srednje negovana sastojina. Stabla srebrna lipa su																			
				zakrivljena i sa srednjim padom precnika (srednja punodrvnost), sa																			
				srednje dugim krošnjama (dužine izmedu 1/3 i 1/2 visine stabala) i																			
				ekscentricnim krošnjama, zdravstveno stanje stabala ove vrste drveca je																			
				dobro. Stabla kitnjaka su zakrivljena i sa srednjim padom precnika																			
				(srednja punodrvnost), sa srednje dugim krošnjama (dužine izmedu 1/3 i																			
				1/2 visine stabala) i normalno razvijenim krošnjama, do 10% oštecenih																			
				stabala od insekata i fitopatoloških obolenja, zdravstveno stanje																			
31	k	60307371	2,80	stabala ove vrste drveca je dobro.																			
				Šuma - nalazi se na strani i na blago nagnutom terenu (nagiba do 5°) -	1. Kit	0,3		85	18	13,1	10	7,5			386		216		601	2,7			10,7
				nagib ujednacen. Nadmorska visina 290 do 295m. Ekspozicija 1 istok -	2. Kes	0,4			16	11,6	10	12,5	72	145	71				288	3,5	3,9	12,7	4,5
				severoistok. Mrtvi pokrivac srednje zastupljen - povoljan proces	3. SrLip	0,3			11	6,7	8	17,5	71	193	145				409	9,8	14,3	36,4	27,8
				humifikacije. Gusta prizemna vegetacija. Gusto žbunje. Slaba	4. Cer	0,1			23	16,5	9	22,5	48	48		24			120	4,8	15,7	15,8	
				zakorovljenost. tip šume kitnjaka i cera (Quercetum petraea-cerris	5. Cjas				8	4,1	11	27,5	24						24	1,4	10,7		
				pauperum) na kiselim smedim i lesiviranim kiselim smedjim zemljištima..								UKUP.	215	386	602	24	216		1442	22,2	44,6	64,9	43,0
				Izdanacka mešovita šuma kitnjaka - jednodobna (u fazi razgradnje).																			
				Ocuvana sastojina. Mešovita sastojina (smeša stablimicna) gustog sklopa																			
				(0.8 - 0.9). u celini zdravstveno stanje sastojine je osrednje. po																			
				kvalitetu malo vredna sastojina (ima do 20% tehnickog drveta). Srednja																			
				ugroženost od insekata. Srednja ugroženost od fitopatoloških																			
				oboljenja-oboljenja kore. srednje negovana sastojina. Stabla srebrna																			
				lipa su zakrivljena i sa srednjim padom precnika (srednja punodrvnost),																			
				sa dugim krošnjama (dužine izmedu 1/2 i 2/3 visine stabala) i																			
				ekscentricnim krošnjama, zdravstveno stanje stabala ove vrste drveca je																			
				dobro. Stabla kitnjaka su zakrivljena i sa srednjim padom precnika																			
				(srednja punodrvnost), sa dugim krošnjama (dužine izmedu 1/2 i 2/3 visine																			
				stabala) i ekscentricnim krošnjama, od 11-25% oštecenih stabala od																			
				insekata i fitopatoloških obolenja, zdravstveno stanje stabala ove vrste																			
31	l	60307465	0,36	drveca je osrednje.																			
				Šuma - nalazi se na strani i na srednje strmom terenu (nagiba od 6° do	1. Kit	0,7		75	22	13,5	12	7,5	25	398	23	72	74	24	616	2,7	0,4	8,6	0,5
				10°) - nagib ujednacen. Nadmorska visina 260 do 285m. Ekspozicija 1	2. SrLip	0,2			11	8,8	10	12,5	23						23	0,3	1,6		
				istocna. Mrtvi pokrivac slabo zastupljen - povoljan proces humifikacije.	3. OTL	0,1			20	13,2	12	17,5	180	95					275	6,6	32,2	14,4	
				Gusta prizemna vegetacija. Gusto žbunje. Slaba zakorovljenost. tip šume	4. Tre				8	6,5	16	22,5	242	25					267	10,6	72,8	8,7	
				kitnjaka (Quercetum montanum typicum) na kiselom smedem i lesiviranom	5. Cjas				8	6,5	13	27,5	119	23					142	8,4	60,1	10,8	

ОПИС СТАНИШТА И САСТОЈИНА

Ozn.mesta		gazdi-	površ-	OPIS	Osnovni taksacioni elementi						visi	deb.	Broj stabala po hektaru							G	Zapremina po		
ode-	od-	nska	ina		vrsta	sme	obr	sta-	sred.stablo		nski			Vrsta drveta						po		Vrsta drv	
ljenje	sek	klasa	ha		drveća	sa	ast	rost	Ds	Hs	step.	st.	1	2	3	4	5	6	svg.	ha	1	2	3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
				kiselom smedjem zemljištu..	6. Brk				8	6,5	13	32,5	35		25				60	5,0	26,5		21,5
												UKUP.	624	541	48	72	74	24	1383	33,6	193,6	42,4	22,0
				Izdanacka mešovita šuma kitnjaka (izdanacka šuma kitnjaka i lipe) -																			
				jednodobna (u optimalnoj fazi). Ocuvana sastojina. Mešovita sastojina																			
				(smeša stablimicna) gustog sklopa (0.8 - 0.9). u celini zdravstveno																			
				stanje sastojine je osrednje. po kvalitetu malo vredna sastojina (ima do																			
				20% tehnickog drveta). Srednja ugroženost od insekata. Srednja ugroženost																			
				od fitopatoloških oboljenja-oboljenja kore. srednje negovana sastojina.																			
				Stabla srebrna lipa su zakrivljena i sa srednjim padom precnika (srednja																			
				punodrvnost), sa dugim krošnjama (dužine izmedu 1/2 i 2/3 visine stabala)																			
				i ekscentricnim krošnjama, zdravstveno stanje stabala ove vrste drveca																			
				je dobro. Stabla kitnjaka su zakrivljena i sa srednjim padom precnika																			
				(srednja punodrvnost), sa dugim krošnjama (dužine izmedu 1/2 i 2/3 visine																			
				stabala) i ekscentricnim krošnjama, od 11-25% oštecenih stabala od																			
				insekata i fitopatoloških obolenja, zdravstveno stanje stabala ove vrste																			
31	m	60307482	0,95	drveca je osrednje.																			

ОПИС СТАНИШТА И САСТОЈИНА

Ozn.mesta		gazdi-	površ-	OPIS	Osnovni taksacioni elementi						visi	deb.	Broj stabala po hektaru							G	Zapremina po		
ode-	od-	nska	ina		vrsta	sme	obr	sta-	sred.stablo		nski			Vrsta drveta						po		Vrsta drv	
ljenje	sek	klasa	ha		drveća	sa	ast	rost	Ds	Hs	step.	st.	1	2	3	4	5	6	svg.	ha	1	2	3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
				Šuma - nalazi se na strani i na blago nagnutom terenu (nagiba do 5°) -	1. CB	1,0		63	18	15,7	1	7,5	10						10		0,4		
				nagib ujednacen. Nadmorska visina 260 do 280m. Ekspozicija 1 istok -								12,5	90						90	1,1	5,8		
				jugoistok. Mrtvi pokrivac slabo zastupljen - povoljan proces								17,5	110						110	2,6	20,7		
				humifikacije. Srednje gusta prizemna vegetacija. Srednje gusto žbunje.								22,5	100						100	4,0	35,1		
				Srednja zakorovljenost. tip šume kitnjaka (Quercetum montanum typicum) na								27,5	10						10	0,6	5,9		
				kiselom smedem i lesiviranom kiselom smedjem zemljištu..								32,5	10						10	0,8	10,7		
												UKUP.	329						329	9,2	78,7		
				Veštacki podignuta sastojina crnog bora - jednodobna (srednjedobna)																			
				sastojina. Ocuvana sastojina. Cista sastojina (smeša stablimicna) vrlo																			
				gustog sklopa (1.0). u celini zdravstveno stanje sastojine je osrednje.																			
				po kvalitetu malo vredna sastojina (ima do 20% tehnickog drveta). Srednja																			
				ugroženost od insekata. Srednja ugroženost od požara. srednje negovana																			
				sastojina. Stabla crni bor su prava i sa srednjim padom precnika																			
				(srednja punodrvnost), sa srednje dugim krošnjama (dužine izmedu 1/3 i																			
				1/2 visine stabala) i uskim krošnjama, od 11-25% oštecenih stabala od																			
31	n	60475482	0,35	insekata i fitopatoloških obolenja.																			
				Šuma - nalazi se na strani i na srednje strmom terenu (nagiba od 6° do	1. CB	0,9		63	19	18,2	1	12,5	162						162	2,0	12,6		
				10°) - nagib ujednacen. Nadmorska visina 215 do 250m. Ekspozicija 1	2. Kit				18	16,2	1	17,5	209	45					253	6,1	37,5	8,7	
				južna. Mrtvi pokrivac slabo zastupljen - povoljan proces humifikacije.	3. Cjas				23	19,2	7	22,5	213		22				235	9,3	76,6		7,8
				Srednje gusta prizemna vegetacija. Srednje gusto žbunje. Slaba								27,5	49						49	2,9	30,1		
				zakorovljenost. tip šume razlicitih hrastova sa crnim jasenom								32,5	24						24	2,0	28,2		
				(Orno-Polyquercetum) na slabo razvijenim zemljištima na krecnjacima i								UKUP.	657	45	22				724	22,3	184,9	8,7	7,8
				bazicnim silikatnim stenama..																			
				Veštacki podignuta sastojina crnog bora - jednodobna (srednjedobna)																			
				sastojina. Ocuvana sastojina. Cista sastojina (smeša stablimicna) vrlo																			
				gustog sklopa (1.0). u celini zdravstveno stanje sastojine je osrednje.																			
				po kvalitetu malo vredna sastojina (ima do 20% tehnickog drveta). Srednja																			
				ugroženost od insekata. Srednja ugroženost od požara. srednje negovana																			
				sastojina. Stabla crni bor su prava i sa srednjim padom precnika																			
				(srednja punodrvnost), sa srednje dugim krošnjama (dužine izmedu 1/3 i																			
				1/2 visine stabala) i uskim krošnjama, do 10% oštecenih stabala od																			
				insekata i fitopatoloških obolenja, zdravstveno stanje stabala ove vrste																			
31	o	60475371	0,66	drveca je osrednje.																			
				Šuma - nalazi se na strani i na vrlo strmom terenu(nagiba od 16° do	1. Gr	0,4		75	23	14,9	12	7,5	46	7	188	29	16	48	334	1,5	0,8	0,1	4,0
				20°) - nagib ujednacen. Nadmorska visina 220 do 295m. Ekspozicija 1	2. Klen	0,1			26	15,8	12	12,5	20	7	26	16			69	0,8	1,4	0,3	1,5
				istocna. Mrtvi pokrivac slabo zastupljen - povoljan proces humifikacije.	3. SrLip	0,2			11	8,8	10	17,5	13		7		7		26	0,6	2,5		1,0
				Gusta prizemna vegetacija. Gusto žbunje. Srednja zakorovljenost. tip šume	4. OTL	0,3			26	15,7	12	22,5	13						13	0,5	4,7		
				kitnjaka, graba i cera (Carpino-Quercetum petraeae-cerris typicum) na	5. Bag				10	8,1	17	27,5	7	19					26	1,5	3,1	9,7	
				intervalu zemljišta od pararendzine na lesu i laporcu do lesivirane	6. Smr				8	5,8	19	32,5		7					7	0,5		4,0	
				gajnjace ..								37,5	19		16				35	3,9	19,1		17,6
												42,5	29						29	4,1	38,4		
				Izdanacka mešovita šuma graba - jednodobna (u fazi razgradnje).								47,5		7	7				13	2,3		11,1	10,3
				Razredjena sastojina. Mešovita sastojina (smeša stablimicna) nepotpunog								52,5	7						7	1,4	12,1		
				sklopa (0.5-0.6). u celini zdravstveno stanje sastojine je osrednje. po								72,5				16			16	6,6			
				kvalitetu malo vredna sastojina (ima do 20% tehnickog drveta). Srednja								UKUP.	154	46	243	61	23	48	574	23,9	82,1	25,2	34,4
				ugroženost od insekata. Srednja ugroženost od fitopatoloških																			
				oboljenja-oboljenja kore. srednje negovana sastojina. Stabla graba su																			

ОПИС СТАНИШТА И САСТОЈИНА

Ozn.mesta		gazdi-	površ-	OPIS	Osnovni taksacioni elementi						visi	deb.	Broj stabala po hektaru							G	Zapremina po		
ode-	od-	nska	ina		vrsta	sme	obr	sta-	sred.stablo		nski			Vrsta drveta						po		Vrsta drv	
ljenje	sek	klasa	ha		drveća	sa	ast	rost	Ds	Hs	step.	st.	1	2	3	4	5	6	svg.	ha	1	2	3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
				zakrivljena i sa velikim padom precnika (mala punodrvnost), sa dugim																			
				krošnjama (dužine izmedu 1/2 i 2/3 visine stabala) i ekscentricnim																			
				krošnjama, od 26-40% oštecenih stabala od guljenja kore, zdravstveno																			
				stanje stabala ove vrste drveca je osrednje. Stabla srebrna lipa su																			
				zakrivljena i sa velikim padom precnika (mala punodrvnost), sa srednje																			
				dugim krošnjama (dužine izmedu 1/3 i 1/2 visine stabala) i ekscentricnim																			
				krošnjama, od 26-40% oštecenih stabala od guljenja kore, zdravstveno																			
31	p	60176246	1,15	stanje stabala ove vrste drveca je osrednje.																			

Ozn.mesta		gazdi-	površ-	OPIS	Osnovni taksacioni elementi						visi	deb.	Broj stabala po hektaru							G	Zapremina po		
ode-	od-	nska	ina		vrsta	sme	obr	sta-	sred.stablo		nski			Vrsta drveta						po		Vrsta drv	
ljenje	sek	klasa	ha		drveća	sa	ast	rost	Ds	Hs	step.	st.	1	2	3	4	5	6	svg.	ha	1	2	3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
				Šuma - nalazi se na strani i na blago nagnutom terenu (nagiba do 5°) -	1. CB	0,8		62	27	22,8	1	12,5		122					122	1,5		11,5	
				nagib ujednacen. Nadmorska visina 220 do 235m. Ekspozicija 1 istocna.	2. SrLip	0,2			16	13,6	4	17,5	33	76					108	2,6	6,4	15,1	
				Mrtvi pokrivac slabo zastupljen - povoljan proces humifikacije. Srednje								22,5	72						72	2,9	28,7		
				gusta prizemna vegetacija. Srednje gusto žbunje. Slaba zakorovljenost.								27,5	95	23					118	7,0	61,6	13,8	
				tip šume kitnjaka (Quercetum montanum typicum) na kiselom smedem i								32,5	36						36	3,0	37,4		
				lesiviranom kiselom smedjem zemljištu..								37,5	36						36	4,0	47,5		
												42,5	7						7	0,9	14,5		
				Veštacki podignuta mešovita sastojina crnog bora - dvospratna								UKUP.	279	220					500	21,9	196,0	40,4	
				(srednjedobna) sastojina. Ocuvana sastojina. Mešovita sastojina (smeša																			
				stablimicna) gustog sklopa (0.8 - 0.9). u celini zdravstveno stanje																			
				sastojine je osrednje. po kvalitetu malo vredna sastojina (ima do 20%																			
				tehnickog drveta). Srednja ugroženost od insekata. Srednja ugroženost od																			
				požara. srednje negovana sastojina. Stabla srebrna lipa su zakrivljena i																			
				sa srednjim padom precnika (srednja punodrvnost), sa srednje dugim																			
				krošnjama (dužine izmedu 1/3 i 1/2 visine stabala) i ekscentricnim																			
				krošnjama, zdravstveno stanje stabala ove vrste drveca je dobro. Stabla																			
				crni bor su prava i sa srednjim padom precnika (srednja punodrvnost), sa																			
				dugim krošnjama (dužine izmedu 1/2 i 2/3 visine stabala) i uskim																			
				krošnjama, do 10% oštecenih stabala od insekata i fitopatoloških																			
31	q	60476482	1,40	obolenja, zdravstveno stanje stabala ove vrste drveca je dobro.																			
				Šuma - nalazi se na strani i na blago nagnutom terenu (nagiba do 5°) -	1. CB	0,9		52	29	23,7	1	12,5		7	7		13		27	0,3		0,6	0,4
				nagib ujednacen. Nadmorska visina 215 do 230m. Ekspozicija 1 istocna.	2. SrLip	0,1			19	13,8	3	17,5	13	33	7	7			60	1,4	2,6	8,6	1,9
				Mrtvi pokrivac slabo zastupljen - povoljan proces humifikacije. Srednje	3. Klen				15	9,9	6	22,5	53	27					79	3,2	22,5	10,6	
				gusta prizemna vegetacija. Srednje gusto žbunje. Srednja zakorovljenost.	4. Mle				18	12,3	1	27,5	66						66	3,9	47,6		
				tip šume kitnjaka (Quercetum montanum typicum) na kiselom smedem i	5. Tre				13	7,6	4	32,5	40						40	3,3	37,1		
				lesiviranom kiselom smedjem zemljištu..								37,5	27						27	2,9	36,5		
												42,5	13						13	1,9	23,6		
				Veštacki podignuta sastojina crnog bora - dvospratna (srednjedobna)								UKUP.	212	66	13	7	13		311	16,9	169,8	19,8	2,3
				sastojina. Ocuvana sastojina. Mešovita sastojina (smeša stablimicna)																			
				gustog sklopa (0.8 - 0.9). u celini zdravstveno stanje sastojine je																			
				dobro. po kvalitetu srednjevredna sastojina (ima od 21-40% tehnickog																			
				drveta). Srednja ugroženost od insekata. Srednja ugroženost od požara.																			
				srednje negovana sastojina. Stabla crni bor su prava i sa malim padom																			
				precnika (velika punodrvnost), sa srednje dugim krošnjama (dužine izmedu																			
				1/3 i 1/2 visine stabala) i preširokim krošnjama, zdravstveno stanje																			
31	r	60475482	1,20	stabala ove vrste drveca je dobro.																			
				Šuma - nalazi se na strani i na srednje strmom terenu (nagiba od 6° do	1. CB	0,7		58	25	19,9	1	7,5		24					24	0,1		1,3	
				10°) - nagib ujednacen. Nadmorska visina 205 do 215m. Ekspozicija 1	2. SrLip	0,3			19	15,4	4	12,5		30					30	0,4		3,1	
				istocna. Mrtvi pokrivac slabo zastupljen - povoljan proces humifikacije.								17,5	78	92					170	4,1	17,2	21,0	
				Gusta prizemna vegetacija. Gusto žbunje. Srednja zakorovljenost. tip šume								22,5	88	34					122	4,8	33,7	12,3	
				kitnjaka (Quercetum montanum typicum) na kiselom smedem i lesiviranom								27,5	78	48					126	7,5	52,2	26,7	
				kiselom smedjem zemljištu..								32,5	24						24	2,0	20,3		
												37,5	10						10	1,1	12,4		
				Veštacki podignuta sastojina crnog bora - dvospratna (srednjedobna)								42,5	10						10	1,4	17,2		
				sastojina. Ocuvana sastojina. Mešovita sastojina (smeša stablimicna)								UKUP.	288	228					516	21,4	152,9	64,4	
				gustog sklopa (0.8 - 0.9). u celini zdravstveno stanje sastojine je																			
				osrednje. po kvalitetu srednjevredna sastojina (ima od 21-40% tehnickog																			
				drveta). Srednja ugroženost od insekata. Srednja ugroženost od požara.																			

ОПИС СТАНИШТА И САСТОЈИНА

Ozn.mesta		gazdi-	površ-	OPIS	Osnovni taksacioni elementi						visi	deb.	Broj stabala po hektaru							G	Zapremina po		
ode-	od-	nska	ina		vrsta	sme	obr	sta-	sred.stablo		nski			Vrsta drveta						po		Vrsta drv	
ljenje	sek	klasa	ha		drveća	sa	ast	rost	Ds	Hs	step.	st.	1	2	3	4	5	6	svg.	ha	1	2	3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
				srednje negovana sastojina. Stabla crni bor su prava i sa malim padom																			
				precnika (velika punodrvnost), sa srednje dugim krošnjama (dužine izmedu																			
				1/3 i 1/2 visine stabala) i preširokim krošnjama, zdravstveno stanje																			
31	s	60475482	0,66	stabala ove vrste drveca je dobro.																			

ОПИС СТАНИШТА И САСТОЈИНА

Ozn.mesta		gazdi-	površ-	OPIS	Osnovni taksacioni elementi						visi	deb.	Broj stabala po hektaru							G	Zapremina po		
ode-	od-	nska	ina		vrsta	sme	obr	sta-	sred.stablo		nski			Vrsta drveta						po		Vrsta drv	
ljenje	sek	klasa	ha		drveća	sa	ast	rost	Ds	Hs	step.	st.	1	2	3	4	5	6	svg.	ha	1	2	3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
				Šuma - nalazi se na strani i na strmom terenu (nagiba od 11° do 15°) -	1. Kit	0,5		72	26	16,4	11	7,5			33	33		97	162	0,7			1,0
				nagib ujednacen. Nadmorska visina 210 do 240m. Ekspozicija 1 istocna.	2. Cer	0,2			30	17,6	10	12,5				162	33	16	211	2,6			
				Ne postoji ugroženost od erozije - stablian teren u prirodnim uslovima.	3. OTL	0,1			19	13,5	11	17,5				16			16	0,4			
				Mrtvi pokrivac srednje zastupljen - povoljan proces humifikacije. Retka	4. SrLip	0,1			12	9,1	9	22,5	97	16			16		130	5,1	32,6	3,5	
				prizemna vegetacija. Retko žbunje. Slaba zakorovljenost. tip šume	5. Gr				16	11,5	12	27,5	81	16	49				146	8,7	39,1	6,5	23,0
				kitnjaka, graba i cera (Carpino-Quercetum petraeae-cerris typicum) na	6. Cjas				8	6,1	12	32,5	49	65					113	9,4	33,8	40,2	
				intervalu zemljišta od pararendzine na lesu i laporcu do lesivirane								UKUP.	227	97	81	211	49	113	777	26,9	105,5	50,2	24,0
				gajnjace ..																			
				Izdanacka mešovita šuma kitnjaka (izdanacka šuma kitnjaka i cera) -																			
				jednodobna (u optimalnoj fazi). Ocuvana sastojina. Mešovita sastojina																			
				(smeša stablimicna) potpunog sklopa (0.7). u celini zdravstveno stanje																			
				sastojine je osrednje. po kvalitetu malo vredna sastojina (ima do 20%																			
				tehnickog drveta). Srednja ugroženost od insekata. Srednja ugroženost od																			
				fitopatoloških oboljenja-oboljenja lista. srednje negovana sastojina.																			
				Stabla cera su zakrivljena i sa srednjim padom precnika (srednja																			
				punodrvnost), sa srednje dugim krošnjama (dužine izmedu 1/3 i 1/2 visine																			
				stabala) i normalno razvijenim krošnjama, do 10% oštecenih stabala od																			
				insekata, suvih i suhovrhih stabala ima do 10%, zdravstveno stanje																			
				stabala ove vrste drveca je osrednje. Stabla srebrna lipa su zakrivljena																			
				i sa srednjim padom precnika (srednja punodrvnost), sa srednje dugim																			
				krošnjama (dužine izmedu 1/3 i 1/2 visine stabala) i normalno razvijenim																			
				krošnjama, do 10% oštecenih stabala od insekata i fitopatoloških																			
				obolenja, suvih i suhovrhih stabala ima do 10%, zdravstveno stanje																			
				stabala ove vrste drveca je osrednje. Stabla kitnjaka su zakrivljena i sa																			
				srednjim padom precnika (srednja punodrvnost), sa srednje dugim krošnjama																			
				(dužine izmedu 1/3 i 1/2 visine stabala) i normalno razvijenim krošnjama,																			
				do 10% oštecenih stabala od insekata i fitopatoloških obolenja, suvih i																			
				suhovrhih stabala ima do 10%, zdravstveno stanje stabala ove vrste																			
31	t	60307246	1,40	drveca je osrednje.																			
				Livada.																			
31	1	60	2,63																				
				Livada.																			
31	2	60	4,32																				
				Livada.																			
31	3	60	4,76																				
				Pašnjak.																			
31	4	60	3,46																				
				Put.																			

ОПИС СТАНИШТА И САСТОЈИНА

Ozn.mesta		gazdi-	površ-	OPIS	Osnovni taksacioni elementi						visi	deb.	Broj stabala po hektaru							G	Zapremina po		
ode-	od-	nska	ina		vrsta	sme	obr	sta-	sred.stablo		nski			Vrsta drveta						po		Vrsta drv	
ljenje	sek	klasa	ha		drveća	sa	ast	rost	Ds	Hs	step.	st.	1	2	3	4	5	6	svg.	ha	1	2	3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
31	5	60	0,21																				
				Livada.																			
31	6	60	0,64																				

Ozn.mesta		gazdi-	površ-	OPIS	Osnovni taksacioni elementi						visi	deb.	Broj stabala po hektaru							G	Zapremina po		
ode-	od-	nska	ina		vrsta	sme	obr	sta-	sred.stablo		nski			Vrsta drveta						po		Vrsta drv	
ljenje	sek	klasa	ha		drveća	sa	ast	rost	Ds	Hs	step.	st.	1	2	3	4	5	6	svg.	ha	1	2	3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
				Šuma - nalazi se na strani i na strmom terenu (nagiba od 11° do 15°) -	1. Kit	0,8		107	36	18,2	12	7,5	14	42	181	98		42	377	1,7	0,3	1,0	3,9
				nagib ujednacen. Nadmorska visina 420 do 445m. Ekspozicija 1 istocna.	2. SrLip	0,1			14	13,7	7	12,5		49	42	35	7		133	1,6		3,9	3,2
				Ne postoji ugroženost od erozije - stablian teren u prirodnim uslovima.	3. Gr	0,1			10	11,2	11	17,5		56	7	21	7	7	98	2,4		9,6	1,1
				Mrtvi pokrivac srednje zastupljen - nepovoljan proces humifikacije. Retka	4. Cjas				10	11,3	11	22,5		14	21		14		49	1,9		4,4	7,4
				prizemna vegetacija. Retko žbunje. Slaba zakorovljenost. tip šume	5. Bk				21	15,9	15	27,5	14	7					21	1,2	7,9	4,1	
				kitnjaka (Quercetum montanum typicum) na kiselom smedem zemljištu..	6. OTL				9	10,5	12	32,5	49				7		56	4,7	38,4		
												37,5	63						63	6,9	67,8		
				Izdanacka mešovita šuma kitnjaka - jednodobna (u fazi razgradnje).								42,5	70						70	10,0	104,1		
				Ocuvana sastojina. Mešovita sastojina (smeša stablimicna) potpunog sklopa								47,5	7						7	1,2	13,9		
				(0.7). u celini zdravstveno stanje sastojine je dobro. po kvalitetu								UKUP.	217	168	251	154	35	49	874	31,6	232,3	23,0	15,5
				srednjevredna sastojina (ima od 21-40% tehnickog drveta). Srednja																			
				ugroženost od insekata. Srednja ugroženost od drugih štetnih uticaja.																			
				srednje negovana sastojina. Stabla kitnjaka su zakrivljena i sa srednjim																			
				padom precnika (srednja punodrvnost), sa srednje dugim krošnjama (dužine																			
				izmedu 1/3 i 1/2 visine stabala) i normalno razvijenim krošnjama, do 10%																			
				oštecenih stabala od insekata i fitopatoloških obolenja, suvih i																			
				suhovrhih stabala ima do 10%, zdravstveno stanje stabala ove vrste																			
32	a	59307481	13,45	drveca je dobro.																			
				Šuma - nalazi se na strani i na strmom terenu (nagiba od 11° do 15°) -	1. Kit	0,7		117	38	19,5	11	7,5		96	30	83	7	17	232	1,0		2,4	0,7
				nagib ujednacen. Nadmorska visina 425 do 130m. Ekspozicija 1	2. SrLip	0,2			16	15,4	8	12,5		80	7	17			103	1,3		4,5	0,4
				jugoistocna. Ne postoji ugroženost od erozije - stablian teren u	3. Bk				15	15,0	14	17,5		17	27				43	1,0		2,9	4,3
				prirodnim uslovima. Mrtvi pokrivac srednje zastupljen - nepovoljan proces	4. Gr				8	10,8	10	22,5	17	33					50	2,0	4,6	9,4	
				humifikacije. Retka prizemna vegetacija. Retko žbunje. Slaba	5. Brk				8	10,1	10	27,5		33	17				50	2,9		16,9	7,8
				zakorovljenost. tip šume bukve i kitnjaka (Querco-Fagetum typicum) na	6. Cjas				8	10,1	10	32,5	17						17	1,4	13,1		
				gajnjaci do lesiviranoj gajnjaci i eutricnim smedim do lesiviranim								37,5	53						53	5,9	60,4		
				eutricnim smedjim zemljištima..								42,5	56						56	8,0	89,7		
												47,5	17						17	2,9	36,3		
				Izdanacka mešovita šuma kitnjaka (izdanacka šuma kitnjaka i lipe) -								52,5		17					17	3,6		34,6	
				jednodobna (u fazi razgradnje). Ocuvana sastojina. Mešovita sastojina								UKUP.	159	275	80	99	7	17	636	30,0	204,2	70,8	13,2
				(smeša stablimicna) potpunog sklopa (0.7). u celini zdravstveno stanje																			
				sastojine je dobro. po kvalitetu malo vredna sastojina (ima do 20%																			
				tehnickog drveta). Srednja ugroženost od insekata. Srednja ugroženost od																			
				drugih štetnih uticaja. srednje negovana sastojina. Stabla srebrna lipa																			
				su zakrivljena i sa srednjim padom precnika (srednja punodrvnost), sa																			
				srednje dugim krošnjama (dužine izmedu 1/3 i 1/2 visine stabala) i																			
				normalno razvijenim krošnjama, do 10% oštecenih stabala od insekata i																			
				fitopatoloških obolenja, suvih i suhovrhih stabala ima do 10%,																			
				zdravstveno stanje stabala ove vrste drveca je dobro. Stabla kitnjaka su																			
				zakrivljena i sa srednjim padom precnika (srednja punodrvnost), sa																			
				srednje dugim krošnjama (dužine izmedu 1/3 i 1/2 visine stabala) i																			
				normalno razvijenim krošnjama, do 10% oštecenih stabala od insekata i																			
				fitopatoloških obolenja, suvih i suhovrhih stabala ima do 10%,																			
32	b	59307601	2,48	zdravstveno stanje stabala ove vrste drveca je dobro.																			
				Šuma - nalazi se na strani i na strmom terenu (nagiba od 11° do 15°) -	1. Kit	0,6		117	31	19,0	11	7,5	25	97		145	148	99	513	2,3	0,9	1,9	
				nagib ujednacen. Nadmorska visina 410 do 430m. Ekspozicija 1	2. SrLip	0,2			15	12,7	9	12,5		48	25				73	0,9		2,5	3,1
				jugoistocna. Ne postoji ugroženost od erozije - stablian teren u	3. Bag	0,1			18	15,0	15	17,5		48	25	25			97	2,3		7,5	4,8
				prirodnim uslovima. Mrtvi pokrivac srednje zastupljen - povoljan proces	4. Gr	0,1			9	6,6	9	22,5	25		25				50	2,0	7,7		7,1
				humifikacije. Srednje gusta prizemna vegetacija. Srednje gusto žbunje.	5. Cjas				8	7,9	12	27,5		25					25	1,5		11,0	

ОПИС СТАНИШТА И САСТОЈИНА

Ozn.mesta		gazdi-	površ-	OPIS	Osnovni taksacioni elementi						visi	deb.	Broj stabala po hektaru							G	Zapremina po		
ode-	od-	nska	ina		vrsta	sme	obr	sta-	sred.stablo		nski			Vrsta drveta						po		Vrsta drv	
ljenje	sek	klasa	ha		drveća	sa	ast	rost	Ds	Hs	step.	st.	1	2	3	4	5	6	svg.	ha	1	2	3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
				Srednja zakorovljenost. tip šume kitnjaka i cera (Quercetum	6. OTL				8	6,9	13	32,5	50	24					73	6,1	34,9	18,6	
				petraeae-cerris typicum) na lesiviranim gajnjacama i beskarbonatnom								42,5	24						24	3,4	32,6		
				deluvijumu..								47,5	24						24	4,2	43,1		
												UKUP.	147	241	74	170	148	99	879	22,6	119,2	41,6	15,0
				Izdanacka mešovita šuma kitnjaka (izdanacka šuma kitnjaka i lipe) -																			
				jednodobna (u fazi razgradnje). Ocuvana sastojina. Mešovita sastojina																			
				(smeša stablimicna) gustog sklopa (0.8 - 0.9). u celini zdravstveno																			
				stanje sastojine je dobro. po kvalitetu malo vredna sastojina (ima do 20%																			
				tehnickog drveta). Srednja ugroženost od insekata. Srednja ugroženost od																			
				drugih štetnih uticaja. srednje negovana sastojina. Stabla srebrna lipa																			
				su zakrivljena i sa srednjim padom precnika (srednja punodrvnost), sa																			
				srednje dugim krošnjama (dužine izmedu 1/3 i 1/2 visine stabala) i																			
				normalno razvijenim krošnjama, do 10% oštecenih stabala od insekata i																			
				fitopatoloških obolenja, suvih i suhovrhih stabala ima do 10%,																			
				zdravstveno stanje stabala ove vrste drveca je dobro. Stabla kitnjaka su																			
				zakrivljena i sa srednjim padom precnika (srednja punodrvnost), sa																			
				srednje dugim krošnjama (dužine izmedu 1/3 i 1/2 visine stabala) i																			
				normalno razvijenim krošnjama, do 10% oštecenih stabala od insekata i																			
				fitopatoloških obolenja, suvih i suhovrhih stabala ima do 10%,																			
32	c	59307463	0,62	zdravstveno stanje stabala ove vrste drveca je dobro.																			

ОПИС СТАНИШТА И САСТОЈИНА

Ozn.mesta		gazdi-	površ-	OPIS	Osnovni taksacioni elementi						visi	deb.	Broj stabala po hektaru							G	Zapremina po		
ode-	od-	nska	ina		vrsta	sme	obr	sta-	sred.stablo		nski			Vrsta drveta						po		Vrsta drv	
ljenje	sek	klasa	ha		drveća	sa	ast	rost	Ds	Hs	step.	st.	1	2	3	4	5	6	svg.	ha	1	2	3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
				Šuma - nalazi se na strani i na strmom terenu (nagiba od 11° do 15°) -	1. SrLip	0,5		17	9	10,4	7	7,5	1028	35	604	139	54	95	1955	8,6	26,8	0,8	8,7
				nagib ujednacen. Nadmorska visina 300 do 425m. Ekspozicija 1 zapadna.	2. OTL	0,2			16	12,4	12	12,5	246	35	35	62	26	26	429	5,3	18,9	2,1	2,2
				Ne postoji ugroženost od erozije - stablian teren u prirodnim uslovima.	3. Cjas	0,1			8	9,6	13	17,5	61	27		35		9	132	3,2	10,8	3,7	
				Mrtvi pokrivac srednje zastupljen - povoljan proces humifikacije. Srednje	4. Kit	0,1			10	10,8	12	22,5		9					9	0,3		3,2	
				gusta prizemna vegetacija. Retko žbunje. Slaba zakorovljenost. tip šume	5. Tre	0,1			12	11,2	16	32,5		17			9		26	2,2		11,6	
				kitnjaka i cera (Quercetum petraeae-cerris typicum) na lesiviranim	6. Gr				9	10,3	13												
				gajnjacama i beskarbonatnom deluvijumu..								UKUP.	1335	123	639	235	89	130	2550	19,6	56,5	21,3	10,9
				Izdanacka mešovita šuma lipa - jednodobna (u fazi izgradnje). Ocuvana																			
				sastojina. Mešovita sastojina (smeša stablimicna) vrlo gustog sklopa																			
				(1.0). u celini zdravstveno stanje sastojine je dobro. po kvalitetu																			
				sastojina bez vrednosti (bez ucešca tehnickog drveta). Srednja ugroženost																			
				od insekata. Srednja ugroženost od drugih štetnih uticaja. nenegovana																			
				sastojina. Stabla srebrna lipa su zakrivljena i sa srednjim padom																			
				precnika (srednja punodrvnost), sa srednje dugim krošnjama (dužine izmedu																			
				1/3 i 1/2 visine stabala) i normalno razvijenim krošnjama, do 10%																			
				oštecenih stabala od insekata, suvih i suhovrhih stabala ima do 10%,																			
32	d	59288463	15,02	zdravstveno stanje stabala ove vrste drveca je osrednje.																			
				Šuma - nalazi se na strani i na vrlo strmom terenu(nagiba od 16° do	1. Slad			94	19			7,5	215		367	30	61	15	688	3,0			5,3
				20°) - nagib ujednacen. Nadmorska visina 290 do 380m. Ekspozicija 1	2. Kit	0,8			29	18,6	11	12,5					15		15	0,2			
				jugozapadna. Ne postoji ugroženost od erozije - stablian teren u	3. Cjas	0,1			8	7,9	12	17,5	30	15					45	1,1		3,3	
				prirodnim uslovima. Mrtvi pokrivac srednje zastupljen - nepovoljan proces	4. SrLip	0,1			13	11,1	9	22,5	15	15		15			45	1,8		4,7	
				humifikacije. Retka prizemna vegetacija. Srednje gusto žbunje. Srednja	5. Klen				9	8,1	11	27,5	61	15					77	4,5		7,1	
				zakorovljenost. tip šume kitnjaka i cera (Quercetum petraeae-cerris	6. Bag				8	7,1	15	32,5	61	15					76	6,3		12,9	
				typicum) na lesiviranim gajnjacama i beskarbonatnom deluvijumu..								37,5	31	30					61	6,7		29,8	
												42,5	15						15	2,2			
				Izdanacka mešovita šuma kitnjaka - jednodobna (u fazi razgradnje).								UKUP.	428	91	367	45	76	15	1022	25,8		57,9	5,3
				Ocuvana sastojina. Mešovita sastojina (smeša stablimicna) gustog sklopa																			
				(0.8 - 0.9). u celini zdravstveno stanje sastojine je nezadovoljavajuce.																			
				po kvalitetu malo vredna sastojina (ima do 20% tehnickog drveta). Srednja																			
				ugroženost od insekata. Srednja ugroženost od drugih štetnih uticaja.																			
				nenegovana sastojina. 0. Stabla sladuna su zakrivljena i sa srednjim																			
				padom precnika (srednja punodrvnost), sa srednje dugim krošnjama (dužine																			
				izmedu 1/3 i 1/2 visine stabala) i normalno razvijenim krošnjama, do 10%																			
				oštecenih stabala od insekata i fitopatoloških obolenja, suvih i																			
				suhovrhih stabala ima do 10%, zdravstveno stanje stabala ove vrste																			
				drveca je dobro. Stabla kitnjaka su zakrivljena i sa srednjim padom																			
				precnika (srednja punodrvnost), sa srednje dugim krošnjama (dužine izmedu																			
				1/3 i 1/2 visine stabala) i normalno razvijenim krošnjama, do 10%																			
				oštecenih stabala od insekata i fitopatoloških obolenja, suvih i																			
				suhovrhih stabala ima do 10%, zdravstveno stanje stabala ove vrste																			
32	e	58307463	1,34	drveca je dobro.																			
				Šuma - nalazi se na strani i na strmom terenu (nagiba od 11° do 15°) -	1. Kit	0,7		117	38	19,9	10	7,5		440	342		147		929	4,1		14,0	6,4
				nagib ujednacen. Nadmorska visina 390 do 425m. Ekspozicija 1 zapadna.	2. SrLip	0,3			11	10,5	8	12,5		342				49	391	4,8		25,2	
				Mrtvi pokrivac srednje zastupljen - nepovoljan proces humifikacije. Retka	3. Cjas				8	7,4	10	17,5		98		49			147	3,5		18,3	
				prizemna vegetacija. Retko žbunje. Slaba zakorovljenost. tip šume bukve i	4. Tre				18	14,2	13	22,5		49					49	1,9		12,4	
				kitnjaka (Querco-Fagetum typicum) na gajnjaci do lesiviranoj gajnjaci i	5. Gr				8	7,4	10	32,5	49						49	4,1	47,3		
				eutricnim smedim do lesiviranim eutricnim smedjim zemljištima..	6. Bk				13	11,4	13	37,5	49						49	5,4	54,3		

ОПИС СТАНИШТА И САСТОЈИНА

Ozn.mesta		gazdi-	površ-	OPIS	Osnovni taksacioni elementi						visi	deb.	Broj stabala po hektaru							G	Zapremina po		
ode-	od-	nska	ina		vrsta	sme	obr	sta-	sred.stablo		nski			Vrsta drveta						po		Vrsta drv	
ljenje	sek	klasa	ha		drveća	sa	ast	rost	Ds	Hs	step.	st.	1	2	3	4	5	6	svg.	ha	1	2	3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
												42,5	49						49	6,9	70,0		
				Izdanacka mešovita šuma kitnjaka (izdanacka šuma kitnjaka i lipe) -								UKUP.	147	929	342	49	147	49	1663	30,8	171,6	70,0	6,4
				jednodobna (u fazi razgradnje). Ocuvana sastojina. Mešovita sastojina																			
				(smeša stablimicna) potpunog sklopa (0.7). u celini zdravstveno stanje																			
				sastojine je dobro. po kvalitetu malo vredna sastojina (ima do 20%																			
				tehnickog drveta). Srednja ugroženost od insekata. Srednja ugroženost od																			
				drugih štetnih uticaja. srednje negovana sastojina. Stabla srebrna lipa																			
				su zakrivljena i sa srednjim padom precnika (srednja punodrvnost), sa																			
				srednje dugim krošnjama (dužine izmedu 1/3 i 1/2 visine stabala) i																			
				normalno razvijenim krošnjama, do 10% oštecenih stabala od insekata i																			
				fitopatoloških obolenja, suvih i suhovrhih stabala ima do 10%,																			
				zdravstveno stanje stabala ove vrste drveca je dobro. Stabla kitnjaka su																			
				zakrivljena i sa srednjim padom precnika (srednja punodrvnost), sa																			
				srednje dugim krošnjama (dužine izmedu 1/3 i 1/2 visine stabala) i																			
				normalno razvijenim krošnjama, do 10% oštecenih stabala od insekata i																			
				fitopatoloških obolenja, suvih i suhovrhih stabala ima do 10%,																			
32	f	60307601	1,42	zdravstveno stanje stabala ove vrste drveca je dobro.																			

ОПИС СТАНИШТА И САСТОЈИНА

Ozn.mesta		gazdi-	površ-	OPIS	Osnovni taksacioni elementi						visi	deb.	Broj stabala po hektaru							G	Zapremina po		
ode-	od-	nska	ina		vrsta	sme	obr	sta-	sred.stablo		nski			Vrsta drveta						po		Vrsta drv	
ljenje	sek	klasa	ha		drveća	sa	ast	rost	Ds	Hs	step.	st.	1	2	3	4	5	6	svg.	ha	1	2	3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
				Šuma - nalazi se na strani i na strmom terenu (nagiba od 11° do 15°) -	1. Kit	0,6		92	29	16,9	11	7,5			20				20	0,1			0,5
				nagib ujednacen. Nadmorska visina 320 do 340m. Ekspozicija 1 zapadna.	2. Cer	0,3			40	18,5	10	12,5			40				40	0,5			3,2
				Ne postoji ugroženost od erozije - stablian teren u prirodnim uslovima.	3. Gr	0,1			15	12,7	11	17,5	20		20				40	1,0	3,3		3,5
				Mrtvi pokrivac slabo zastupljen - povoljan proces humifikacije. Srednje								22,5	20		20				40	1,6	5,6		5,1
				gusta prizemna vegetacija. Srednje gusto žbunje. Srednja zakorovljenost.								27,5	60						60	3,6	26,6		
				tip šume bukve i kitnjaka (Querco-Fagetum typicum) na kiselom smedem i								32,5	60						60	5,0	52,7		
				lesiviranom kiselom smedjem zemljištu..								37,5	20	20					40	4,4	24,2	23,6	
												42,5		20					20	2,8		28,0	
				Izdanacka mešovita šuma kitnjaka - jednodobna (u fazi razgradnje).								UKUP.	180	40	100				320	18,9	112,3	51,5	12,2
				Razredjena sastojina. Mešovita sastojina (smeša stablimicna) retkog																			
				sklopa (0.5). u celini zdravstveno stanje sastojine je osrednje. po																			
				kvalitetu malo vredna sastojina (ima do 20% tehnickog drveta). Srednja																			
				ugroženost od insekata. Srednja ugroženost od fitopatoloških																			
32	g	60307602	0,70	oboljenja-oboljenja lista. pogrešno negovana sastojina.																			
				Šuma - nalazi se na strani i na strmom terenu (nagiba od 11° do 15°) -	1. Bag	1,0		25	17	13,4	16	7,5	100						100	0,4	2,3		
				nagib ujednacen. Nadmorska visina 310 do 340m. Ekspozicija 1 zapad -								12,5	200						200	2,5	16,2		
				jugozapad. Ne postoji ugroženost od erozije - stablian teren u prirodnim								17,5	150						150	3,6	24,9		
				uslovima. Mrtvi pokrivac srednje zastupljen - povoljan proces								22,5	150						150	6,0	47,2		
				humifikacije. Srednje gusta prizemna vegetacija. Srednje gusto žbunje.								27,5	100						100	5,9	46,2		
				Srednja zakorovljenost. tip šume bukve i kitnjaka (Querco-Fagetum								UKUP.	700						700	18,4	136,8		
				typicum) na kiselom smedem i lesiviranom kiselom smedjem zemljištu..																			
				Izdanacka šuma bagrema - jednodobna (u fazi izgradnje). Ocuvana																			
				sastojina. Cista sastojina (smeša stablimicna) gustog sklopa (0.8 - 0.9).																			
				u celini zdravstveno stanje sastojine je dobro. po kvalitetu sastojina																			
				bez vrednosti (bez ucešca tehnickog drveta). Srednja ugroženost od																			
				insekata. Srednja ugroženost od drugih štetnih uticaja. nenegovana																			
32	h	60325602	2,36	sastojina.																			
				Šuma - nalazi se na strani i na strmom terenu (nagiba od 11° do 15°) -	1. Bag	1,0		25	16	13,4	15	7,5	100						100	0,4	2,5		
				nagib ujednacen. Nadmorska visina 280 do 320m. Ekspozicija 1 zapadna.								12,5	250						250	3,1	21,4		
				Ne postoji ugroženost od erozije - stablian teren u prirodnim uslovima.								17,5	200						200	4,8	35,6		
				Mrtvi pokrivac srednje zastupljen - povoljan proces humifikacije. Srednje								22,5	100						100	4,0	36,4		
				gusta prizemna vegetacija. Gusto žbunje. Jaka zakorovljenost. tip šume								27,5	50						50	3,0	27,6		
				cera i krupnolisnog medunca na nagibima (Quercetum cerris -virgilianae								UKUP.	700						700	15,3	123,4		
				xerphyllum) na intervalu zemljišta od pararendzina na lesu do rendzina i																			
				plicih smedih zemljišta na laporcima, laporovitim krecnjacima i																			
				dolomitima..																			
				Izdanacka mešovita šuma bagrema - jednodobna (u optimalnoj fazi). Ocuvana																			
				sastojina. Cista sastojina (smeša stablimicna) gustog sklopa (0.8 - 0.9).																			
				u celini zdravstveno stanje sastojine je osrednje. po kvalitetu sastojina																			
				bez vrednosti (bez ucešca tehnickog drveta). Srednja ugroženost od																			
				insekata. Srednja ugroženost od fitopatoloških oboljenja-oboljenja lista.																			
32	i	60326381	1,99	nenegovana sastojina.																			
				Šuma - nalazi se na strani i na strmom terenu (nagiba od 11° do 15°) -	1. Kit	0,6		56	22	15,3	10	7,5		50					50	0,2		1,4	
				nagib valovit. Nadmorska visina 245 do 300m. Ekspozicija 1 zapad -	2. SrLip	0,2			15	11,9	8	12,5	50	100	100				250	3,1	2,5	9,6	12,9
				severozapad. Mrtvi pokrivac slabo zastupljen. Gusta prizemna vegetacija.	3. Cer	0,2			16	12,6	9	17,5	50	50					100	2,4	8,7	6,6	
				Gusto žbunje. Srednja zakorovljenost. tip šume cera i krupnolisnog								22,5	100	50	50				200	7,9	33,0	12,7	25,1

ОПИС СТАНИШТА И САСТОЈИНА

Ozn.mesta		gazdi-	površ-	OPIS	Osnovni taksacioni elementi						visi	deb.	Broj stabala po hektaru							G	Zapremina po		
ode-	od-	nska	ina		vrsta	sme	obr	sta-	sred.stablo		nski			Vrsta drveta						po		Vrsta drv	
ljenje	sek	klasa	ha		drveća	sa	ast	rost	Ds	Hs	step.	st.	1	2	3	4	5	6	svg.	ha	1	2	3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
				medunca na nagibima (Quercetum cerris -virgilianae xerphyllum) na								27,5	100						100	5,9	54,8		
				intervalu zemljišta od pararendzina na lesu do rendzina i plicih smedih								UKUP.	300	250	150				700	19,6	98,9	30,2	38,0
				zemljišta na laporcima, laporovitim krecnjacima i dolomitima..																			
				Izdanacka mešovita šuma kitnjaka - jednodobna (u optimalnoj fazi).																			
				Razredjena sastojina. Mešovita sastojina (smeša stablimicna) nepotpunog																			
				sklopa (0.5-0.6). u celini zdravstveno stanje sastojine je osrednje. po																			
				kvalitetu malo vredna sastojina (ima do 20% tehnickog drveta). Srednja																			
				ugroženost od insekata. Srednja ugroženost od fitopatoloških																			
32	j	60307381	0,55	oboljenja-oboljenja lista. pogrešno negovana sastojina.																			

ОПИС СТАНИШТА И САСТОЈИНА

Ozn.mesta		gazdi-	površ-	OPIS	Osnovni taksacioni elementi						visi	deb.	Broj stabala po hektaru							G	Zapremina po		
ode-	od-	nska	ina		vrsta	sme	obr	sta-	sred.stablo		nski			Vrsta drveta						po		Vrsta drv	
ljenje	sek	klasa	ha		drveća	sa	ast	rost	Ds	Hs	step.	st.	1	2	3	4	5	6	svg.	ha	1	2	3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
				Šuma - nalazi se na strani i na srednje strmom terenu (nagiba od 6° do	1. Bag	1,0		18	12	8,5	17	7,5	700						700	3,1	18,7		
				10°) - nagib ujednacen. Nadmorska visina 250 do 300m. Ekspozicija 1								12,5	500						500	6,1	38,7		
				zapadna. Ne postoji ugroženost od erozije - stablian teren u prirodnim								17,5	600						600	14,4	88,1		
				uslovima. Mrtvi pokrivac slabo zastupljen - povoljan proces humifikacije.								UKUP.	1800						1800	23,6	145,5		
				Srednje gusta prizemna vegetacija. Gusto žbunje. Jaka zakorovljenost. tip																			
				šume cera i krupnolisnog medunca na nagibima (Quercetum cerris																			
				-virgilianae xerphyllum) na intervalu zemljišta od pararendzina na lesu																			
				do rendzina i plicih smedih zemljišta na laporcima, laporovitim																			
				krecnjacima i dolomitima..																			
				Izdanacka šuma bagrema - jednodobna (u fazi izgradnje). Ocuvana																			
				sastojina. Cista sastojina (smeša grupimicna) gustog sklopa (0.8 - 0.9).																			
				u celini zdravstveno stanje sastojine je osrednje. po kvalitetu sastojina																			
				bez vrednosti (bez ucešca tehnickog drveta). Srednja ugroženost od																			
				insekata. Srednja ugroženost od fitopatoloških oboljenja-oboljenja lista.																			
32	k	60325381	1,82	nenegovana sastojina.																			
				Šuma - nalazi se na strani i na strmom terenu (nagiba od 11° do 15°) -	1. CB	1,0		45	18	13,4	8	12,5	250						250	3,1	15,6		
				nagib ujednacen. Nadmorska visina 250 do 275m. Ekspozicija 1 zapad -								17,5	200						200	4,8	29,4		
				jugozapad. Ne postoji ugroženost od erozije - stablian teren u prirodnim								22,5	150						150	6,0	47,4		
				uslovima. Mrtvi pokrivac slabo zastupljen - nepovoljan proces								27,5	100						100	5,9	48,2		
				humifikacije. Srednje gusta prizemna vegetacija. Srednje gusto žbunje.								UKUP.	700						700	19,8	140,5		
				Srednja zakorovljenost. tip šume bukve i kitnjaka (Querco-Fagetum																			
				typicum) na kiselom smedem i lesiviranom kiselom smedjem zemljištu..																			
				Veštacki podignuta sastojina crnog bora - jednodobna (srednjedobna)																			
				sastojina. Ocuvana sastojina. Cista sastojina (smeša stablimicna) gustog																			
				sklopa (0.8 - 0.9). u celini zdravstveno stanje sastojine je dobro. po																			
				kvalitetu malo vredna sastojina (ima do 20% tehnickog drveta). Srednja																			
				ugroženost od insekata. Srednja ugroženost od požara. nenegovana																			
32	l	60475602	0,93	sastojina.																			
				Šuma - nalazi se na strani i na vrlo strmom terenu(nagiba od 16° do	1. CB	1,0		45	18	13,1	11	12,5	250						250	3,1	16,0		
				20°) - nagib ujednacen. Nadmorska visina 210 do 250m. Ekspozicija 1								17,5	250						250	6,0	33,8		
				zapad - jugozapad. Ne postoji ugroženost od erozije - stablian teren u								22,5	100						100	4,0	32,7		
				prirodnim uslovima. Mrtvi pokrivac srednje zastupljen - povoljan proces								27,5	100						100	5,9	47,1		
				humifikacije. Srednje gusta prizemna vegetacija. Srednje gusto žbunje.								UKUP.	700						700	19,0	129,5		
				Srednja zakorovljenost. tip šume bukve i kitnjaka (Querco-Fagetum																			
				typicum) na kiselom smedem i lesiviranom kiselom smedjem zemljištu..																			
				Veštacki podignuta sastojina crnog bora - jednodobna (srednjedobna)																			
				sastojina. Ocuvana sastojina. Cista sastojina (smeša stablimicna) gustog																			
				sklopa (0.8 - 0.9). u celini zdravstveno stanje sastojine je dobro. po																			
				kvalitetu malo vredna sastojina (ima do 20% tehnickog drveta). Mala																			
				ugroženost od požara. Srednja ugroženost od drugih štetnih uticaja.																			
32	m	60475602	0,59	nenegovana sastojina.																			
				Vocnjak.																			
32	1	60	0,33																				

ОПИС СТАНИШТА И САСТОЈИНА

Ozn.mesta		gazdi-	površ-	OPIS	Osnovni taksacioni elementi						visi	deb.	Broj stabala po hektaru							G	Zapremina po		
ode-	od-	nska	ina		vrsta	sme	obr	sta-	sred.stablo		nski			Vrsta drveta						po		Vrsta drv	
ljenje	sek	klasa	ha		drveća	sa	ast	rost	Ds	Hs	step.	st.	1	2	3	4	5	6	svg.	ha	1	2	3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
				Njiva.																			
32	2	60	0,21																				
				Njiva.																			
32	3	60	1,13																				
				Livada. 16.																			
32	4	60	3,26																				
				Livada.																			
32	5	60	0,46																				
				Šumsko zemljište.																			
32	6	60	0,16																				

ОПИС СТАНИШТА И САСТОЈИНА

Ozn.mesta		gazdi-	površ-	OPIS	Osnovni taksacioni elementi						visi	deb.	Broj stabala po hektaru							G	Zapremina po		
ode-	od-	nska	ina		vrsta	sme	obr	sta-	sred.stablo		nski			Vrsta drveta						po		Vrsta drv	
ljenje	sek	klasa	ha		drveća	sa	ast	rost	Ds	Hs	step.	st.	1	2	3	4	5	6	svg.	ha	1	2	3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
				Put.																			
32	7	59	0,08																				
				Šumsko zemljište. tip šume kitnjaka i cera (Quercetum petraeae-cerris																			
				typicum) na lesiviranim gajnjacama i beskarbonatnom deluvijumu..																			
32	8	59 463	0,07																				
				Vocnjak.																			
32	9	60	0,43																				
				Šuma - nalazi se na strani i na srednje strmom terenu (nagiba od 6° do	1. Kit	0,9		115	41	22,1	9	7,5		379	18	26	41	33	497	2,2		7,7	0,3
				10°) - nagib ujednacen. Nadmorska visina 310 do 370m. Ekspozicija 1	2. SrLip	0,1			9	9,6	7	12,5		20	11	13			43	0,5		1,7	0,7
				zapadna. Mrtvi pokrivac srednje zastupljen - povoljan proces	3. Bk				16	14,3	12	22,5		3					3	0,1		1,0	
				humifikacije. Srednje gusta prizemna vegetacija. Srednje gusto žbunje.	4. Gr				9	9,6	9	27,5		7					7	0,4		3,2	
				Nema zakorovljenosti. tip šume kitnjaka (Quercetum montanum typicum) na	5. OTL				8	8,0	9	32,5	59						59	4,9	53,8		
				kiselom smedem i lesiviranom kiselom smedjem zemljištu..	6. Cjas				8	8,0	9	37,5	30	7					36	4,0	35,0	6,4	
												42,5	29	7	3				38	5,4	45,6	9,2	4,3
				Izdanacka mešovita šuma kitnjaka (izdanacka šuma kitnjaka i lipe) -								47,5	40						40	7,1	88,8		
				jednodobna (u fazi razgradnje). Razredjena sastojina. Mešovita sastojina								52,5	23		3				26	5,6	62,2		6,9
				(smeša stablimicna) nepotpunog sklopa (0.5-0.6). u celini zdravstveno								UKUP.	181	421	34	39	41	33	749	30,2	285,4	29,2	12,2
				stanje sastojine je osrednje. po kvalitetu srednjevredna sastojina (ima																			
				od 21-40% tehnickog drveta). Srednja ugroženost od insekata. Srednja																			
				ugroženost od fitopatoloških oboljenja-oboljenja lista. pogrešno negovana																			
				sastojina. 0. Stabla srebrna lipa su zakrivljena i sa srednjim padom																			
				precnika (srednja punodrvnost), sa srednje dugim krošnjama (dužine izmedu																			
				1/3 i 1/2 visine stabala) i ekscentricnim krošnjama, zdravstveno stanje																			
				stabala ove vrste drveca je dobro. Stabla kitnjaka su zakrivljena i sa																			
				srednjim padom precnika (srednja punodrvnost), sa srednje dugim krošnjama																			
				(dužine izmedu 1/3 i 1/2 visine stabala) i normalno razvijenim krošnjama,																			
				od 11-25% oštecenih stabala od insekata i fitopatoloških obolenja, suvih																			
				i sihovrhih stabala ima od 11-25%, zdravstveno stanje stabala ove vrste																			
33	a	59307482	6,48	drveca je osrednje.																			
				Šuma - nalazi se na strani i na vrlo strmom terenu (nagiba od 21° do	1. SrLip	0,6		115	23	12,6	7	7,5	117	18					135	0,6	3,2	0,2	
				25°) - nagib valovit. Nadmorska visina 250 do 300m. Ekspozicija 1	2. Bk	0,3			34	18,7	11	12,5	63	4					67	0,8	4,2	0,5	
				zapadna. Mrtvi pokrivac srednje zastupljen - povoljan proces	3. Gr	0,1			30	16,8	9	17,5			4				4	0,1			0,7
				humifikacije. Retka prizemna vegetacija. Retko žbunje. Nema	4. Kit				32	17,6	9	22,5	11			11			21	0,8	4,3		
				zakorovljenosti. tip šume bukve i kitnjaka (Querco-Fagetum typicum) na								27,5	11		12				23	1,4	6,7		6,0
				kiselom smedem i lesiviranom kiselom smedjem zemljištu..								32,5	11		4				15	1,2	9,7		3,6
												37,5		11	4				15	1,6		11,8	4,6
				Izdanacka mešovita šuma lipa - jednodobna (u fazi razgradnje).								42,5	29	15	4	9			58	8,2	44,8	25,1	6,0
				Razredjena sastojina. Mešovita sastojina (smeša stablimicna) nepotpunog								47,5	36	15					51	9,1	68,4	36,6	
				sklopa (0.5-0.6). u celini zdravstveno stanje sastojine je dobro. po								52,5	11						11	2,3	22,8		
				kvalitetu malo vredna sastojina (ima do 20% tehnickog drveta). Srednja								57,5	11	9					19	5,0	27,9	30,2	
				ugroženost od insekata. Mala ugroženost od požara. pogrešno negovana								67,5	4						4	1,5	17,8		
				sastojina. Stabla graba su zakrivljena i sa srednjim padom precnika								UKUP.	302	72	29	20			422	32,5	209,9	104,5	20,9
				(srednja punodrvnost), sa srednje dugim krošnjama (dužine izmedu 1/3 i																			

ОПИС СТАНИШТА И САСТОЈИНА

Ozn.mesta		gazdi-	površ-	OPIS	Osnovni taksacioni elementi						visi	deb.	Broj stabala po hektaru							G	Zapremina po		
ode-	od-	nska	ina		vrsta	sme	obr	sta-	sred.stablo		nski			Vrsta drveta						po		Vrsta drv	
ljenje	sek	klasa	ha		drveća	sa	ast	rost	Ds	Hs	step.	st.	1	2	3	4	5	6	svg.	ha	1	2	3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
				1/2 visine stabala) i normalno razvijenim krošnjama, do 10% oštecenih																			
				stabala od insekata, suvih i suhovrhih stabala ima do 10%, zdravstveno																			
				stanje stabala ove vrste drveca je dobro. Stabla srebrna lipa su																			
				zakrivljena i sa srednjim padom precnika (srednja punodrvnost), sa																			
				srednje dugim krošnjama (dužine izmedu 1/3 i 1/2 visine stabala) i																			
				ekscentricnim krošnjama, do 10% oštecenih stabala od vetra, snega i leda,																			
				suvih i suhovrhih stabala ima do 10%, zdravstveno stanje stabala ove																			
				vrste drveca je dobro. Stabla bukve su zakrivljena i sa srednjim padom																			
				precnika (srednja punodrvnost), sa srednje dugim krošnjama (dužine izmedu																			
				1/3 i 1/2 visine stabala) i normalno razvijenim krošnjama, do 10%																			
				oštecenih stabala od vetra, snega i leda, suvih i suhovrhih stabala ima																			
33	b	59288602	2,51	do 10%, zdravstveno stanje stabala ove vrste drveca je dobro.																			

ОПИС СТАНИШТА И САСТОЈИНА

Ozn.mesta		gazdi-	površ-	OPIS	Osnovni taksacioni elementi						visi	deb.	Broj stabala po hektaru							G	Zapremina po		
ode-	od-	nska	ina		vrsta	sme	obr	sta-	sred.stablo		nski			Vrsta drveta						po		Vrsta drv	
ljenje	sek	klasa	ha		drveća	sa	ast	rost	Ds	Hs	step.	st.	1	2	3	4	5	6	svg.	ha	1	2	3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
				Šuma - nalazi se na strani i na vrlo strmom terenu (nagiba od 26° do	1. Bk	0,3		72	23	17,5	12	7,5	44	43		44			131	0,6	1,1	1,0	
				30°) - nagib valovit. Nadmorska visina 235 do 275m. Ekspozicija 1	2. Gr	0,2			15	12,9	9	12,5	15	144					159	2,0	0,9	13,2	
				zapadna. Mrtvi pokrivac srednje zastupljen - povoljan proces	3. Cer	0,2			34	21,1	8	17,5		116	15	15		15	160	3,8		21,8	3,8
				humifikacije. Retka prizemna vegetacija. Retko žbunje. Nema	4. SrLip	0,2			20	15,8	7	22,5		29		15	15		58	2,3		8,2	
				zakorovljenosti. tip šume bukve i kitnjaka (Querco-Fagetum typicum) na	5. Kit	0,1			30	20,0	9	27,5	29	15		14			58	3,5	13,7	9,0	
				kiselom smedem i lesiviranom kiselom smedjem zemljištu..	6. Cjas				18	14,4	9	32,5	29		14	14			57	4,8	24,9		14,8
												37,5	15			15	15		44	4,8	17,8		
				Izdanacka mešovita šuma bukve (izdanacka šuma bukve, graba i lipe) -								42,5	15		29				44	6,2	25,3		47,9
				jednodobna (u optimalnoj fazi). Ocuvana sastojina. Mešovita sastojina								UKUP.	146	347	58	117	29	15	711	27,9	83,8	53,1	66,5
				(smeša stablimicna) vrlo gustog sklopa (1.0). u celini zdravstveno stanje																			
				sastojine je dobro. po kvalitetu malo vredna sastojina (ima do 20%																			
				tehnickog drveta). Srednja ugroženost od insekata. srednje negovana																			
				sastojina. Stabla graba su kriva i sa srednjim padom precnika (srednja																			
				punodrvnost), sa srednje dugim krošnjama (dužine izmedu 1/3 i 1/2 visine																			
				stabala) i normalno razvijenim krošnjama, zdravstveno stanje stabala ove																			
				vrste drveca je dobro. Stabla srebrna lipa su zakrivljena i sa srednjim																			
				padom precnika (srednja punodrvnost), sa srednje dugim krošnjama (dužine																			
				izmedu 1/3 i 1/2 visine stabala) i ekscentricnim krošnjama, zdravstveno																			
				stanje stabala ove vrste drveca je dobro. Stabla bukve su zakrivljena i																			
				sa srednjim padom precnika (srednja punodrvnost), sa srednje dugim																			
				krošnjama (dužine izmedu 1/3 i 1/2 visine stabala) i normalno razvijenim																			
33	c	59361602	1,36	krošnjama, zdravstveno stanje stabala ove vrste drveca je dobro.																			
				Šuma - nalazi se na strani i na strmom terenu (nagiba od 11° do 15°) -	1. Kit	0,5		72	27	18,4	10	7,5		23	125	93	47	72	360	1,6		0,4	3,6
				nagib ujednacen. Nadmorska visina 235 do 350m. Ekspozicija 1	2. OTL	0,3			29	19,0	10	12,5			54	55	38		148	1,8			4,1
				jugozapadna. Mrtvi pokrivac srednje zastupljen - povoljan proces	3. SrLip	0,1			13	11,6	7	17,5	31		14				46	1,1	5,5		2,5
				humifikacije. Srednje gusta prizemna vegetacija. Srednje gusto žbunje.	4. Cjas				9	8,8	9	22,5	76		22				98	3,9	24,6		7,4
				Nema zakorovljenosti. tip šume kitnjaka i cera (Quercetum petraea-cerris	5. Gr				10	9,1	9	27,5	45		8				53	3,2	25,4		4,9
				pauperum) na kiselim smedim i lesiviranim kiselim smedjim zemljištima..	6. Klen				8	7,0	9	32,5	60	32	16				108	9,0	48,7	29,9	11,9
												42,5	15	16					31	4,4	23,2	24,3	
				Izdanacka mešovita šuma kitnjaka - jednodobna (u optimalnoj fazi).								47,5		8					8	1,4		16,7	
				Ocuvana sastojina. Mešovita sastojina (smeša stablimicna) gustog sklopa								UKUP.	228	79	240	148	85	72	851	26,4	127,4	71,4	34,3
				(0.8 - 0.9). u celini zdravstveno stanje sastojine je dobro. po kvalitetu																			
				malo vredna sastojina (ima do 20% tehnickog drveta). Srednja ugroženost																			
				od insekata. Srednja ugroženost od fitopatoloških oboljenja-oboljenja																			
				lista. srednje negovana sastojina. Stabla kitnjaka su zakrivljena i sa																			
				srednjim padom precnika (srednja punodrvnost), sa srednje dugim krošnjama																			
				(dužine izmedu 1/3 i 1/2 visine stabala) i ekscentricnim krošnjama, do																			
				10% oštecenih stabala od insekata i fitopatoloških obolenja, suvih i																			
				suhovrhih stabala ima do 10%, zdravstveno stanje stabala ove vrste																			
33	d	59307465	5,98	drveca je dobro.																			
				Šuma - nalazi se na strani i na srednje strmom terenu (nagiba od 6° do	1. Bag	0,4		72	21	11,8	19	7,5	48	36		204		24	313	1,4	0,7	0,8	
				10°) - nagib ujednacen. Nadmorska visina 265 do 360m. Ekspozicija 1	2. Cjas	0,1			17	11,3	14	12,5	24	36		59	24	12	155	1,9	1,7	2,7	
				zapadna. Mrtvi pokrivac srednje zastupljen - povoljan proces	3. Kit	0,2			36	15,8	14	17,5	83	59	12	12			166	4,0	10,8	8,0	1,5
				humifikacije. Srednje gusta prizemna vegetacija. Srednje gusto žbunje.	4. Klen	0,2			13	9,3	14	22,5	37	12		12			61	2,4	9,9	3,5	
				Nema zakorovljenosti. tip šume kitnjaka (Quercetum montanum typicum) na	5. OTL	0,1			23	12,9	14	27,5	59	12		47			118	7,0	27,3	5,9	
				kiselom smedem i lesiviranom kiselom smedjem zemljištu..	6. PBr				9	7,0	14	32,5	24	24					48	3,9	18,0	15,0	
												37,5	12		12	12			36	3,9	12,7		10,1
				Izdanacka mešovita šuma bagrema - jednodobna (u optimalnoj fazi). Ocuvana								42,5			12		12		24	3,4			14,0

ОПИС СТАНИШТА И САСТОЈИНА

Ozn.mesta		gazdi-	površ-	OPIS	Osnovni taksacioni elementi						visi	deb.	Broj stabala po hektaru							G	Zapremina po		
ode-	od-	nska	ina		vrsta	sme	obr	sta-	sred.stablo		nski			Vrsta drveta						po		Vrsta drv	
ljenje	sek	klasa	ha		drveća	sa	ast	rost	Ds	Hs	step.	st.	1	2	3	4	5	6	svg.	ha	1	2	3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
				sastojina. Mešovita sastojina (smeša stablimicna) gustog sklopa (0.8 -								47,5	12		12				24	4,2	18,3		18,5
				0.9). u celini zdravstveno stanje sastojine je osrednje. po kvalitetu								UKUP.	298	178	48	347	37	36	944	32,2	99,3	36,0	44,1
				malo vredna sastojina (ima do 20% tehnickog drveta). Srednja ugroženost																			
				od insekata. Srednja ugroženost od fitopatoloških oboljenja-oboljenja																			
				lista. srednje negovana sastojina. Stabla kitnjaka su zakrivljena i sa																			
				srednjim padom precnika (srednja punodrvnost), sa srednje dugim krošnjama																			
				(dužine izmedu 1/3 i 1/2 visine stabala) i normalno razvijenim krošnjama,																			
				od 11-25% oštecenih stabala od insekata i fitopatoloških obolenja, suvih																			
				i sihovrhih stabala ima od 11-25%, zdravstveno stanje stabala ove vrste																			
				drveca je osrednje. Stabla bagrema su zakrivljena i sa velikim padom																			
				precnika (mala punodrvnost), sa kratkim krošnjama (dužine izmedu 1/4 i1/3																			
				visine stabala) i uskim krošnjama, do 10% oštecenih stabala od insekata i																			
				fitopatoloških obolenja, suvih i suhovrhih stabala ima do 10%,																			
33	e	59326482	1,62	zdravstveno stanje stabala ove vrste drveca je dobro.																			
				Šuma - nalazi se na ravnom terenu. i na blago nagnutom terenu (nagiba do																			
				5°) - nagib ujednacen. Nadmorska visina 225 do 230m. Ekspozicija 1 bez																			
				jasno izražene ekspozicije. Mrtvi pokrivac slabo zastupljen - povoljan																			
				proces humifikacije. Retka prizemna vegetacija. Srednje gusto žbunje.																			
				Slaba zakorovljenost. tip šume razlicitih hrastova sa crnim jasenom																			
				(Orno-Polyquercetum) na slabo razvijenim zemljištima na krecnjacima i																			
				bazicnim silikatnim stenama..																			
33	f	59267371	0,05	Šibljak (šibljak crnog jasena.).																			

Ozn.mesta		gazdi-	površ-	OPIS	Osnovni taksacioni elementi						visi	deb.	Broj stabala po hektaru							G	Zapremina po		
ode-	od-	nska	ina		vrsta	sme	obr	sta-	sred.stablo		nski			Vrsta drveta						po		Vrsta drv	
ljenje	sek	klasa	ha		drveća	sa	ast	rost	Ds	Hs	step.	st.	1	2	3	4	5	6	svg.	ha	1	2	3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
				Šuma - nalazi se na ravnom terenu. i na blago nagnutom terenu (nagiba do																			
				5°) - nagib ujednacen. Nadmorska visina 230 do 235m. Ekspozicija 1 bez																			
				jasno izražene ekspozicije. Mrtvi pokrivac slabo zastupljen - povoljan																			
				proces humifikacije. Retka prizemna vegetacija. Srednje gusto žbunje.																			
				Slaba zakorovljenost. tip šume razlicitih hrastova sa crnim jasenom																			
				(Orno-Polyquercetum) na slabo razvijenim zemljištima na krecnjacima i																			
				bazicnim silikatnim stenama.. 0.																			
33	g	59267371	0,07	Šibljak (šibljak crnog jasena.).																			
				Livada.																			
33	1	60	1,22																				
				Šuma - nalazi se na strani i na strmom terenu (nagiba od 11° do 15°) -	1. Kit	0,8		110	37	21,8	9	7,5	4	213	70	21	17	39	363	1,6		5,0	1,4
				nagib ujednacen. Nadmorska visina 300 do 430m. Ekspozicija 1	2. SrLip	0,1			11	12,5	8	12,5		72	10	4	13	5	104	1,3		5,7	0,9
				jugozapadna. Ne postoji ugroženost od erozije - stablian teren u	3. Cjas				10	10,5	9	17,5		20		4	1		25	0,6		3,5	
				prirodnim uslovima. Mrtvi pokrivac srednje zastupljen - nepovoljan proces	4. OTL				14	13,2	9	22,5	20	10	3	3			37	1,5	7,9	3,1	1,2
				humifikacije. Srednje gusta prizemna vegetacija. Srednje gusto žbunje.	5. Brk				10	10,6	9	27,5	10	12					21	1,3	6,0	5,6	
				Srednja zakorovljenost. tip šume kitnjaka (Quercetum montanum typicum) na	6. Gr				8	8,7	9	32,5	44	3					47	3,9	39,8	2,7	
				kiselom smedem i lesiviranom kiselom smedjem zemljištu..								37,5	57			4			61	6,7	69,3		
												42,5	50	3	3				57	8,1	84,3	4,3	5,1
				Izdanacka mešovita šuma kitnjaka (izdanacka šuma kitnjaka i lipe) -								47,5	20						20	3,5	41,9		
				jednodobna (u fazi razgradnje). Ocuvana sastojina. Mešovita sastojina								52,5	5	3					8	1,8	13,9	7,4	
				(smeša stablimicna) gustog sklopa (0.8 - 0.9). u celini zdravstveno								57,5	4						4	0,9	10,9		
				stanje sastojine je dobro. po kvalitetu srednjevredna sastojina (ima od								UKUP.	213	336	87	34	31	44	746	31,1	274,0	37,4	8,7
				21-40% tehnickog drveta). Srednja ugroženost od insekata. Srednja																			
				ugroženost od drugih štetnih uticaja. srednje negovana sastojina. Stabla																			
				srebrna lipa su zakrivljena i sa srednjim padom precnika (srednja																			
				punodrvnost), sa srednje dugim krošnjama (dužine izmedu 1/3 i 1/2 visine																			
				stabala) i normalno razvijenim krošnjama, do 10% oštecenih stabala od																			
				insekata i fitopatoloških obolenja, suvih i suhovrhih stabala ima do 10%,																			
				zdravstveno stanje stabala ove vrste drveca je dobro. Stabla kitnjaka su																			
				zakrivljena i sa srednjim padom precnika (srednja punodrvnost), sa																			
				srednje dugim krošnjama (dužine izmedu 1/3 i 1/2 visine stabala) i																			
				normalno razvijenim krošnjama, do 10% oštecenih stabala od insekata i																			
				fitopatoloških obolenja, suvih i suhovrhih stabala ima do 10%,																			
34	a	59307482	20,51	zdravstveno stanje stabala ove vrste drveca je dobro.																			
				Šuma - nalazi se na strani i na vrlo strmom terenu(nagiba od 16° do	1. Bk	0,8		110	31	22,1	8	7,5	14			101	11		126	0,6	0,2		
				20°) - nagib ujednacen. Nadmorska visina 275 do 385m. Ekspozicija 1	2. Kit	0,1			40	26,6	7	12,5	43		11	5			59	0,7	3,6		1,3
				jugozapadna. Ne postoji ugroženost od erozije - stablian teren u	3. Gr				18	12,8	7	17,5	9						9	0,2	2,1		
				prirodnim uslovima. Mrtvi pokrivac srednje zastupljen - povoljan proces	4. SrLip				8	4,5	5	22,5	28		11				39	1,6	12,1		4,4
				humifikacije. Srednje gusta prizemna vegetacija. Srednje gusto žbunje.	5. Slip				8	4,3	5	27,5	14						14	0,8	10,0		
				Srednja zakorovljenost. tip šume bukve i kitnjaka (Querco-Fagetum								32,5	14						14	1,2	14,5		
				typicum) na kiselom smedem i lesiviranom kiselom smedjem zemljištu..								37,5	18	16					34	3,7	24,8	21,6	
												42,5	18	5					23	3,3	34,9	7,4	
				Izdanacka mešovita šuma bukve (izdanacka šuma bukve i kitnjaka) -								47,5	18	5					23	4,0	46,4	11,9	
				jednodobna (u fazi razgradnje). Ocuvana sastojina. Mešovita sastojina								52,5	23						23	4,9	66,5		
				(smeša stablimicna) gustog sklopa (0.8 - 0.9). u celini zdravstveno								57,5	11						11	2,9	38,8		

ОПИС СТАНИШТА И САСТОЈИНА

Ozn.mesta		gazdi-	površ-	OPIS	Osnovni taksacioni elementi						visi	deb.	Broj stabala po hektaru							G	Zapremina po		
ode-	od-	nska	ina		vrsta	sme	obr	sta-	sred.stablo		nski			Vrsta drveta						po		Vrsta drv	
ljenje	sek	klasa	ha		drveća	sa	ast	rost	Ds	Hs	step.	st.	1	2	3	4	5	6	svg.	ha	1	2	3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
				stanje sastojine je dobro. po kvalitetu srednjevredna sastojina (ima od								UKUP.	210	25	23	106	11		374	23,9	253,7	40,9	5,7
				21-40% tehnickog drveta). Srednja ugrožen od insekata. Srednja																			
				ugroženost od drugih štetnih uticaja. srednje negovana sastojina. Stabla																			
				srebrna lipa su zakrivljena i sa srednjim padom precnika (srednja																			
				punodrvnost), sa srednje dugim krošnjama (dužine izmedu 1/3 i 1/2 visine																			
				stabala) i normalno razvijenim krošnjama, do 10% oštecenih stabala od																			
				insekata i fitopatoloških obolenja, suvih i suhovrhih stabala ima do 10%,																			
				zdravstveno stanje stabala ove vrste drveca je dobro. Stabla kitnjaka su																			
				zakrivljena i sa srednjim padom precnika (srednja punodrvnost), sa																			
				srednje dugim krošnjama (dužine izmedu 1/3 i 1/2 visine stabala) i																			
				normalno razvijenim krošnjama, do 10% oštecenih stabala od insekata i																			
				fitopatoloških obolenja, suvih i suhovrhih stabala ima do 10%,																			
				zdravstveno stanje stabala ove vrste drveca je dobro. Stabla bukve su																			
				zakrivljena i sa srednjim padom precnika (srednja punodrvnost), sa																			
				srednje dugim krošnjama (dužine izmedu 1/3 i 1/2 visine stabala) i																			
				normalno razvijenim krošnjama, do 10% oštecenih stabala od insekata i																			
				fitopatoloških obolenja, suvih i suhovrhih stabala ima do 10%,																			
34	b	59361602	2,48	zdravstveno stanje stabala ove vrste drveca je dobro.																			

Ozn.mesta		gazdi-	površ-	OPIS	Osnovni taksacioni elementi						visi	deb.	Broj stabala po hektaru							G	Zapremina po		
ode-	od-	nska	ina		vrsta	sme	obr	sta-	sred.stablo		nski			Vrsta drveta						po		Vrsta drv	
ljenje	sek	klasa	ha		drveća	sa	ast	rost	Ds	Hs	step.	st.	1	2	3	4	5	6	svg.	ha	1	2	3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
				Šuma - nalazi se na strani i na strmom terenu (nagiba od 11° do 15°) -	1. SrLip	0,7		16	15	13,0	8	7,5	198	244	89	30	10	29	599	2,6	5,1	5,3	1,7
				nagib valovit. Nadmorska visina 330 do 420m. Ekspozicija 1 jugoistocna.	2. Gr	0,1			9	10,0	11	12,5	129	69	10	10		19	236	2,9	10,5	5,8	0,5
				Mrtvi pokrivac srednje zastupljen - povoljan proces humifikacije. Srednje	3. Klen				9	10,1	11	17,5	60	20		10			89	2,1	9,1	3,0	
				gusta prizemna vegetacija. Srednje gusto žbunje. Srednja zakorovljenost.	4. Tre				12	12,0	13	22,5	20		10	10		10	49	2,0	5,4		3,2
				tip šume kitnjaka (Quercetum montanum cariecetosum pilosae) na gajnjaci	5. Kit	0,1			20	14,8	10	27,5	69						69	4,1	34,2		
				do lesiviranoj gajnjaci..	6. Cjas				12	11,6	11	32,5	30				10		39	3,3	23,0		
												UKUP.	505	332	109	59	19	58	1081	17,0	87,4	14,0	5,4
				Izdanacka mešovita šuma lipa (izdanacka šuma lipa i graba) - jednodobna																			
				(u fazi izgradnje). Ocuvana sastojina. Mešovita sastojina (smeša																			
				stablimicna) gustog sklopa (0.8 - 0.9). u celini zdravstveno stanje																			
				sastojine je dobro. po kvalitetu malo vredna sastojina (ima do 20%																			
				tehnickog drveta). Srednja ugroženost od insekata. Srednja ugroženost od																			
				drugih štetnih uticaja. pogrešno negovana sastojina. Stabla graba su																			
				zakrivljena i sa srednjim padom precnika (srednja punodrvnost), sa																			
				srednje dugim krošnjama (dužine izmedu 1/3 i 1/2 visine stabala) i																			
				ekscentricnim krošnjama, zdravstveno stanje stabala ove vrste drveca je																			
				dobro. Stabla srebrna lipa su zakrivljena i sa srednjim padom precnika																			
				(srednja punodrvnost), sa srednje dugim krošnjama (dužine izmedu 1/3 i																			
				1/2 visine stabala) i ekscentricnim krošnjama, zdravstveno stanje																			
35	a	59288484	4,12	stabala ove vrste drveca je dobro.																			
				Šuma - nalazi se na strani i na srednje strmom terenu (nagiba od 6° do	1. Kit	0,5		110	34	23,8	7	7,5		46	173	37		12	268	1,2		1,3	4,1
				10°) - nagib ujednacen. Nadmorska visina 315 do 410m. Ekspozicija 1	2. Bk	0,3			21	16,5	11	12,5		23	70	74			166	2,0		2,5	6,7
				jugoistocna. Mrtvi pokrivac srednje zastupljen - povoljan proces	3. SrLip	0,1			12	10,3	6	17,5		23	35	37			95	2,3		4,3	5,6
				humifikacije. Retka prizemna vegetacija. Retko žbunje. Slaba	4. Bag				13	10,1	14	22,5	23	12					35	1,4	9,7	5,1	
				zakorovljenost. tip šume bukve i kitnjaka (Querco-Fagetum typicum) na	5. OTL				33	22,3	8	27,5	23		12				35	2,1	15,2		7,6
				kiselom smedem i lesiviranom kiselom smedjem zemljištu..	6. Cjas				8	5,5	8	32,5	23	23			12		59	4,9	22,2	18,4	
												37,5	69	12	12				93	10,2	87,2	13,8	13,4
				Izdanacka mešovita šuma kitnjaka (izdanacka šuma kitnjaka, bukve i lipe)								42,5	23					23	3,3	41,5		
				- jednodobna (u fazi razgradnje). Razredjena sastojina. Mešovita								57,5		12				12	3,2		37,8	
				sastojina (smeša stablimicna) nepotpunog sklopa (0.5-0.6). u celini								UKUP.	162	151	301	147	12	12	785	30,5	175,8	83,2	37,5
				zdravstveno stanje sastojine je dobro. po kvalitetu malo vredna sastojina																			
				(ima do 20% tehnickog drveta). Srednja ugroženost od insekata. Srednja																			
				ugroženost od drugih štetnih uticaja. pogrešno negovana sastojina.																			
				Stabla srebrna lipa su zakrivljena i sa srednjim padom precnika (srednja																			
				punodrvnost), sa srednje dugim krošnjama (dužine izmedu 1/3 i 1/2 visine																			
				stabala) i ekscentricnim krošnjama, do 10% oštecenih stabala od vetra,																			
				snega i leda, suvih i suhovrhih stabala ima do 10%, zdravstveno stanje																			
				stabala ove vrste drveca je dobro. Stabla kitnjaka su zakrivljena i sa																			
				srednjim padom precnika (srednja punodrvnost), sa srednje dugim krošnjama																			
				(dužine izmedu 1/3 i 1/2 visine stabala) i normalno razvijenim krošnjama,																			
				do 10% oštecenih stabala od insekata i fitopatoloških obolenja, suvih i																			
				suhovrhih stabala ima do 10%, zdravstveno stanje stabala ove vrste																			
				drveca je dobro. Stabla bukve su zakrivljena i sa srednjim padom precnika																			
				(srednja punodrvnost), sa srednje dugim krošnjama (dužine izmedu 1/3 i																			
				1/2 visine stabala) i normalno razvijenim krošnjama, do 10% oštecenih																			
				stabala od vetra, snega i leda, suvih i suhovrhih stabala ima do 10%,																			
35	b	59307602	2,90	zdravstveno stanje stabala ove vrste drveca je dobro.																			
				Šuma - nalazi se na strani i na srednje strmom terenu (nagiba od 6° do	1. Kit	0,9		110	29	13,6	15	7,5		10					10			0,2	

ОПИС СТАНИШТА И САСТОЈИНА

Ozn.mesta		gazdi-	površ-	OPIS	Osnovni taksacioni elementi						visi	deb.	Broj stabala po hektaru							G	Zapremina po		
ode-	od-	nska	ina		vrsta	sme	obr	sta-	sred.stablo		nski			Vrsta drveta						po		Vrsta drv	
ljenje	sek	klasa	ha		drveća	sa	ast	rost	Ds	Hs	step.	st.	1	2	3	4	5	6	svg.	ha	1	2	3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
				10°) - nagib valovit. Nadmorska visina 415 do 430m. Ekspozicija 1	2. OTL	0,1			14	7,2	15	12,5		20					20	0,2		0,8	
				jugoistocna. Mrtvi pokrivac srednje zastupljen - povoljan proces								17,5	20	20					40	1,0	2,8	2,3	
				humifikacije. Srednje gusta prizemna vegetacija. Retko žbunje. Slaba								27,5	20						20	1,2	7,6		
				zakorovljenost. tip šume kitnjaka (Quercetum montanum typicum) na kiselom								32,5	10						10	0,8	5,9		
				smedem i lesiviranom kiselom smedjem zemljištu..								37,5	10						10	1,1	7,9		
												42,5	10						10	1,4	10,9		
				Devastirana šuma kitnjaka - jednodobna (u fazi izgradnje). Devastirana								UKUP.	70	50					120	5,8	35,2	3,3	
				(previše razredjena) sastojina. Mešovita sastojina (smeša stablimicna)																			
				vrlo retkog sklopa (0.4). u celini zdravstveno stanje sastojine je																			
				osrednje. po kvalitetu malo vredna sastojina (ima do 20% tehnickog																			
				drveta). Srednja ugroženost od insekata. Srednja ugroženost od																			
35	c	59308482	0,99	fitopatoloških oboljenja-oboljenja lista. srednje negovana sastojina.																			

Ozn.mesta		gazdi-	površ-	OPIS	Osnovni taksacioni elementi						visi	deb.	Broj stabala po hektaru							G	Zapremina po		
ode-	od-	nska	ina		vrsta	sme	obr	sta-	sred.stablo		nski			Vrsta drveta						po		Vrsta drv	
ljenje	sek	klasa	ha		drveća	sa	ast	rost	Ds	Hs	step.	st.	1	2	3	4	5	6	svg.	ha	1	2	3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
				Šuma - nalazi se na strani i na strmom terenu (nagiba od 11° do 15°) -	1. Kit	0,9		110	38	22,6	8	7,5		100	133	88	5	25	350	1,5		2,3	3,4
				nagib konveksan (ispupcen). Nadmorska visina 410 do 430m. Ekspozicija 1	2. Tre				9	9,6	11	12,5		22	32	24			77	0,9		1,2	3,1
				severoistok. Mrtvi pokrivac srednje zastupljen - povoljan proces	3. Gr				8	9,0	8	17,5		10		17	5		31	0,8		1,6	
				humifikacije. Srednje gusta prizemna vegetacija. Srednje gusto žbunje.	4. SrLip				10	10,2	6	22,5	10				5	5	20	0,8	3,8		
				Nema zakorovljenosti. tip šume kitnjaka i graba sa klokocikom	5. OTL				16	14,8	8	27,5	15						15	0,9	8,7		
				(Querco-Carpinetum staphyletosum) na kiselom smedem do lesiviranom	6. Cjas				10	10,4	8	32,5	10						10	0,8	8,8		
				kiselom smedjem zemljištu..								37,5	27						27	2,9	34,7		
												42,5	17						17	2,4	27,2		
				Izdanacka šuma kitnjaka - jednodobna (u fazi razgradnje). Razredjena								47,5	24						24	4,3	55,6		
				sastojina. Mešovita sastojina (smeša stablimicna) nepotpunog sklopa								52,5	5						5	1,1	14,6		
				(0.5-0.6). u celini zdravstveno stanje sastojine je osrednje. po								UKUP.	107	131	165	128	15	30	576	16,4	153,3	5,1	6,4
				kvalitetu malo vredna sastojina (ima do 20% tehnickog drveta). Srednja																			
				ugroženost od insekata. Srednja ugroženost od fitopatoloških																			
				oboljenja-oboljenja lista. pogrešno negovana sastojina. Stabla srebrna																			
				lipa su zakrivljena i sa srednjim padom precnika (srednja punodrvnost),																			
				sa srednje dugim krošnjama (dužine izmedu 1/3 i 1/2 visine stabala) i																			
				ekscentricnim krošnjama, zdravstveno stanje stabala ove vrste drveca je																			
				dobro. Stabla kitnjaka su zakrivljena i sa srednjim padom precnika																			
				(srednja punodrvnost), sa dugim krošnjama (dužine izmedu 1/2 i 2/3 visine																			
				stabala) i normalno razvijenim krošnjama, od 11-25% oštecenih stabala od																			
				insekata i fitopatoloških obolenja, suvih i sihovrhih stabala ima od																			
35	d	59306263	2,34	11-25%, zdravstveno stanje stabala ove vrste drveca je osrednje.																			
				Šuma - nalazi se na strani i na strmom terenu (nagiba od 11° do 15°) -	1. SrLip	0,5		16	10	10,8	6	7,5	443	163	272	24	36	11	951	4,2	10,9	3,1	6,1
				nagib ujednacen. Nadmorska visina 340 do 450m. Ekspozicija 1	2. Tre	0,4			12	11,7	11	12,5	213	70	12	11	12		319	3,9	19,4	4,6	1,1
				jugoistocna. Mrtvi pokrivac srednje zastupljen - povoljan proces	3. Gr	0,1			8	8,8	9	17,5	37	48					84	2,0	7,7	9,0	
				humifikacije. Retka prizemna vegetacija. Srednje gusto žbunje. Slaba	4. Klen				9	9,9	9	22,5	35	34					70	2,8	13,6	10,4	
				zakorovljenost. tip šume kitnjaka (Quercetum montanum typicum) na kiselom	5. Cjas				9	9,6	9	27,5		11					11	0,7		8,0	
				smedem i lesiviranom kiselom smedjem zemljištu..	6. Kit				8	8,6	8												
												UKUP.	728	327	285	36	48	11	1435	13,6	51,6	35,2	7,2
				Izdanacka mešovita šuma lipa - jednodobna (u fazi izgradnje). Ocuvana																			
				sastojina. Mešovita sastojina (smeša stablimicna) gustog sklopa (0.8 -																			
				0.9). u celini zdravstveno stanje sastojine je dobro. po kvalitetu malo																			
				vredna sastojina (ima do 20% tehnickog drveta). Srednja ugroženost od																			
				insekata. Mala ugroženost od snega. nenegovana sastojina. Stabla graba																			
				su zakrivljena i sa srednjim padom precnika (srednja punodrvnost), sa																			
				srednje dugim krošnjama (dužine izmedu 1/3 i 1/2 visine stabala) i																			
				ekscentricnim krošnjama, zdravstveno stanje stabala ove vrste drveca je																			
				dobro. Stabla srebrna lipa su zakrivljena i sa srednjim padom precnika																			
				(srednja punodrvnost), sa srednje dugim krošnjama (dužine izmedu 1/3 i																			
				1/2 visine stabala) i ekscentricnim krošnjama, zdravstveno stanje																			
35	e	59288482	4,25	stabala ove vrste drveca je dobro.																			
				Šuma - nalazi se na grebenu i na strmom terenu (nagiba od 11° do 15°) -	1. Kit	0,4		13	8	6,3	16	7,5	775	80		10	80	69	1013	4,5	9,5	2,0	
				nagib ujednacen. Nadmorska visina 340 do 400m. Ekspozicija 1 jug -	2. Gr	0,2			10	6,9	16	12,5	97	80		40		19	236	2,9	4,2	4,4	
				jugoistok. Mrtvi pokrivac srednje zastupljen - povoljan proces	3. Tre	0,1			19	9,0	19	17,5	40		30		20		90	2,2	4,0		3,7
				humifikacije. Retka prizemna vegetacija. Retko žbunje. Nema	4. Brk	0,1			13	7,9	16	22,5			10	10			20	0,8			2,4
				zakorovljenosti. tip šume kitnjaka (Quercetum montanum typicum) na	5. SrLip	0,1			10	6,7	14												
				kiselom smedem i lesiviranom kiselom smedjem zemljištu..	6. Bk				9	6,3	19												
												UKUP.	912	160	40	60	100	88	1358	10,3	17,7	6,4	6,1

ОПИС СТАНИШТА И САСТОЈИНА

Ozn.mesta		gazdi-	površ-	OPIS	Osnovni taksacioni elementi						visi	deb.	Broj stabala po hektaru							G	Zapremina po		
ode-	od-	nska	ina		vrsta	sme	obr	sta-	sred.stablo		nski			Vrsta drveta						po		Vrsta drv	
ljenje	sek	klasa	ha		drveća	sa	ast	rost	Ds	Hs	step.	st.	1	2	3	4	5	6	svg.	ha	1	2	3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
				Izdanacka mešovita šuma kitnjaka - jednodobna (u fazi izgradnje). Ocuvana																			
				sastojina. Mešovita sastojina (smeša stablimicna) gustog sklopa (0.8 -																			
				0.9). u celini zdravstveno stanje sastojine je dobro. po kvalitetu																			
				sastojina bez vrednosti (bez ucešca tehnickog drveta). Srednja ugroženost																			
				od insekata. Srednja ugroženost od fitopatoloških oboljenja-oboljenja																			
				lista. nenegovana sastojina. Stabla kitnjaka su zakrivljena i sa velikim																			
				padom precnika (mala punodrvnost), sa kratkim krošnjama (dužine izmedu																			
				1/4 i1/3 visine stabala) i normalno razvijenim krošnjama, do 10%																			
				oštecenih stabala od insekata, suvih i suhovrhih stabala ima do 10%,																			
35	f	59307482	2,30	zdravstveno stanje stabala ove vrste drveca je dobro.																			
				Šuma - nalazi se na strani i na strmom terenu (nagiba od 11° do 15°) -	1. Kit	0,9		110	28	14,0	14	7,5		10					10			0,2	
				nagib ujednacen. Nadmorska visina 330 do 420m. Ekspozicija 1	2. OTL	0,1			13	7,7	14	12,5		30					30	0,4		1,6	
				jugoistocna. Mrtvi pokrivac srednje zastupljen - povoljan proces								17,5	10	10					20	0,5	1,4	1,0	
				humifikacije. Srednje gusta prizemna vegetacija. Srednje gusto žbunje.								22,5	20						20	0,8	6,3		
				Nema zakorovljenosti. tip šume kitnjaka (Quercetum montanum cariecetosum								27,5	30						30	1,8	12,1		
				pilosae) na gajnjaci do lesiviranoj gajnjaci..								32,5	20						20	1,7	13,6		
												37,5	10						10	1,1	8,4		
				Devastirana šuma kitnjaka - jednodobna (u fazi razgradnje). Devastirana								UKUP.	90	50					140	6,2	41,8	2,8	
				(previše razredjena) sastojina. Mešovita sastojina (smeša stablimicna)																			
				vrlo retkog sklopa (0.4). u celini zdravstveno stanje sastojine je																			
				osrednje. po kvalitetu sastojina bez vrednosti (bez ucešca tehnickog																			
				drveta). Srednja ugroženost od insekata. Srednja ugroženost od																			
35	g	59308484	5,25	fitopatoloških oboljenja-oboljenja lista. pogrešno negovana sastojina.																			

Ozn.mesta		gazdi-	površ-	OPIS	Osnovni taksacioni elementi						visi	deb.	Broj stabala po hektaru							G	Zapremina po		
ode-	od-	nska	ina		vrsta	sme	obr	sta-	sred.stablo		nski			Vrsta drveta						po		Vrsta drv	
ljenje	sek	klasa	ha		drveća	sa	ast	rost	Ds	Hs	step.	st.	1	2	3	4	5	6	svg.	ha	1	2	3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
				Šuma - nalazi se na strani i na strmom terenu (nagiba od 11° do 15°) -	1. Kit	1,0		110	29	13,3	15	7,5		10					10			0,2	
				nagib ujednacen. Nadmorska visina 350 do 425m. Ekspozicija 1	2. OTL				13	8,1	15	12,5	10	20					30	0,4	0,4	0,9	
				jugoistocna. Mrtvi pokrivac srednje zastupljen - povoljan proces								17,5	10	10					20	0,5	1,0	1,0	
				humifikacije. Srednje gusta prizemna vegetacija. Srednje gusto žbunje.								22,5	10						10	0,4	2,0		
				Slaba zakorovljenost. tip šume kitnjaka (Quercetum montanum typicum) na								27,5	20						20	1,2	6,9		
				kiselom smedem i lesiviranom kiselom smedjem zemljištu..								32,5	20						20	1,7	10,8		
												37,5	30						30	3,3	24,3		
				Devastirana šuma kitnjaka - jednodobna (u fazi razgradnje). Devastirana								UKUP.	100	40					140	7,4	45,3	2,1	
				(previše razredjena) sastojina. Mešovita sastojina (smeša stablimicna)																			
				vrlo retkog sklopa (0.4). u celini zdravstveno stanje sastojine je dobro.																			
				po kvalitetu sastojina bez vrednosti (bez ucešca tehnickog drveta).																			
				Srednja ugroženost od insekata. Srednja ugroženost od fitopatoloških																			
35	h	59308482	3,56	oboljenja-oboljenja lista. pogrešno negovana sastojina.																			
				Put.																			
35	1	59	0,06																				
				Šuma - nalazi se na strani i na strmom terenu (nagiba od 11° do 15°) -	1. SrLip	0,4		90	22	16,1	7	7,5	83		20	10	6	4	124	0,5	2,3		0,4
				nagib konveksan (ispupcen). Nadmorska visina 305 do 420m. Ekspozicija 1	2. Kit	0,3			38	21,6	9	12,5	15		14	33	2	2	67	0,8	1,3		1,2
				istocna. Ne postoji ugroženost od erozije - stablian teren u prirodnim	3. Bk	0,2			23	16,3	12	17,5		2	8	29			40	1,0		0,4	1,6
				uslovima. Mrtvi pokrivac srednje zastupljen - povoljan proces	4. Gr	0,2			21	17,9	7	22,5		4	2	46			52	2,1		1,5	0,9
				humifikacije. Retka prizemna vegetacija. Retko žbunje. Nema	5. OTL				9	6,9	9	27,5	12	4	2	25			43	2,6	6,3	2,3	1,1
				zakorovljenosti. tip šume bukve i kitnjaka (Querco-Fagetum typicum) na	6. Bag				9	7,3	16	32,5	5	15	11				31	2,6	3,8	14,2	9,2
				kiselom smedem i lesiviranom kiselom smedjem zemljištu..								37,5	12	20	4	15			51	5,6	13,4	22,5	5,2
												42,5	9	6	9				24	3,4	13,8	9,3	13,8
				Izdanacka mešovita šuma kitnjaka - jednodobna (u fazi razgradnje).								47,5	5	2	4				11	2,0	8,6	4,5	9,2
				Ocuvana sastojina. Mešovita sastojina (smeša stablimicna) potpunog sklopa								52,5	12	11	2				26	5,5	28,6	32,1	5,0
				(0.7). u celini zdravstveno stanje sastojine je dobro. po kvalitetu malo								57,5	4						4	1,1	11,5		
				vredna sastojina (ima do 20% tehnickog drveta). Srednja ugroženost od								67,5	6						6	2,2	24,5		
				insekata. Srednja ugroženost od fitopatoloških oboljenja-oboljenja lista.								UKUP.	164	64	77	159	8	6	478	29,3	114,2	86,7	47,6
				srednje negovana sastojina. Stabla srebrna lipa su zakrivljena i sa																			
				srednjim padom precnika (srednja punodrvnost), sa srednje dugim krošnjama																			
				(dužine izmedu 1/3 i 1/2 visine stabala) i ekscentricnim krošnjama, do																			
				10% oštecenih stabala od insekata i fitopatoloških obolenja, suvih i																			
				suhovrhih stabala ima do 10%, zdravstveno stanje stabala ove vrste																			
				drveca je dobro. Stabla kitnjaka su zakrivljena i sa srednjim padom																			
				precnika (srednja punodrvnost), sa srednje dugim krošnjama (dužine izmedu																			
				1/3 i 1/2 visine stabala) i normalno razvijenim krošnjama, do 10%																			
				oštecenih stabala od insekata i fitopatoloških obolenja, suvih i																			
				suhovrhih stabala ima do 10%, zdravstveno stanje stabala ove vrste																			
				drveca je dobro. Stabla bukve su zakrivljena i sa srednjim padom precnika																			
				(srednja punodrvnost), sa srednje dugim krošnjama (dužine izmedu 1/3 i																			
				1/2 visine stabala) i normalno razvijenim krošnjama, do 10% oštecenih																			
				stabala od vetra, snega i leda, zdravstveno stanje stabala ove vrste																			
36	a	59307602	7,12	drveca je dobro.																			
				Šuma - nalazi se na strani i na strmom terenu (nagiba od 11° do 15°) -	1. Kit	0,8		80	32	20,4	9	7,5	10	216	94		10	17	346	1,5	0,3	5,4	2,0
				nagib konveksan (ispupcen). Nadmorska visina 310 do 395m. Ekspozicija 1	2. SrLip	0,2			12	11,3	8	12,5	5	73	5	17	10		110	1,3	0,6	5,5	0,4
				istocna. Ne postoji ugroženost od erozije - stablian teren u prirodnim	3. Cjas				9	7,3	9	17,5	15	23	11	5			53	1,3	2,6	3,4	2,0

ОПИС СТАНИШТА И САСТОЈИНА

Ozn.mesta		gazdi-	površ-	OPIS	Osnovni taksacioni elementi						visi	deb.	Broj stabala po hektaru							G	Zapremina po		
ode-	od-	nska	ina		vrsta	sme	obr	sta-	sred.stablo		nski			Vrsta drveta						po		Vrsta drv	
ljenje	sek	klasa	ha		drveća	sa	ast	rost	Ds	Hs	step.	st.	1	2	3	4	5	6	svg.	ha	1	2	3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
				uslovima. Mrtvi pokrivac srednje zastupljen - povoljan proces	4. Gr				14	10,9	9	22,5	20	7	5				32	1,3	6,7	2,2	1,9
				humifikacije. Retka prizemna vegetacija. Retko žbunje. Slaba	5. OTL				10	7,9	9	27,5	48	10					58	3,5	25,8	5,0	
				zakorovljenost. tip šume bukve i kitnjaka (Querco-Fagetum typicum) na	6. Brk				8	5,6	9	32,5	63	10					73	6,1	57,6	7,2	
				kiselom smedem i lesiviranom kiselom smedjem zemljištu..								37,5	52						52	5,8	62,4		
												42,5	21	10					31	4,4	32,5	15,7	
				Izdanacka mešovita šuma kitnjaka (izdanacka šuma kitnjaka i lipe) -								47,5	20	5					26	4,5	43,1	9,3	
				jednodobna (u optimalnoj fazi). Ocuvana sastojina. Mešovita sastojina								UKUP.	254	354	115	22	21	17	782	29,7	231,5	53,8	6,3
				(smeša stablimicna) gustog sklopa (0.8 - 0.9). u celini zdravstveno																			
				stanje sastojine je dobro. po kvalitetu malo vredna sastojina (ima do 20%																			
				tehnickog drveta). Srednja ugroženost od insekata. Srednja ugroženost od																			
				fitopatoloških oboljenja-oboljenja lista. srednje negovana sastojina.																			
				Stabla srebrna lipa su zakrivljena i sa srednjim padom precnika (srednja																			
				punodrvnost), sa srednje dugim krošnjama (dužine izmedu 1/3 i 1/2 visine																			
				stabala) i ekscentricnim krošnjama, do 10% oštecenih stabala od insekata																			
				i fitopatoloških obolenja, suvih i suhovrhih stabala ima do 10%,																			
				zdravstveno stanje stabala ove vrste drveca je dobro. Stabla kitnjaka su																			
				zakrivljena i sa srednjim padom precnika (srednja punodrvnost), sa																			
				srednje dugim krošnjama (dužine izmedu 1/3 i 1/2 visine stabala) i																			
				normalno razvijenim krošnjama, do 10% oštecenih stabala od insekata i																			
				fitopatoloških obolenja, suvih i suhovrhih stabala ima do 10%,																			
36	b	59307602	9,53	zdravstveno stanje stabala ove vrste drveca je dobro.																			

Ozn.mesta		gazdi-	površ-	OPIS	Osnovni taksacioni elementi						visi	deb.	Broj stabala po hektaru							G	Zapremina po		
ode-	od-	nska	ina		vrsta	sme	obr	sta-	sred.stablo		nski			Vrsta drveta						po		Vrsta drv	
ljenje	sek	klasa	ha		drveća	sa	ast	rost	Ds	Hs	step.	st.	1	2	3	4	5	6	svg.	ha	1	2	3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
				Šuma - nalazi se na strani i na strmom terenu (nagiba od 11° do 15°) -	1. Kit	0,7		90	34	21,3	8	7,5		47	74	45	84	41	291	1,3		1,1	2,0
				nagib ujednacen. Nadmorska visina 350 do 420m. Ekspozicija 1 istocna.	2. OTL	0,2			19	14,8	9	12,5		16	14		16	11	56	0,7		1,1	0,9
				Ne postoji ugroženost od erozije - stablian teren u prirodnim uslovima.	3. SrLip	0,1			14	11,6	7	17,5			11		16		26	0,6			2,1
				Mrtvi pokrivac slabo zastupljen - povoljan proces humifikacije. Retka	4. Klen	0,1			13	11,3	9	22,5	23	2	5			5	36	1,4	9,6	0,8	1,8
				prizemna vegetacija. Srednje gusto žbunje. Slaba zakorovljenost. tip šume	5. Gr				10	8,3	9	27,5	33		5	2		6	46	2,7	20,6		2,4
				razlicitih hrastova i graba (Carpino-Polyquercetum typicum) na intervalu	6. Cjas				11	10,0	9	32,5	31			2			33	2,7	28,5		
				zemljišta od duboke pararendzine na lesu do lesivirane gajnjace..								37,5	64	10		2			76	8,4	79,7	12,8	
												42,5	27	11	8				45	6,4	45,5	18,1	11,1
				Izdanacka šuma kitnjaka - jednodobna (u fazi razgradnje). Ocuvana								47,5		6	2				8	1,4		12,1	4,6
				sastojina. Mešovita sastojina (smeša stablimicna) potpunog sklopa (0.7).								52,5	2						2	0,5	6,4		
				u celini zdravstveno stanje sastojine je dobro. po kvalitetu malo vredna								72,5				2			2	0,9			
				sastojina (ima do 20% tehnickog drveta). Srednja ugroženost od insekata.								UKUP.	180	92	119	54	115	63	622	27,1	190,3	46,0	25,0
				Srednja ugroženost od fitopatoloških oboljenja-oboljenja lista. pogrešno																			
				negovana sastojina. Stabla kitnjaka su zakrivljena i sa srednjim padom																			
				precnika (srednja punodrvnost), sa srednje dugim krošnjama (dužine izmedu																			
				1/3 i 1/2 visine stabala) i normalno razvijenim krošnjama, do 10%																			
				oštecenih stabala od insekata i fitopatoloških obolenja, suvih i																			
				suhovrhih stabala ima do 10%, zdravstveno stanje stabala ove vrste																			
36	c	59306201	7,43	drveca je dobro.																			
				Put.																			
36	1	59	0,11																				
				Šuma - nalazi se na strani i na srednje strmom terenu (nagiba od 6° do	1. Kit	0,4		80	28	18,8	9	7,5		111	26	31	32	16	216	1,0		2,9	0,6
				10°) - nagib valovit. Nadmorska visina 245 do 355m. Ekspozicija 1	2. SrLip	0,2			16	12,4	7	12,5	15	30	37	16	22	11	131	1,6	1,4	2,3	3,5
				jugoistocna. Mrtvi pokrivac srednje zastupljen - povoljan proces	3. Cjas	0,2			18	13,3	9	17,5	16	20	57		16	11	121	2,9	3,9	3,5	11,7
				humifikacije. Retka prizemna vegetacija. Srednje gusto žbunje. Nema	4. OTL	0,1			19	14,0	9	22,5	42	5	36	5			88	3,5	15,1	1,4	13,4
				zakorovljenosti. tip šume razlicitih hrastova i graba	5. Klen	0,1			15	11,2	9	27,5	37	10	21				69	4,1	21,7	6,2	11,1
				(Carpino-Polyquercetum typicum) na intervalu zemljišta od duboke	6. Gr				12	9,0	9	32,5	21	10	5	5			42	3,5	17,6	7,2	4,8
				pararendzine na lesu do lesivirane gajnjace..								37,5	16	15		11	10		52	5,7	21,0	16,6	
												42,5	21	11					32	4,5	32,4	18,0	
				Izdanacka mešovita šuma kitnjaka (izdanacka šuma kitnjaka i lipe) -								47,5	5						5	0,9	10,6		
				jednodobna (u optimalnoj fazi). Ocuvana sastojina. Mešovita sastojina								52,5		5		5			10	2,2		11,0	
				(smeša stablimicna) gustog sklopa (0.8 - 0.9). u celini zdravstveno								UKUP.	174	217	182	73	80	38	764	29,8	123,7	69,2	45,1
				stanje sastojine je dobro. po kvalitetu malo vredna sastojina (ima do 20%																			
				tehnickog drveta). Srednja ugroženost od insekata. Srednja ugroženost od																			
				fitopatoloških oboljenja-oboljenja lista. srednje negovana sastojina.																			
				Stabla srebrna lipa su zakrivljena i sa srednjim padom precnika (srednja																			
				punodrvnost), sa srednje dugim krošnjama (dužine izmedu 1/3 i 1/2 visine																			
				stabala) i normalno razvijenim krošnjama, do 10% oštecenih stabala od																			
				insekata, suvih i suhovrhih stabala ima do 10%, zdravstveno stanje																			
				stabala ove vrste drveca je dobro. Stabla kitnjaka su zakrivljena i sa																			
				srednjim padom precnika (srednja punodrvnost), sa srednje dugim krošnjama																			
				(dužine izmedu 1/3 i 1/2 visine stabala) i normalno razvijenim krošnjama,																			
				do 10% oštecenih stabala od insekata i fitopatoloških obolenja, suvih i																			
				suhovrhih stabala ima do 10%, zdravstveno stanje stabala ove vrste																			
37	a	59307201	9,64	drveca je dobro.																			
				Šuma - nalazi se na strani i na srednje strmom terenu (nagiba od 6° do	1. Bag	1,0		14	10	9,7	15	7,5	998	63					1061	4,7	25,0	0,8	

ОПИС СТАНИШТА И САСТОЈИНА

Ozn.mesta		gazdi-	površ-	OPIS	Osnovni taksacioni elementi						visi	deb.	Broj stabala po hektaru							G	Zapremina po		
ode-	od-	nska	ina		vrsta	sme	obr	sta-	sred.stablo		nski			Vrsta drveta						po		Vrsta drv	
ljenje	sek	klasa	ha		drveća	sa	ast	rost	Ds	Hs	step.	st.	1	2	3	4	5	6	svg.	ha	1	2	3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
				10°) - nagib konveksan (ispupcen). Nadmorska visina 295 do 345m.	2. Klen				8	7,2	11	12,5	451						451	5,5	42,1		
				Ekspozicija 1 jugoistocna. Mrtvi pokrivac slabo zastupljen - povoljan								17,5	226						226	5,4	36,1		
				proces humifikacije. Retka prizemna vegetacija. Retko žbunje. Nema								UKUP.	1674	63					1738	15,6	103,2	0,8	
				zakorovljenosti. tip šume kitnjaka, graba i cera (Carpino-Quercetum																			
				petraeae-cerris typicum) na intervalu zemljišta od pararendzine na lesu i																			
				laporcu do lesivirane gajnjace ..																			
				Izdanacka šuma bagrema - jednodobna (u fazi izgradnje). Ocuvana																			
				sastojina. Cista sastojina (smeša stablimicna) gustog sklopa (0.8 - 0.9).																			
				u celini zdravstveno stanje sastojine je dobro. po kvalitetu sastojina																			
				bez vrednosti (bez ucešca tehnickog drveta). Srednja ugroženost od																			
				insekata. Srednja ugroženost od drugih štetnih uticaja. nenegovana																			
				sastojina. Stabla bagrema su zakrivljena i sa velikim padom precnika																			
				(mala punodrvnost), sa kratkim krošnjama (dužine izmedu 1/4 i1/3 visine																			
				stabala) i uskim krošnjama, do 10% oštecenih stabala od insekata, suvih i																			
				sihovrhih stabala ima od 11-25%, zdravstveno stanje stabala ove vrste																			
37	b	59325246	1,44	drveca je dobro.																			

ОПИС СТАНИШТА И САСТОЈИНА

Ozn.mesta		gazdi-	površ-	OPIS	Osnovni taksacioni elementi						visi	deb.	Broj stabala po hektaru							G	Zapremina po		
ode-	od-	nska	ina		vrsta	sme	obr	sta-	sred.stablo		nski			Vrsta drveta						po		Vrsta drv	
ljenje	sek	klasa	ha		drveća	sa	ast	rost	Ds	Hs	step.	st.	1	2	3	4	5	6	svg.	ha	1	2	3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
				Šuma - nalazi se na strani i na vrlo strmom terenu (nagiba od 31° do	1. OTL	0,3		68	29	18,4	10	7,5		21	63	10	22	22	138	0,6		0,5	1,2
				35°) - nagib konveksan (ispupcen). Nadmorska visina 240 do 285m.	2. Gr	0,2			17	16,7	8	12,5	10	53	42	10	33		148	1,8	1,1	5,5	2,4
				Ekspozicija 1 istok - jugoistok. Mrtvi pokrivac slabo zastupljen -	3. SrLip	0,2			16	13,4	8	17,5	10	63	10	31	21	11	147	3,5	1,8	12,7	1,4
				povoljan proces humifikacije. Retka prizemna vegetacija. Retko žbunje.	4. Cjas	0,2			20	15,1	10	22,5		21	10	62	11	11	116	4,6		7,5	3,3
				Nema zakorovljenosti. tip šume kitnjaka, graba i cera (Carpino-Quercetum	5. Kit	0,1			18	14,5	10	27,5	31	11		10	11		63	3,7	19,7	6,4	
				petraeae-cerris typicum) na intervalu zemljišta od pararendzine na lesu i	6. Bk				14	12,0	13	32,5					21		21	1,7			
				laporcu do lesivirane gajnjace ..								37,5		11	11				21	2,4		11,3	10,0
												42,5	10						10	1,5	15,7		
				Izdanacka mešovita šuma graba (izdanacka šuma graba i lipe) - jednodobna								47,5	11						11	1,9	23,7		
				(u optimalnoj fazi). Ocuvana sastojina. Mešovita sastojina (smeša								52,5			11				11	2,3			25,4
				stablimicna) gustog sklopa (0.8 - 0.9). u celini zdravstveno stanje								UKUP.	73	181	147	124	118	43	686	24,1	62,1	43,8	43,6
				sastojine je dobro. po kvalitetu malo vredna sastojina (ima do 20%																			
				tehnickog drveta). Srednja ugroženost od insekata. Srednja ugroženost od																			
				drugih štetnih uticaja. srednje negovana sastojina. Stabla graba su																			
				kriva i sa velikim padom precnika (mala punodrvnost), sa vrlo dugim																			
				krošnjama (dužine preko 2/3 visine stabala) i normalno razvijenim																			
				krošnjama, zdravstveno stanje stabala ove vrste drveca je dobro. Stabla																			
				kitnjaka su zakrivljena i sa velikim padom precnika (mala punodrvnost),																			
				sa dugim krošnjama (dužine izmedu 1/2 i 2/3 visine stabala) i normalno																			
				razvijenim krošnjama, do 10% oštecenih stabala od insekata i																			
				fitopatoloških obolenja, suvih i suhovrhih stabala ima do 10%,																			
37	c	59176246	1,89	zdravstveno stanje stabala ove vrste drveca je dobro.																			
				Šuma - nalazi se na strani i na vrlo strmom terenu (nagiba od 21° do	1. Kit	0,8		80	29	17,3	12	7,5	11	68		34	11	11	136	0,6	0,1	1,3	
				25°) - nagib konveksan (ispupcen). Nadmorska visina 285 do 350m.	2. SrLip	0,1			16	9,2	10	12,5		23	54	23	11	11	122	1,5		1,5	3,7
				Ekspozicija 1 istocna. Mrtvi pokrivac srednje zastupljen - povoljan	3. Bk	0,1			18	10,5	16	17,5	11	11					22	0,5	2,1	2,2	
				proces humifikacije. Srednje gusta prizemna vegetacija. Srednje gusto	4. Cjas				10	4,7	13	22,5	56	22					78	3,1	17,1	7,4	
				žbunje. Nema zakorovljenosti. tip šume kitnjaka (Quercetum montanum	5. Gr				10	5,0	13	27,5	111						111	6,6	54,1		
				typicum) na kiselom smedem i lesiviranom kiselom smedjem zemljištu..	6. Tre				10	5,0	16	32,5	90		22				111	9,2	69,0		14,3
												37,5	68	11					79	8,7	66,2	9,9	
				Izdanacka mešovita šuma kitnjaka - jednodobna (u optimalnoj fazi).								42,5	11	11					23	3,2	15,2	14,1	
				Ocuvana sastojina. Mešovita sastojina (smeša stablimicna) gustog sklopa								UKUP.	359	146	76	56	22	23	682	33,5	223,8	36,4	18,0
				(0.8 - 0.9). u celini zdravstveno stanje sastojine je dobro. po kvalitetu																			
				malo vredna sastojina (ima do 20% tehnickog drveta). Srednja ugroženost																			
				od insekata. Srednja ugroženost od fitopatoloških oboljenja-oboljenja																			
				lista. srednje negovana sastojina. Stabla srebrna lipa su zakrivljena i																			
				sa srednjim padom precnika (srednja punodrvnost), sa srednje dugim																			
				krošnjama (dužine izmedu 1/3 i 1/2 visine stabala) i ekscentricnim																			
				krošnjama, zdravstveno stanje stabala ove vrste drveca je dobro. Stabla																			
				kitnjaka su zakrivljena i sa srednjim padom precnika (srednja																			
				punodrvnost), sa srednje dugim krošnjama (dužine izmedu 1/3 i 1/2 visine																			
				stabala) i normalno razvijenim krošnjama, do 10% oštecenih stabala od																			
				insekata i fitopatoloških obolenja, suvih i suhovrhih stabala ima do 10%,																			
				zdravstveno stanje stabala ove vrste drveca je dobro. Stabla bukve su																			
				zakrivljena i sa srednjim padom precnika (srednja punodrvnost), sa																			
				srednje dugim krošnjama (dužine izmedu 1/3 i 1/2 visine stabala) i																			
				normalno razvijenim krošnjama, do 10% oštecenih stabala od fitopatoloških																			
				obolenja, suvih i suhovrhih stabala ima do 10%, zdravstveno stanje																			
37	d	59307482	1,99	stabala ove vrste drveca je osrednje.																			

Ozn.mesta		gazdi-	površ-	OPIS	Osnovni taksacioni elementi						visi	deb.	Broj stabala po hektaru							G	Zapremina po		
ode-	od-	nska	ina		vrsta	sme	obr	sta-	sred.stablo		nski			Vrsta drveta						po		Vrsta drv	
ljenje	sek	klasa	ha		drveća	sa	ast	rost	Ds	Hs	step.	st.	1	2	3	4	5	6	svg.	ha	1	2	3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
				Šuma - nalazi se na strani i na vrlo strmom terenu (nagiba od 31° do	1. SrLip	0,5		80	28	20,1	5	7,5	53	38	33				124	0,5	1,8	1,4	1,5
				35°) - nagib konveksan (ispupcen). Nadmorska visina 245 do 305m.	2. Bk	0,3			23	14,9	11	12,5		9	30				39	0,5		0,5	2,4
				Ekspozicija 1 istocna. Mrtvi pokrivac slabo zastupljen - povoljan proces	3. Gr	0,1			16	10,9	7	17,5	4	40	4				49	1,2	1,0	6,2	0,9
				humifikacije. Retka prizemna vegetacija. Retko žbunje. Nema	4. Kit	0,1			33	21,3	8	22,5	15	11	19	11			55	2,2	6,1	4,2	6,0
				zakorovljenosti. tip šume bukve i kitnjaka (Querco-Fagetum typicum) na								27,5	9		11				19	1,1	5,1		6,0
				kiselom smedem i lesiviranom kiselom smedjem zemljištu..								32,5	15	34	11				60	4,9	13,5	31,1	8,9
												37,5	13	15		22			50	5,5	14,4	17,7	
				Izdanacka mešovita šuma lipa (izdanacka šuma lipa i bukve) - jednodobna								47,5	20	9					28	5,0	39,2	18,7	
				(u optimalnoj fazi). Ocuvana sastojina. Mešovita sastojina (smeša								52,5	11						11	2,3	28,6		
				stablimicna) gustog sklopa (0.8 - 0.9). u celini zdravstveno stanje								57,5	11	4					15	3,9	30,9	13,9	
				sastojine je dobro. po kvalitetu malo vredna sastojina (ima do 20%								UKUP.	150	159	107	33			449	27,2	140,5	93,6	25,6
				tehnickog drveta). Srednja ugroženost od insekata. Srednja ugroženost od																			
				fitopatoloških oboljenja-obolјenja lista. srednje negovana sastojina.																			
				Stabla srebrna lipa su zakrivljena i sa srednjim padom precnika (srednja																			
				punodrvnost), sa srednje dugim krošnjama (dužine izmedu 1/3 i 1/2 visine																			
				stabala) i ekscentricnim krošnjama, do 10% oštecenih stabala od insekata																			
				i fitopatoloških obolenja, suvih i suhovrhih stabala ima do 10%,																			
				zdravstveno stanje stabala ove vrste drveca je dobro. Stabla kitnjaka su																			
				zakrivljena i sa srednjim padom precnika (srednja punodrvnost), sa																			
				srednje dugim krošnjama (dužine izmedu 1/3 i 1/2 visine stabala) i																			
				normalno razvijenim krošnjama, do 10% oštecenih stabala od insekata i																			
				fitopatoloških obolenja, suvih i suhovrhih stabala ima do 10%,																			
				zdravstveno stanje stabala ove vrste drveca je dobro. Stabla bukve su																			
				zakrivljena i sa srednjim padom precnika (srednja punodrvnost), sa																			
				srednje dugim krošnjama (dužine izmedu 1/3 i 1/2 visine stabala) i																			
				normalno razvijenim krošnjama, do 10% oštecenih stabala od vetra, snega i																			
				leda, suvih i suhovrhih stabala ima do 10%, zdravstveno stanje stabala																			
37	e	59288602	1,70	ove vrste drveca je dobro.																			
				Put.																			
37	1	59	0,07																				
				Šuma - nalazi se na strani i na strmom terenu (nagiba od 11° do 15°) -	1. Kit	0,6		75	28	16,7	11	7,5	5	27	51		32	42	158	0,7	0,2	0,6	1,3
				nagib konkavan (ugnut). Nadmorska visina 250 do 370m. Ekspozicija 1	2. SrLip	0,2			22	15,1	9	12,5	20	22	52		8	5	107	1,3	1,7	1,6	4,6
				jugozapadna. Mrtvi pokrivac slabo zastupljen - povoljan proces	3. Gr	0,1			14	12,4	10	17,5	13	11	28		5	5	62	1,5	1,9	1,9	5,7
				humifikacije. Retka prizemna vegetacija. Retko žbunje. Slaba	4. Cer	0,1			33	17,9	10	22,5	38	5	25	4	5		78	3,1	12,8	1,6	8,9
				zakorovljenost. tip šuma kitnjaka i graba sa lazarkinjom (Querco -	5. OTL				13	11,4	11	27,5	46	11	10		10	5	81	4,8	25,2	4,6	5,5
				Carpinetum asperulosum) na gajnjaci do lesiviranoj gajnjaci i lesiviranom	6. Bk				11	9,6	14	32,5	52			13			65	5,4	39,4		
				smedem zemljištu na serpentinitu ..								37,5	44	5		2			52	5,7	51,8	5,5	
												42,5	5	16		4			26	3,7	7,9	20,2	
				Izdanacka mešovita šuma kitnjaka (izdanacka šuma kitnjaka i lipe) -								47,5		5					5	1,0		9,4	
				jednodobna (u optimalnoj fazi). Ocuvana sastojina. Mešovita sastojina								UKUP.	224	102	166	24	59	58	632	27,1	140,8	45,4	26,0
				(smeša stablimicna) vrlo gustog sklopa (1.0). u celini zdravstveno stanje																			
				sastojine je dobro. po kvalitetu malo vredna sastojina (ima do 20%																			
				tehnickog drveta). Srednja ugroženost od insekata. Srednja ugroženost od																			
				fitopatoloških oboljenja-obolјenja lista. srednje negovana sastojina.																			
				Stabla graba su zakrivljena i sa velikim padom precnika (mala																			
				punodrvnost), sa vrlo dugim krošnjama (dužine preko 2/3 visine stabala) i																			

ОПИС СТАНИШТА И САСТОЈИНА

Ozn.mesta		gazdi-	površ-	OPIS	Osnovni taksacioni elementi						visi	deb.	Broj stabala po hektaru							G	Zapremina po		
ode-	od-	nska	ina		vrsta	sme	obr	sta-	sred.stablo		nski			Vrsta drveta						po		Vrsta drv	
ljenje	sek	klasa	ha		drveća	sa	ast	rost	Ds	Hs	step.	st.	1	2	3	4	5	6	svg.	ha	1	2	3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
				normalno razvijenim krošnjama, zdravstveno stanje stabala ove vrste																			
				drveca je dobro. Stabla kitnjaka su zakrivljena i sa srednjim padom																			
				precnika (srednja punodrvnost), sa srednje dugim krošnjama (dužine izmedu																			
				1/3 i 1/2 visine stabala) i normalno razvijenim krošnjama, do 10%																			
				oštecenih stabala od insekata i fitopatoloških obolenja, suvih i																			
				suhovrhih stabala ima do 10%, zdravstveno stanje stabala ove vrste																			
38	a	59307261	9,21	drveca je dobro.																			

Ozn.mesta		gazdi-	površ-	OPIS	Osnovni taksacioni elementi						visi	deb.	Broj stabala po hektaru							G	Zapremina po		
ode-	od-	nska	ina		vrsta	sme	obr	sta-	sred.stablo		nski			Vrsta drveta						po		Vrsta drv	
ljenje	sek	klasa	ha		drveća	sa	ast	rost	Ds	Hs	step.	st.	1	2	3	4	5	6	svg.	ha	1	2	3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
				Šuma - nalazi se na strani i na vrlo strmom terenu (nagiba od 26° do	1. Gr	0,5		75	17	13,8	11	7,5	104	6					110	0,5	2,9	0,1	
				30°) - nagib konkavan (ugnut). Nadmorska visina 265 do 300m.	2. SrLip	0,1			38	19,7	8	12,5	81		29	6			116	1,4	6,2		3,1
				Ekspozicija 1 zapadna. Mrtvi pokrivac slabo zastupljen - povoljan proces	3. Kit	0,3			23	15,9	10	17,5	53						53	1,3	8,9		
				humifikacije. Srednje gusta prizemna vegetacija. Retko žbunje. Slaba	4. Bk	0,1			28	17,5	13	22,5	77		86				162	6,5	25,5		29,4
				zakorovljenost. tip šume bukve i kitnjaka (Querco-Fagetum typicum) na								27,5	36			6			42	2,5	19,0		
				kiselom smedem i lesiviranom kiselom smedjem zemljištu..								32,5	35		29				63	5,2	24,7		25,7
												42,5	6	6		6			18	2,6	8,0	8,6	
				Izdanacka mešovita šuma graba (izdanacka šuma graba i kitnjaka) -								62,5		6					6	1,9		18,7	
				jednodobna (u optimalnoj fazi). Ocuvana sastojina. Mešovita sastojina								UKUP.	391	18	143	18			570	21,8	95,2	27,4	58,1
				(smeša stablimicna) potpunog sklopa (0.7). u celini zdravstveno stanje																			
				sastojine je dobro. po kvalitetu malo vredna sastojina (ima do 20%																			
				tehnickog drveta). Srednja ugroženost od insekata. Srednja ugroženost od																			
				fitopatoloških oboljenja-oboljenja lista. srednje negovana sastojina.																			
				Stabla graba su kriva i sa velikim padom precnika (mala punodrvnost), sa																			
				vrlo dugim krošnjama (dužine preko 2/3 visine stabala) i normalno																			
				razvijenim krošnjama, zdravstveno stanje stabala ove vrste drveca je																			
				dobro. Stabla kitnjaka su zakrivljena i sa srednjim padom precnika																			
				(srednja punodrvnost), sa srednje dugim krošnjama (dužine izmedu 1/3 i																			
				1/2 visine stabala) i normalno razvijenim krošnjama, do 10% oštecenih																			
				stabala od insekata i fitopatoloških obolenja, suvih i suhovrhih stabala																			
38	b	59176602	0,93	ima do 10%, zdravstveno stanje stabala ove vrste drveca je dobro.																			
				Put.																			
38	1	59	0,10																				
				Šuma - nalazi se na strani i na srednje strmom terenu (nagiba od 6° do	1. Kit	0,5		77	33	17,1	12	7,5		85	23	25	10	22	166	0,7		2,1	0,7
				10°) - nagib valovit. Nadmorska visina 305 do 405m. Ekspozicija 1	2. SrLip	0,4			19	14,0	8	12,5		44	27	14	7	14	106	1,3		3,5	2,0
				jugozapadna. Mrtvi pokrivac srednje zastupljen - povoljan proces	3. Gr				13	10,1	12	17,5		5	12	8		11	35	0,8		1,0	1,7
				humifikacije. Retka prizemna vegetacija. Retko žbunje. Nema	4. Cjas				12	9,0	12	22,5	6	17	6	4	2		35	1,4	1,5	4,7	1,9
				zakorovljenosti. tip šuma kitnjaka i graba sa lazarkinjom (Querco -	5. Bag				14	10,8	17	27,5	42	21			2		65	3,9	21,8	10,8	
				Carpinetum asperulosum) na gajnjaci do lesiviranoj gajnjaci i lesiviranom	6. OTL				11	8,8	12	32,5	56	29	2		2		89	7,4	41,7	22,1	1,7
				smedem zemljištu na serpentinitu ..								37,5	21	10					31	3,4	22,8	9,9	
												42,5	20	4					24	3,4	28,5	5,8	
				Izdanacka mešovita šuma kitnjaka (izdanacka šuma kitnjaka i lipe) -								47,5		8					8	1,4		14,2	
				jednodobna (u optimalnoj fazi). Ocuvana sastojina. Mešovita sastojina								52,5		2					2	0,5		5,0	
				(smeša stablimicna) gustog sklopa (0.8 - 0.9). u celini zdravstveno								57,5		2					2	0,5		5,9	
				stanje sastojine je dobro. po kvalitetu malo vredna sastojina (ima do 20%								UKUP.	144	227	70	51	24	47	562	24,7	116,2	85,0	7,9
				tehnickog drveta). Srednja ugroženost od insekata. Srednja ugroženost od																			
				fitopatoloških oboljenja-oboljenja lista. srednje negovana sastojina.																			
				Stabla srebrna lipa su zakrivljena i sa srednjim padom precnika (srednja																			
				punodrvnost), sa srednje dugim krošnjama (dužine izmedu 1/3 i 1/2 visine																			
				stabala) i normalno razvijenim krošnjama, zdravstveno stanje stabala ove																			
				vrste drveca je veoma dobro. Stabla kitnjaka su zakrivljena i sa srednjim																			
				padom precnika (srednja punodrvnost), sa srednje dugim krošnjama (dužine																			
				izmedu 1/3 i 1/2 visine stabala) i normalno razvijenim krošnjama, do 10%																			
				oštecenih stabala od insekata i fitopatoloških obolenja, suvih i																			
				suhovrhih stabala ima do 10%, zdravstveno stanje stabala ove vrste																			
39	a	59307261	9,63	drveca je dobro.																			

ОПИС СТАНИШТА И САСТОЈИНА

Ozn.mesta		gazdi-	površ-	OPIS	Osnovni taksacioni elementi						visi	deb.	Broj stabala po hektaru							G	Zapremina po		
ode-	od-	nska	ina		vrsta	sme	obr	sta-	sred.stablo		nski			Vrsta drveta						po		Vrsta drv	
ljenje	sek	klasa	ha		drveća	sa	ast	rost	Ds	Hs	step.	st.	1	2	3	4	5	6	svg.	ha	1	2	3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
				Šuma - nalazi se na strani i na strmom terenu (nagiba od 11° do 15°) -	1. Bk	0,7		77	20	14,6	11	7,5	65	15	32				112	0,5	1,9	0,2	1,0
				nagib valovit. Nadmorska visina 270 do 355m. Ekspozicija 1 zapadna.	2. Kit	0,3			25	18,3	8	12,5	75		84				159	1,9	4,8		6,7
				Mrtvi pokrivac srednje zastupljen - povoljan proces humifikacije. Retka	3. Gr	0,1			13	9,2	9	17,5	33	15					48	1,2	7,0	3,3	
				prizemna vegetacija. Retko žbunje. Nema zakorovljenosti. tip šume bukve i								22,5			27				27	1,1			10,7
				kitnjaka (Querco-Fagetum typicum) na kiselom smedem i lesiviranom kiselom								27,5	92	15					107	6,3	57,5	9,7	
				smedjem zemljištu..								32,5	26	18					43	3,6	25,7	15,4	
												37,5	15	15					30	3,3	16,5	19,3	
				Izdanacka mešovita šuma bukve (izdanacka šuma bukve i kitnjaka) -								42,5	6						6	0,8	10,7		
				jednodobna (u optimalnoj fazi). Ocuvana sastojina. Mešovita sastojina								UKUP.	312	77	143				532	18,7	124,2	47,9	18,4
				(smeša stablimicna) gustog sklopa (0.8 - 0.9). u celini zdravstveno																			
				stanje sastojine je dobro. po kvalitetu malo vredna sastojina (ima do 20%																			
				tehnickog drveta). Srednja ugroženost od insekata. od vetra. srednje																			
				negovana sastojina. Stabla kitnjaka su zakrivljena i sa srednjim padom																			
				precnika (srednja punodrvnost), sa srednje dugim krošnjama (dužine izmedu																			
				1/3 i 1/2 visine stabala) i normalno razvijenim krošnjama, do 10%																			
				oštecenih stabala od insekata i fitopatoloških obolenja, suvih i																			
				suhovrhih stabala ima do 10%, zdravstveno stanje stabala ove vrste																			
				drveca je dobro. Stabla bukve su zakrivljena i sa srednjim padom precnika																			
				(srednja punodrvnost), sa srednje dugim krošnjama (dužine izmedu 1/3 i																			
				1/2 visine stabala) i normalno razvijenim krošnjama, do 10% oštecenih																			
				stabala od vetra, snega i leda, suvih i suhovrhih stabala ima do 10%,																			
39	b	59361602	1,30	zdravstveno stanje stabala ove vrste drveca je dobro.																			

Ozn.mesta		gazdi-	površ-	OPIS	Osnovni taksacioni elementi						visi	deb.	Broj stabala po hektaru							G	Zapremina po		
ode-	od-	nska	ina		vrsta	sme	obr	sta-	sred.stablo		nski			Vrsta drveta						po		Vrsta drv	
ljenje	sek	klasa	ha		drveća	sa	ast	rost	Ds	Hs	step.	st.	1	2	3	4	5	6	svg.	ha	1	2	3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
				Šuma - nalazi se na strani i na strmom terenu (nagiba od 11° do 15°) -	1. Bk	0,7		111	39	22,1	12	7,5	24	166			6	16	211	0,9	0,3	4,1	
				nagib valovit. Nadmorska visina 285 do 355m. Ekspozicija 1 zapadna.	2. SrLip	0,2			16	13,4	9	12,5		16					16	0,2		1,0	
				Mrtvi pokrivac srednje zastupljen - povoljan proces humifikacije. Retka	3. Kit				58	22,5	11	17,5	6			6			12	0,3	1,2		
				prizemna vegetacija. Retko žbunje. Nema zakorovljenosti. tip šume bukve i	4. Gr				24	17,4	9	22,5	6			6			12	0,5	2,0		
				kitnjaka (Querco-Fagetum typicum) na kiselom smedem i lesiviranom kiselom	5. Slip				8			27,5		6					6	0,4		2,6	
				smedjem zemljištu..	6. PBr				8	6,4	9	32,5	12			6			18	1,5	10,7		
												37,5	12	22					33	3,7	15,9	20,2	
				Visoka šuma bukve, kitnjaka, cera i graba - jednodobna (u optimalnoj								42,5	24						24	3,4	38,6		
				fazi). Ocuvana sastojina. Mešovita sastojina (smeša stablimicna) gustog								47,5	12	31					43	7,6	24,0	51,9	
				sklopa (0.8 - 0.9). u celini zdravstveno stanje sastojine je dobro. po								57,5	16		6				22	5,6	51,4		16,8
				kvalitetu malo vredna sastojina (ima do 20% tehnickog drveta). Srednja								62,5	16						16	4,8	59,0		
				ugroženost od insekata. Srednja ugroženost od vetra. nenegovana								72,5	6						6	2,5	30,2		
				sastojina. Stabla srebrna lipa su zakrivljena i sa velikim padom								UKUP.	132	240	6	18	6	16	418	31,2	233,4	79,8	16,8
				precnika (mala punodrvnost), sa kratkim krošnjama (dužine izmedu 1/4 i1/3																			
				visine stabala), zdravstveno stanje stabala ove vrste drveca je dobro.																			
				Stabla bukve su zakrivljena i sa srednjim padom precnika (srednja																			
				punodrvnost), sa srednje dugim krošnjama (dužine izmedu 1/3 i 1/2 visine																			
				stabala) i normalno razvijenim krošnjama, do 10% oštecenih stabala od																			
				vetra, snega i leda, zdravstveno stanje stabala ove vrste drveca je																			
39	c	59353602	1,76	dobro.																			
				Put.																			
39	1	59	0,15																				
				Šuma - nalazi se na strani i na vrlo strmom terenu(nagiba od 16° do	1. Bk	0,7		120	34	22,7	10	7,5	18	42					60	0,3	0,4	1,3	
				20°) - nagib valovit. Nadmorska visina 290 do 350m. Ekspozicija 1	2. SrLip	0,2			25	18,9	6	12,5	6	6					12	0,1	0,4	0,5	
				jugozapadna. Ne postoji ugroženost od erozije - stablian teren u	3. Gr				21	16,2	8	17,5			6	6			12	0,3			1,5
				prirodnim uslovima. Mrtvi pokrivac slabo zastupljen - povoljan proces	4. Slip				18	14,0	6	22,5	18	6	12				36	1,4	7,8	2,1	4,0
				humifikacije. Srednje gusta prizemna vegetacija. Nema žbunja. Slaba								27,5	37						37	2,2	20,8		
				zakorovljenost. tip šume bukve i kitnjaka (Querco-Fagetum typicum) na								32,5	18						18	1,5	15,6		
				kiselom smedem i lesiviranom kiselom smedjem zemljištu..								37,5	18						18	2,0	22,2		
												42,5	12	12					24	3,5	21,7	16,8	
				Izdanacka mešovita šuma bukve (izdanacka šuma bukve i lipe) - jednodobna								47,5	36	12					48	8,5	82,4	22,0	
				(u fazi razgradnje). Razredjena sastojina. Mešovita sastojina (smeša								52,5	6	6					12	2,5	15,5	13,3	
				stablimicna) retkog sklopa (0.5). u celini zdravstveno stanje sastojine								57,5	12						12	3,2	44,3		
				je dobro. po kvalitetu malo vredna sastojina (ima do 20% tehnickog								62,5		6					6	1,9		20,3	
				drveta). Srednja ugroženost od insekata. Srednja ugroženost od drugih								UKUP.	181	91	18	6			296	27,4	231,1	76,4	5,5
				štetnih uticaja. srednje negovana sastojina. Stabla srebrna lipa su																			
				zakrivljena i sa srednjim padom precnika (srednja punodrvnost), sa																			
				srednje dugim krošnjama (dužine izmedu 1/3 i 1/2 visine stabala) i																			
				normalno razvijenim krošnjama, do 10% oštecenih stabala od insekata i																			
				fitopatoloških obolenja, suvih i suhovrhih stabala ima do 10%,																			
				zdravstveno stanje stabala ove vrste drveca je dobro. Stabla bukve su																			
				zakrivljena i sa velikim padom precnika (mala punodrvnost), sa srednje																			
				dugim krošnjama (dužine izmedu 1/3 i 1/2 visine stabala) i normalno																			
				razvijenim krošnjama, do 10% oštecenih stabala od insekata i																			
				fitopatoloških obolenja, suvih i suhovrhih stabala ima do 10%,																			
40	a	59361602	0,89	zdravstveno stanje stabala ove vrste drveca je dobro.																			

ОПИС СТАНИШТА И САСТОЈИНА

Ozn.mesta		gazdi-	površ-	OPIS	Osnovni taksacioni elementi						visi	deb.	Broj stabala po hektaru							G	Zapremina po		
ode-	od-	nska	ina		vrsta	sme	obr	sta-	sred.stablo		nski			Vrsta drveta						po		Vrsta drv	
ljenje	sek	klasa	ha		drveća	sa	ast	rost	Ds	Hs	step.	st.	1	2	3	4	5	6	svg.	ha	1	2	3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
				Šuma - nalazi se na strani i na strmom terenu (nagiba od 11° do 15°) -	1. Kit	0,8		120	35	20,0	10	7,5		295	127	21	48	11	502	2,2		6,8	2,7
				nagib konveksan (ispupcen). Nadmorska visina 320 do 400m. Ekspozicija 1	2. SrLip	0,2			11	12,7	8	12,5		69	16	15	5		105	1,3		5,3	1,4
				jugozapadna. Ne postoji ugroženost od erozije - stablian teren u	3. Cjas				8	10,1	10	17,5		27				5	32	0,8		4,5	
				prirodnim uslovima. Mrtvi pokrivac slabo zastupljen - povoljan proces	4. OTL				11	12,6	10	22,5	10	26		5			41	1,6	4,0	7,8	
				humifikacije. Srednje gusta prizemna vegetacija. Nema žbunja. Slaba	5. Gr				8	10,0	10	27,5	25	5					30	1,8	13,8	2,1	
				zakorovljenost. tip šume kitnjaka (Quercetum montanum cariecetosum	6. Tre				11	12,4	13	32,5	31	10					41	3,4	25,8	7,5	
				pilosae) na gajnjaci do lesiviranoj gajnjaci..								37,5	32						32	3,5	35,2		
												42,5	27						27	3,8	39,8		
				Izdanacka šuma kitnjaka (izdanacka šuma kitnjaka i lipe) - jednodobna (u								47,5	10						10	1,8	22,6		
				fazi razgradnje). Razredjena sastojina. Mešovita sastojina (smeša								UKUP.	135	432	143	41	53	16	820	20,2	141,2	33,9	4,1
				stablimicna) retkog sklopa (0.5). u celini zdravstveno stanje sastojine																			
				je dobro. po kvalitetu malo vredna sastojina (ima do 20% tehnickog																			
				drveta). Srednja ugroženost od insekata. Srednja ugroženost od drugih																			
				štetnih uticaja. srednje negovana sastojina. Stabla srebrna lipa su																			
				zakrivljena i sa srednjim padom precnika (srednja punodrvnost), sa																			
				srednje dugim krošnjama (dužine izmedu 1/3 i 1/2 visine stabala) i																			
				normalno razvijenim krošnjama, do 10% oštecenih stabala od insekata i																			
				fitopatoloških obolenja, suvih i suhovrhih stabala ima do 10%,																			
				zdravstveno stanje stabala ove vrste drveca je dobro. Stabla kitnjaka su																			
				zakrivljena i sa srednjim padom precnika (srednja punodrvnost), sa																			
				srednje dugim krošnjama (dužine izmedu 1/3 i 1/2 visine stabala) i																			
				normalno razvijenim krošnjama, do 10% oštecenih stabala od insekata i																			
				fitopatoloških obolenja, suvih i suhovrhih stabala ima do 10%,																			
40	b	59306484	5,73	zdravstveno stanje stabala ove vrste drveca je dobro.																			

Ozn.mesta		gazdi-	površ-	OPIS	Osnovni taksacioni elementi						visi	deb.	Broj stabala po hektaru							G	Zapremina po		
ode-	od-	nska	ina		vrsta	sme	obr	sta-	sred.stablo		nski			Vrsta drveta						po		Vrsta drv	
ljenje	sek	klasa	ha		drveća	sa	ast	rost	Ds	Hs	step.	st.	1	2	3	4	5	6	svg.	ha	1	2	3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
				Šuma - nalazi se na platou i na blago nagnutom terenu (nagiba do 5°) -	1. Kit			7															
				nagib ujednacen. Nadmorska visina 390 do 425m. Ekspozicija 1																			
				jugozapadna. Ne postoji ugroženost od erozije - stablian teren u																			
				prirodnim uslovima. Mrtvi pokrivac slabo zastupljen - povoljan proces																			
				humifikacije. tip šume bukve i kitnjaka (Querco-Fagetum typicum) na																			
				kiselom smedem i lesiviranom kiselom smedjem zemljištu..																			
				Visoka šuma bukve, kitnjaka, cera i graba - jednodobna (u fazi																			
				razgradnje). Ocuvana sastojina. Cista sastojina (smeša stablimicna)																			
				potpunog sklopa (0.7). u celini zdravstveno stanje sastojine je osrednje.																			
				po kvalitetu malo vredna sastojina (ima do 20% tehnickog drveta). Srednja																			
				ugroženost od insekata. Srednja ugroženost od drugih štetnih uticaja.																			
40	c	59353602	5,21	pogrešno negovana sastojina. 0.																			
				Šuma - nalazi se na strani i na vrlo strmom terenu(nagiba od 16° do	1. Kit			16																
				20°) - nagib valovit. Nadmorska visina 326 do 395m. Ekspozicija 1																			
				jugozapadna. tip šume kitnjaka (Quercetum montanum serpentinicum) na																			
				lesiviranom smedem zemljištu na serpentinitu..																			
				Visoka šuma kitnjaka - jednodobna (podmladak u ranom periodu - dobro																			
				obraslo). Ocuvana sastojina. Mešovita sastojina (smeša stablimicna)																			
				potpunog sklopa (0.7). po kvalitetu sastojina bez vrednosti (bez ucešca																			
				tehnickog drveta). Srednja ugroženost od insekata. srednje negovana																			
40	d	59301485	2,02	sastojina.																			
				Šuma - nalazi se na strani i na vrlo strmom terenu(nagiba od 16° do	1. Kit	0,6		120	31	20,3	9	7,5		129	120	4	9	10	271	1,2		3,5	2,2
				20°) - nagib valovit. Nadmorska visina 320 do 415m. Ekspozicija 1	2. Gr	0,2			15	12,2	9	12,5		40	37	7			84	1,0		3,2	2,4
				jugozapadna. Ne postoji ugroženost od erozije - stablian teren u	3. SrLip	0,1			11	8,9	7	17,5	9	27		4			40	1,0	1,9	4,6	
				prirodnim uslovima. Mrtvi pokrivac slabo zastupljen - povoljan proces	4. Bk				20	15,4	12	22,5	40	60	4	11	9		123	4,9	12,6	19,3	1,2
				humifikacije. Srednje gusta prizemna vegetacija. Retko žbunje. Slaba	5. Cjas				15	12,3	9	27,5	38	20					58	3,4	24,5	12,7	
				zakorovljenost. tip šume bukve i kitnjaka (Querco-Fagetum typicum) na	6. Tre				8	6,1	12	32,5	10						10	0,8	8,7		
				gajnjaci do lesiviranoj gajnjaci i eutricnim smedim do lesiviranim								37,5	32						32	3,5	43,7		
				eutricnim smedjim zemljištima..								42,5	19	10	4	4			36	5,1	33,2	14,4	5,0
												47,5	14		4				17	3,0	31,7		6,8
				Izdanacka mešovita šuma kitnjaka (izdanacka šuma kitnjaka, graba i lipe)								UKUP.	161	285	168	29	18	10	670	24,0	156,3	57,8	17,7
				- jednodobna (u fazi razgradnje). Razredjena sastojina. Mešovita																			
				sastojina (smeša stablimicna) retkog sklopa (0.5). u celini zdravstveno																			
				stanje sastojine je dobro. po kvalitetu malo vredna sastojina (ima do 20%																			
				tehnickog drveta). Srednja ugroženost od insekata. Srednja ugroženost od																			
				drugih štetnih uticaja. pogrešno negovana sastojina. Stabla graba su																			
				zakrivljena i sa srednjim padom precnika (srednja punodrvnost), sa																			
				srednje dugim krošnjama (dužine izmedu 1/3 i 1/2 visine stabala) i																			
				normalno razvijenim krošnjama, do 10% oštecenih stabala od insekata,																			
				suvih i suhovrhih stabala ima do 10%, zdravstveno stanje stabala ove																			
				vrste drveca je osrednje. Stabla srebrna lipa su zakrivljena i sa																			
				srednjim padom precnika (srednja punodrvnost), sa srednje dugim krošnjama																			
				(dužine izmedu 1/3 i 1/2 visine stabala) i normalno razvijenim krošnjama,																			
				do 10% oštecenih stabala od insekata, suvih i suhovrhih stabala ima do																			
				10%, zdravstveno stanje stabala ove vrste drveca je osrednje. Stabla																			
				kitnjaka su zakrivljena i sa srednjim padom precnika (srednja																			

ОПИС СТАНИШТА И САСТОЈИНА

Ozn.mesta		gazdi-	površ-	OPIS	Osnovni taksacioni elementi						visi	deb.	Broj stabala po hektaru							G	Zapremina po		
ode-	od-	nska	ina		vrsta	sme	obr	sta-	sred.stablo		nski			Vrsta drveta						po		Vrsta drv	
ljenje	sek	klasa	ha		drveća	sa	ast	rost	Ds	Hs	step.	st.	1	2	3	4	5	6	svg.	ha	1	2	3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
				punodrvnost), sa srednje dugim krošnjama (dužine izmedu 1/3 i 1/2 visine																			
				stabala) i normalno razvijenim krošnjama, do 10% oštecenih stabala od																			
				insekata i fitopatoloških obolenja, suvih i suhovrhih stabala ima do 10%,																			
				zdravstveno stanje stabala ove vrste drveca je dobro. Stabla bukve su																			
				zakrivljena i sa srednjim padom precnika (srednja punodrvnost), sa																			
				srednje dugim krošnjama (dužine izmedu 1/3 i 1/2 visine stabala) i																			
				normalno razvijenim krošnjama, do 10% oštecenih stabala od insekata i																			
				fitopatoloških obolenja, suvih i suhovrhih stabala ima do 10%,																			
40	e	59307601	2,10	zdravstveno stanje stabala ove vrste drveca je dobro.																			
				Šuma - nalazi se na strani i na vrlo strmom terenu(nagiba od 16° do	1. Kit			16																
				20°) - nagib valovit. Nadmorska visina 365 do 395m. Ekspozicija 1																			
				jugozapadna. Ne postoji ugroženost od erozije - stablian teren u																			
				prirodnim uslovima. Mrtvi pokrivac slabo zastupljen - povoljan proces																			
				humifikacije. Retka prizemna vegetacija. Retko žbunje. Slaba																			
				zakorovljenost. tip šume kitnjaka (Quercetum montanum serpentinicum) na																			
				lesiviranom smedem zemljištu na serpentinitu..																			
				Visoka šuma kitnjaka - jednodobna (podmladak u ranom periodu - dobro																			
				obraslo). Ocuvana sastojina. Cista sastojina (smeša grupimicna) vrlo																			
				gustog sklopa (1.0). u celini zdravstveno stanje sastojine je dobro. po																			
				kvalitetu sastojina bez vrednosti (bez ucešca tehnickog drveta). Srednja																			
				ugroženost od insekata. Srednja ugroženost od drugih štetnih uticaja.																			
40	f	59301485	1,02	pogrešno negovana sastojina.																			

ОПИС СТАНИШТА И САСТОЈИНА

Ozn.mesta		gazdi-	površ-	OPIS	Osnovni taksacioni elementi						visi	deb.	Broj stabala po hektaru							G	Zapremina po		
ode-	od-	nska	ina		vrsta	sme	obr	sta-	sred.stablo		nski			Vrsta drveta						po		Vrsta drv	
ljenje	sek	klasa	ha		drveća	sa	ast	rost	Ds	Hs	step.	st.	1	2	3	4	5	6	svg.	ha	1	2	3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
				Šuma - nalazi se na strani i na vrlo strmom terenu(nagiba od 16° do	1. Kit	0,6		14	38	20,3	11	7,5		366		89	45	28	528	2,3		8,7	
				20°) - nagib izlomljen. Ekspozicija 1 jugozapadna. Ne postoji ugroženost	2. SrLip	0,2			10	9,4	9	12,5		73					73	0,9		4,1	
				od erozije - stablian teren u prirodnim uslovima. Mrtvi pokrivac slabo	3. Bk	0,1			38	21,8	12	17,5		14					14	0,3		2,3	
				zastupljen - povoljan proces humifikacije. Retka prizemna vegetacija.	4. Gr				10	7,2	9	22,5				15			15	0,6			
				Retko žbunje. Slaba zakorovljenost. tip šume bukve i kitnjaka	5. Klen				8	7,2	11	27,5	15	14					29	1,7	7,7	6,9	
				(Querco-Fagetum typicum) na kiselom smedem i lesiviranom kiselom smedjem	6. Cjas				8	7,9	12	32,5	14						14	1,2	12,1		
				zemljištu..								37,5	44		15				59	6,5	50,7		19,3
												42,5	15	14					29	4,1	20,3	18,2	
				Izdanacka mešovita šuma kitnjaka (izdanacka šuma kitnjaka i lipe) -								47,5	15						15	2,6	29,6		
				jednodobna (u fazi izgradnje). Ocuvana sastojina. Mešovita sastojina								UKUP.	103	482	15	104	45	28	776	20,3	120,3	40,2	19,3
				(smeša stablimicna) gustog sklopa (0.8 - 0.9). u celini zdravstveno																			
				stanje sastojine je dobro. po kvalitetu sastojina bez vrednosti (bez																			
				ucešca tehnickog drveta). Srednja ugroženost od insekata. Srednja																			
				ugroženost od drugih štetnih uticaja. nenegovana sastojina. Stabla																			
				srebrna lipa su zakrivljena i sa srednjim padom precnika (srednja																			
				punodrvnost), sa srednje dugim krošnjama (dužine izmedu 1/3 i 1/2 visine																			
				stabala) i normalno razvijenim krošnjama, do 10% oštecenih stabala od																			
				insekata i fitopatoloških obolenja, suvih i suhovrhih stabala ima do 10%,																			
				zdravstveno stanje stabala ove vrste drveca je dobro. Stabla kitnjaka su																			
				zakrivljena i sa srednjim padom precnika (srednja punodrvnost), sa																			
				srednje dugim krošnjama (dužine izmedu 1/3 i 1/2 visine stabala) i																			
				normalno razvijenim krošnjama, do 10% oštecenih stabala od insekata i																			
				fitopatoloških obolenja, suvih i suhovrhih stabala ima do 10%,																			
40	g	59307602	0,94	zdravstveno stanje stabala ove vrste drveca je dobro.																			
				Šuma - nalazi se na strani i na vrlo strmom terenu(nagiba od 16° do	1. Gr	0,3		16	9	8,9	10	7,5	272	135		106	45	46	604	2,7	7,3	2,9	
				20°) - nagib ujednacen. Nadmorska visina 370 do 440m. Ekspozicija 1	2. SrLip	0,3			11	10,1	8	12,5	92	30	46	30	30	16	244	3,0	8,1	2,3	3,4
				južna. - povoljan proces humifikacije. tip šume kitnjaka (Quercetum	3. Tre	0,1			14	11,7	13	17,5			16		16		31	0,7			3,0
				montanum serpentinicum) na lesiviranom smedem zemljištu na serpentinitu..	4. Klen	0,1			9	8,3	10	22,5	16	16					31	1,2	5,2	3,9	
					5. Cjas	0,1			11	10,0	10	27,5		15					15	0,9		9,0	
				Izdanacka mešovita šuma graba (izdanacka šuma graba i lipe) - jednodobna	6. OTL	0,1			9	8,4	9												
				(u fazi izgradnje). Ocuvana sastojina. Mešovita sastojina (smeša								UKUP.	379	195	62	137	91	61	925	8,5	20,6	18,2	6,5
				stablimicna) gustog sklopa (0.8 - 0.9). u celini zdravstveno stanje																			
				sastojine je osrednje. po kvalitetu sastojina bez vrednosti (bez ucešca																			
				tehnickog drveta). Srednja ugroženost od insekata. Srednja ugroženost od																			
				drugih štetnih uticaja. nenegovana sastojina. Stabla graba su																			
				zakrivljena i sa srednjim padom precnika (srednja punodrvnost), sa																			
				srednje dugim krošnjama (dužine izmedu 1/3 i 1/2 visine stabala) i																			
				normalno razvijenim krošnjama, do 10% oštecenih stabala od insekata,																			
				suvih i suhovrhih stabala ima do 10%, zdravstveno stanje stabala ove																			
				vrste drveca je osrednje. Stabla srebrna lipa su zakrivljena i sa																			
				srednjim padom precnika (srednja punodrvnost), sa kratkim krošnjama																			
				(dužine izmedu 1/4 i1/3 visine stabala) i uskim krošnjama, do 10%																			
				oštecenih stabala od insekata, suvih i suhovrhih stabala ima do 10%,																			
40	h	59176485	1,48	zdravstveno stanje stabala ove vrste drveca je osrednje.																			
				Put.																			
40	1	59	0,15																				

ОПИС СТАНИШТА И САСТОЈИНА

Ozn.mesta		gazdi-	površ-	OPIS	Osnovni taksacioni elementi						visi	deb.	Broj stabala po hektaru							G	Zapremina po		
ode-	od-	nska	ina		vrsta	sme	obr	sta-	sred.stablo		nski			Vrsta drveta						po		Vrsta drv	
ljenje	sek	klasa	ha		drveća	sa	ast	rost	Ds	Hs	step.	st.	1	2	3	4	5	6	svg.	ha	1	2	3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
				Šuma - nalazi se na strani i na srednje strmom terenu (nagiba od 6° do	1. Bag	0,4		33	18	16,3	14	7,5	46	19					64	0,3	1,2	0,5	
				10°) - nagib ujednacen. Nadmorska visina 320 do 370m. Ekspozicija 1	2. Gr	0,2			18	16,2	8	12,5	30	25			15	15	85	1,0	2,8	2,3	
				istok - severoistok. Mrtvi pokrivac srednje zastupljen - povoljan proces	3. Bk	0,2			38	23,7	10	17,5	43	33					76	1,8	9,0	6,6	
				humifikacije. Srednje gusta prizemna vegetacija. Srednje gusto žbunje.	4. SrLip	0,1			48	25,8	5	22,5	40	34					74	2,9	15,9	12,9	
				Nema zakorovljenosti. tip šume bukve i kitnjaka (Querco-Fagetum typicum)	5. Klen	0,1			25	19,6	8	27,5	42	15	15				72	4,3	28,2	7,5	10,1
				na gajnjaci do lesiviranoj gajnjaci i eutricnim smedim do lesiviranim	6. OTL				13	12,1	7	32,5	13	6					19	1,6	12,6	6,2	
				eutricnim smedjim zemljištima..								37,5					15		15	1,7			
												47,5			15	15			30	5,3			34,4
				Izdanacka mešovita šuma bagrema - jednodobna (u optimalnoj fazi). Ocuvana								UKUP.	213	131	30	15	30	15	434	18,9	69,7	35,9	44,5
				sastojina. Mešovita sastojina (smeša stablimicna) vrlo gustog sklopa																			
				(1.0). u celini zdravstveno stanje sastojine je dobro. po kvalitetu																			
				sastojina bez vrednosti (bez ucešca tehnickog drveta). Srednja ugroženost																			
				od insekata. Srednja ugroženost od drugih štetnih uticaja. srednje																			
				negovana sastojina. Stabla graba su zakrivljena i sa velikim padom																			
				precnika (mala punodrvnost), sa srednje dugim krošnjama (dužine izmedu																			
				1/3 i 1/2 visine stabala) i preširokim krošnjama, zdravstveno stanje																			
				stabala ove vrste drveca je dobro. Stabla bagrema su zakrivljena i sa																			
				srednjim padom precnika (srednja punodrvnost), sa kratkim krošnjama																			
				(dužine izmedu 1/4 i1/3 visine stabala) i uskim krošnjama, zdravstveno																			
41	a	59326601	0,99	stanje stabala ove vrste drveca je dobro.																			

ОПИС СТАНИШТА И САСТОЈИНА

Ozn.mesta		gazdi-	površ-	OPIS	Osnovni taksacioni elementi						visi	deb.	Broj stabala po hektaru							G	Zapremina po		
ode-	od-	nska	ina		vrsta	sme	obr	sta-	sred.stablo		nski			Vrsta drveta						po		Vrsta drv	
ljenje	sek	klasa	ha		drveća	sa	ast	rost	Ds	Hs	step.	st.	1	2	3	4	5	6	svg.	ha	1	2	3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
				Šuma - nalazi se na strani i na srednje strmom terenu (nagiba od 6° do	1. SrLip	0,5		73	23	15,4	9	7,5	61	43			6	6	110	0,5	1,1	0,6	
				10°) - nagib ujednacen. Nadmorska visina 305 do 370m. Ekspozicija 1	2. Bk	0,2			20	14,4	15	12,5	67	18			6		92	1,1	4,3	1,2	
				istok - severoistok. Mrtvi pokrivac srednje zastupljen - povoljan proces	3. Kit	0,2			27	16,5	11	17,5		12	15				28	0,7		1,7	1,9
				humifikacije. Srednje gusta prizemna vegetacija. Srednje gusto žbunje.	4. Jas	0,1			53	20,4	16	22,5	6		15				21	0,8	1,7		3,8
				Nema zakorovljenosti. tip šume kitnjaka (Quercetum montanum cariecetosum	5. Gr				20	14,4	12	27,5	24	12	12		6		55	3,3	13,0	7,2	6,7
				pilosae) na gajnjaci do lesiviranoj gajnjaci..	6. Brk				8	7,0	12	32,5	46	6	37				88	7,3	32,5	4,6	29,4
												37,5	18	12					31	3,4	17,9	12,2	
				Izdanacka mešovita šuma lipa - jednodobna (u optimalnoj fazi). Ocuvana								42,5	27						27	3,9	35,2		
				sastojina. Mešovita sastojina (smeša stablimicna) vrlo gustog sklopa								47,5	6	12					18	3,2	9,7	22,2	
				(1.0). u celini zdravstveno stanje sastojine je dobro. po kvalitetu								52,5	6			6			12	2,6	12,8		
				srednjevredna sastojina (ima od 21-40% tehnickog drveta). Srednja								UKUP.	262	116	79	6	12	6	482	26,8	128,0	49,7	41,7
				ugroženost od insekata. Srednja ugroženost od fitopatoloških																			
				oboljenja-oboljenja lista. srednje negovana sastojina. Stabla srebrna																			
				lipa su zakrivljena i sa srednjim padom precnika (srednja punodrvnost),																			
				sa srednje dugim krošnjama (dužine izmedu 1/3 i 1/2 visine stabala) i																			
				ekscentricnim krošnjama, zdravstveno stanje stabala ove vrste drveca je																			
				dobro. Stabla kitnjaka su zakrivljena i sa velikim padom precnika (mala																			
				punodrvnost), sa srednje dugim krošnjama (dužine izmedu 1/3 i 1/2 visine																			
				stabala) i normalno razvijenim krošnjama, do 10% oštecenih stabala od																			
				insekata i fitopatoloških obolenja, suvih i suhovrhih stabala ima do 10%,																			
41	b	59288484	0,96	zdravstveno stanje stabala ove vrste drveca je dobro.																			
				Šuma - nalazi se na gredi i na blago nagnutom terenu (nagiba do 5°) -	1. SrLip	0,6		90	21	15,5	7	7,5	164	23		105	23	23	338	1,5	4,3	0,3	
				nagib ujednacen. Nadmorska visina 270 do 360m. Ekspozicija 1	2. OTL	0,2			25	17,8	9	12,5	11	11	11	57	23	11	125	1,5	0,7	0,9	1,0
				jugoistocna. Mrtvi pokrivac srednje zastupljen - povoljan proces	3. Cjas	0,1			25	18,0	9	17,5	12	11		11	35	12	81	2,0	2,2	2,7	
				humifikacije. Gusta prizemna vegetacija. Gusto žbunje. Nema	4. Bag				10	7,6	15	22,5	12		11			11	35	1,4	3,6		3,2
				zakorovljenosti. tip šume kitnjaka (Quercetum montanum cariecetosum	5. Gr				13	10,5	9	27,5	12	12	11				35	2,1	6,4	7,5	6,4
				pilosae) na gajnjaci do lesiviranoj gajnjaci..	6. Bk				14	10,8	12	32,5	35	23					58	4,8	32,4	18,3	
												37,5	47	11	12				71	7,8	49,5	15,2	14,3
				Izdanacka mešovita šuma lipa - jednodobna (u fazi razgradnje). Ocuvana								42,5	23						23	3,3	37,6		
				sastojina. Mešovita sastojina (smeša stablimicna) gustog sklopa (0.8 -								47,5		12					12	2,1		27,5	
				0.9). u celini zdravstveno stanje sastojine je dobro. po kvalitetu malo								57,5	12						12	3,1	31,8		
				vredna sastojina (ima do 20% tehnickog drveta). Srednja ugroženost od								UKUP.	330	103	46	173	81	58	791	29,6	168,4	72,3	24,8
				insekata. Mala ugroženost od fitopatoloških oboljenja-oboljenja lista.																			
				srednje negovana sastojina. Stabla srebrna lipa su zakrivljena i sa																			
				srednjim padom precnika (srednja punodrvnost), sa srednje dugim krošnjama																			
				(dužine izmedu 1/3 i 1/2 visine stabala) i ekscentricnim krošnjama, do																			
				10% oštecenih stabala od vetra, snega i leda, suvih i suhovrhih stabala																			
41	c	59288484	1,85	ima do 10%, zdravstveno stanje stabala ove vrste drveca je dobro.																			
				Šuma - nalazi se na strani i na vrlo strmom terenu(nagiba od 16° do	1. Bk	0,6		80	32	19,3	13	7,5	18	60	9				87	0,4	0,3	1,3	0,2
				20°) - nagib ujednacen. Nadmorska visina 255 do 310m. Ekspozicija 1	2. SrLip	0,2			20	15,7	8	12,5	11	3	25		6		45	0,5	0,8	0,2	1,9
				jugoistocna. Mrtvi pokrivac srednje zastupljen - povoljan proces	3. Gr	0,2			22	16,5	10	17,5	9	12	16				36	0,9	1,7	1,7	2,8
				humifikacije. Retka prizemna vegetacija. Retko žbunje. Nema	4. Kit	0,1			44	21,8	10	22,5	11	2	16		6		36	1,4	3,8	0,6	4,9
				zakorovljenosti. tip šume bukve i kitnjaka (Querco-Fagetum typicum) na	5. Cjas				18	14,5	10	27,5	2	9	22				33	1,9	1,5	5,2	11,2
				gajnjaci do lesiviranoj gajnjaci i eutricnim smedim do lesiviranim								32,5	24	11	11	3			49	4,0	18,3	8,0	9,1
				eutricnim smeđjim zemljištima..								37,5	10	6	13				29	3,2	11,9	7,3	13,3
												42,5	14	14		3			30	4,2	22,1	19,0	
				Izdanacka mešovita šuma bukve (izdanacka šuma bukve, graba i lipe) -								47,5	13						13	2,4	26,6		
				jednodobna (u optimalnoj fazi). Ocuvana sastojina. Mešovita sastojina								52,5	16						16	3,5	41,6		

ОПИС СТАНИШТА И САСТОЈИНА

Ozn.mesta		gazdi-	površ-	OPIS	Osnovni taksacioni elementi						visi	deb.	Broj stabala po hektaru							G	Zapremina po		
ode-	od-	nska	ina		vrsta	sme	obr	sta-	sred.stablo		nski			Vrsta drveta						po		Vrsta drv	
ljenje	sek	klasa	ha		drveća	sa	ast	rost	Ds	Hs	step.	st.	1	2	3	4	5	6	svg.	ha	1	2	3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
				(smeša stablimicna) gustog sklopa (0.8 - 0.9). u celini zdravstveno								57,5		5		3			8	2,0		14,4	
				stanje sastojine je dobro. po kvalitetu malo vredna sastojina (ima do 20%								62,5	3						3	0,8	10,6		
				tehnickog drveta). Srednja ugroženost od insekata. Srednja ugroženost od								77,5	3						3	1,3	16,7		
				drugih štetnih uticaja. srednje negovana sastojina. Stabla graba su								UKUP.	134	122	112	8	12		387	26,7	155,9	57,7	43,4
				zakrivljena i sa velikim padom precnika (mala punodrvnost), sa vrlo dugim																			
				krošnjama (dužine preko 2/3 visine stabala) i normalno razvijenim																			
				krošnjama, zdravstveno stanje stabala ove vrste drveca je dobro. Stabla																			
				srebrna lipa su zakrivljena i sa srednjim padom precnika (srednja																			
				punodrvnost), sa srednje dugim krošnjama (dužine izmedu 1/3 i 1/2 visine																			
				stabala) i ekscentricnim krošnjama, zdravstveno stanje stabala ove vrste																			
				drveca je dobro. Stabla bukve su zakrivljena i sa srednjim padom precnika																			
				(srednja punodrvnost), sa srednje dugim krošnjama (dužine izmedu 1/3 i																			
				1/2 visine stabala) i normalno razvijenim krošnjama, zdravstveno stanje																			
41	d	59361601	3,53	stabala ove vrste drveca je dobro.																			

Ozn.mesta		gazdi-	površ-	OPIS	Osnovni taksacioni elementi						visi	deb.	Broj stabala po hektaru							G	Zapremina po		
ode-	od-	nska	ina		vrsta	sme	obr	sta-	sred.stablo		nski			Vrsta drveta						po		Vrsta drv	
ljenje	sek	klasa	ha		drveća	sa	ast	rost	Ds	Hs	step.	st.	1	2	3	4	5	6	svg.	ha	1	2	3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
				Šuma - nalazi se na grebenu i na strmom terenu (nagiba od 11° do 15°) -	1. SrLip	0,5		20	19	12,5	7	7,5	57	13	13		19	13	115	0,5	1,6	0,2	0,2
				nagib konveksan (ispupcen). Nadmorska visina 270 do 370m. Ekspozicija 1	2. Bag	0,2			18	11,6	16	12,5	38	19	13		7		76	0,9	3,5	1,7	1,0
				južna. Mrtvi pokrivac srednje zastupljen - povoljan proces humifikacije.	3. Klen	0,1			18	12,1	10	17,5		19	6		7	7	39	0,9		3,7	0,9
				Gusta prizemna vegetacija. Srednje gusto žbunje. Nema zakorovljenosti.	4. Kit	0,1			40	23,7	9	22,5	6	26					32	1,3	2,5	9,1	
				tip šume kitnjaka (Quercetum montanum typicum) na kiselom smedem i	5. Cjas				13	8,5	10	27,5					6		6	0,4			
				lesiviranom kiselom smedjem zemljištu..	6. OTL				11	6,6	9	32,5	6	6	6				19	1,6	5,3	5,9	4,7
												37,5	7		7	6			20	2,1	7,7		7,0
				Izdanacka mešovita šuma lipa - jednodobna (u optimalnoj fazi). Ocuvana								42,5	12			6			19	2,7	17,9		
				sastojina. Mešovita sastojina (smeša stablimicna) gustog sklopa (0.8 -								47,5	13						13	2,3	22,5		
				0.9). u celini zdravstveno stanje sastojine je dobro. po kvalitetu malo								UKUP.	139	84	45	13	39	20	338	12,7	61,1	20,5	13,8
				vredna sastojina (ima do 20% tehnickog drveta). Srednja ugroženost od																			
				insekata. Mala ugroženost od fitopatoloških oboljenja-oboljenja lista.																			
				srednje negovana sastojina. Stabla srebrna lipa su zakrivljena i sa																			
				velikim padom precnika (mala punodrvnost), sa srednje dugim krošnjama																			
				(dužine izmedu 1/3 i 1/2 visine stabala), zdravstveno stanje stabala ove																			
				vrste drveca je dobro. Stabla kitnjaka su zakrivljena i sa velikim padom																			
				precnika (mala punodrvnost), sa srednje dugim krošnjama (dužine izmedu																			
				1/3 i 1/2 visine stabala) i normalno razvijenim krošnjama, do 10%																			
				oštecenih stabala od insekata i fitopatoloških obolenja, suvih i																			
				suhovrhih stabala ima do 10%, zdravstveno stanje stabala ove vrste																			
41	e	59288482	1,62	drveca je dobro.																			
				Šuma - nalazi se na strani i na vrlo strmom terenu(nagiba od 16° do	1. Kit	0,6		89	31	18,9	10	7,5		189	9	61	63	36	359	1,6		5,2	0,1
				20°) - nagib konveksan (ispupcen). Nadmorska visina 325 do 410m.	2. SrLip	0,2			13	10,3	7	12,5	9	81		17	9		116	1,4	0,8	6,8	
				Ekspozicija 1 jugozapadna. Mrtvi pokrivac srednje zastupljen - povoljan	3. OTL	0,1			28	17,6	10	17,5	27	9					36	0,9	5,3	2,1	
				proces humifikacije. Srednje gusta prizemna vegetacija. Gusto žbunje.	4. Cjas				9	5,8	11	22,5	18	28					45	1,8	6,5	9,5	
				Nema zakorovljenosti. tip šume kitnjaka (Quercetum montanum typicum) na	5. Brk				8	5,4	11	27,5	27	36					63	3,7	14,6	18,5	
				kiselom smedem i lesiviranom kiselom smedjem zemljištu..	6. Gr				8	4,9	11	32,5	36	19	9				64	5,3	28,0	13,7	7,5
												37,5	35						35	3,9	42,7		
				Izdanacka mešovita šuma kitnjaka (izdanacka šuma kitnjaka i lipe) -								42,5	9		9				18	2,6	14,1		15,4
				jednodobna (u fazi razgradnje). Ocuvana sastojina. Mešovita sastojina								47,5	18						18	3,2	37,8		
				(smeša stablimicna) gustog sklopa (0.8 - 0.9). u celini zdravstveno								UKUP.	179	361	27	79	72	36	753	24,4	149,7	55,9	23,1
				stanje sastojine je osrednje. po kvalitetu malo vredna sastojina (ima do																			
				20% tehnickog drveta). Srednja ugroženost od insekata. Srednja ugroženost																			
				od fitopatoloških oboljenja-oboljenja lista. srednje negovana sastojina.																			
				Stabla srebrna lipa su zakrivljena i sa srednjim padom precnika (srednja																			
				punodrvnost), sa srednje dugim krošnjama (dužine izmedu 1/3 i 1/2 visine																			
				stabala) i ekscentricnim krošnjama, zdravstveno stanje stabala ove vrste																			
				drveca je dobro. Stabla kitnjaka su zakrivljena i sa srednjim padom																			
				precnika (srednja punodrvnost), sa srednje dugim krošnjama (dužine izmedu																			
				1/3 i 1/2 visine stabala) i normalno razvijenim krošnjama, od 11-25%																			
				oštecenih stabala od insekata i fitopatoloških obolenja, suvih i																			
				sihovrhih stabala ima od 11-25%, zdravstveno stanje stabala ove vrste																			
41	f	59307482	2,23	drveca je osrednje.																			
				Šuma - nalazi se na strani i na vrlo strmom terenu(nagiba od 16° do	1. Gr	0,8		85	22	14,8	10	7,5	24			10			34	0,1	0,8		
				20°) - nagib valovit. Nadmorska visina 250 do 365m. Ekspozicija 1	2. Kit	0,2			45	22,0	11	12,5	102						102	1,3	9,7		
				jugozapadna. Mrtvi pokrivac srednje zastupljen - povoljan proces	3. Klen				25	16,1	10	17,5	74		2				76	1,8	12,9		0,4
				humifikacije. Retka prizemna vegetacija. Retko žbunje. Nema	4. Bk				18	12,4	14	22,5	82						82	3,3	29,1		
				zakorovljenosti. tip šume bukve i kitnjaka (Querco-Fagetum typicum) na	5. SrLip				28	17,1	9	27,5	112			10	10		132	7,9	59,7		

ОПИС СТАНИШТА И САСТОЈИНА

Ozn.mesta		gazdi-	površ-	OPIS	Osnovni taksacioni elementi						visi	deb.	Broj stabala po hektaru							G	Zapremina po		
ode-	od-	nska	ina		vrsta	sme	obr	sta-	sred.stablo		nski			Vrsta drveta						po		Vrsta drv	
ljenje	sek	klasa	ha		drveća	sa	ast	rost	Ds	Hs	step.	st.	1	2	3	4	5	6	svg.	ha	1	2	3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
				kiselom smedem i lesiviranom kiselom smedjem zemljištu..								32,5	35	9	2				47	3,9	26,7	7,9	1,7
												37,5	8						8	0,9	8,3		
				Izdanacka mešovita šuma graba - jednodobna (u optimalnoj fazi). Ocuvana								42,5	24						24	3,4	35,6		
				sastojina. Mešovita sastojina (smeša stablimicna) gustog sklopa (0.8 -								47,5	4						4	0,7	7,6		
				0.9). u celini zdravstveno stanje sastojine je dobro. po kvalitetu malo								57,5		9					9	2,4		30,7	
				vredna sastojina (ima do 20% tehnickog drveta). Srednja ugroženost od								UKUP.	466	19	4	20	10		518	25,6	190,5	38,6	2,1
				insekata. Srednja ugroženost od fitopatoloških oboljenja-oboljenja lista.																			
				srednje negovana sastojina. Stabla graba su zakrivljena i sa srednjim																			
				padom precnika (srednja punodrvnost), sa srednje dugim krošnjama (dužine																			
				izmedu 1/3 i 1/2 visine stabala) i preširokim krošnjama, zdravstveno																			
				stanje stabala ove vrste drveca je dobro. Stabla bukve su zakrivljena i																			
				sa srednjim padom precnika (srednja punodrvnost), sa srednje dugim																			
				krošnjama (dužine izmedu 1/3 i 1/2 visine stabala) i normalno razvijenim																			
				krošnjama, do 10% oštecenih stabala od vetra, snega i leda, suvih i																			
				suhovrhih stabala ima do 10%, zdravstveno stanje stabala ove vrste																			
41	g	59176602	2,29	drveca je dobro.																			
				Put.																			
41	1	59	0,06																				

Ozn.mesta		gazdi-	površ-	OPIS	Osnovni taksacioni elementi						visi	deb.	Broj stabala po hektaru							G	Zapremina po		
ode-	od-	nska	ina		vrsta	sme	obr	sta-	sred.stablo		nski			Vrsta drveta						po		Vrsta drv	
ljenje	sek	klasa	ha		drveća	sa	ast	rost	Ds	Hs	step.	st.	1	2	3	4	5	6	svg.	ha	1	2	3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
				Šuma - nalazi se na strani i na strmom terenu (nagiba od 11° do 15°) -	1. SrLip	0,7		92	28	18,0	6	7,5	79	26		4	4		112	0,5	1,5	0,4	
				nagib ujednacen. Nadmorska visina 325 do 355m. Ekspozicija 1 istocna.	2. Bk	0,2			21	13,5	11	12,5		26					26	0,3		2,0	
				Ne postoji ugroženost od erozije - stablian teren u prirodnim uslovima.	3. Kit	0,1			40	23,3	8	22,5	15	4		4			22	0,9	5,8	1,1	
				Mrtvi pokrivac slabo zastupljen - povoljan proces humifikacije. Retka	4. Gr				23	14,7	8	27,5	34		4	4			41	2,4	19,0		2,0
				prizemna vegetacija. Srednje gusto žbunje. Slaba zakorovljenost. tip šume	5. Brk				8	3,8	8	32,5	4	4	4	4			14	1,2	3,4	3,7	3,2
				bukve i kitnjaka (Querco-Fagetum typicum) na kiselom smedem i lesiviranom								37,5	17	4					20	2,3	20,6	4,3	
				kiselom smedjem zemljištu..								42,5	49	4	4				56	7,9	76,9	5,5	6,4
												47,5	28	4	7				39	6,9	56,5	7,5	17,2
				Izdanacka mešovita šuma lipa - jednodobna (u fazi razgradnje).								52,5	10	4					13	2,9	23,4	10,7	
				Razredjena sastojina. Mešovita sastojina (smeša stablimicna) nepotpunog								62,5	4	4					7	2,2	14,4	15,0	
				sklopa (0.5-0.6). u celini zdravstveno stanje sastojine je dobro. po								UKUP.	238	76	18	15	4		351	27,5	221,4	50,1	28,9
				kvalitetu sastojina bez vrednosti (bez ucešca tehnickog drveta). Srednja																			
				ugroženost od insekata. Mala ugroženost od vetra. pogrešno negovana																			
				sastojina. Stabla srebrna lipa su zakrivljena i sa srednjim padom																			
				precnika (srednja punodrvnost), sa srednje dugim krošnjama (dužine izmedu																			
				1/3 i 1/2 visine stabala) i ekscentricnim krošnjama, do 10% oštecenih																			
				stabala od vetra, snega i leda, suvih i suhovrhih stabala ima do 10%,																			
				zdravstveno stanje stabala ove vrste drveca je dobro. Stabla kitnjaka su																			
				zakrivljena i sa srednjim padom precnika (srednja punodrvnost), sa																			
				srednje dugim krošnjama (dužine izmedu 1/3 i 1/2 visine stabala) i																			
				normalno razvijenim krošnjama, do 10% oštecenih stabala od vetra, snega i																			
				leda, do 10% oštecenih stabala od insekata i fitopatoloških obolenja,																			
				suvih i suhovrhih stabala ima do 10%, zdravstveno stanje stabala ove																			
				vrste drveca je osrednje. Stabla bukve su zakrivljena i sa srednjim padom																			
				precnika (srednja punodrvnost), sa srednje dugim krošnjama (dužine izmedu																			
				1/3 i 1/2 visine stabala) i normalno razvijenim krošnjama, do 10%																			
				oštecenih stabala od vetra, snega i leda, suvih i suhovrhih stabala ima																			
42	a	59288602	2,87	do 10%, zdravstveno stanje stabala ove vrste drveca je dobro.																			
				Šuma - nalazi se na strani i na srednje strmom terenu (nagiba od 6° do	1. SrLip	0,5		100	21	18,2	5	7,5	124			2		4	131	0,6	2,7		
				10°) - nagib ujednacen. Nadmorska visina 340 do 430m. Ekspozicija 1	2. Kit	0,4			38	22,6	9	12,5	24			5	2	2	34	0,4	2,0		
				istocna. Ne postoji ugroženost od erozije - stablian teren u prirodnim	3. Cer				55	26,6	7	17,5	7	2			4		13	0,3	1,6	0,5	
				uslovima. Mrtvi pokrivac srednje zastupljen - povoljan proces	4. OTL				19	16,9	8	22,5	18	2					20	0,8	6,3	0,7	
				humifikacije. Srednje gusta prizemna vegetacija. Srednje gusto žbunje.	5. Gr				16	14,8	7	27,5	15	14					29	1,7	9,0	8,8	
				Slaba zakorovljenost. tip šume kitnjaka (Quercetum montanum typicum) na	6. Cjas				9	9,3	7	32,5	42	17					59	4,9	36,6	15,7	
				kiselom smedem i lesiviranom kiselom smedjem zemljištu..								37,5	29	33					62	6,9	35,9	40,2	
												42,5	27	15					41	5,9	42,9	23,3	
				Izdanacka mešovita šuma lipa - jednodobna (u fazi razgradnje). Ocuvana								47,5	9	18		2			29	5,1	16,7	40,0	
				sastojina. Mešovita sastojina (smeša stablimicna) potpunog sklopa (0.7).								52,5	4	6	2				13	2,8	10,9	17,5	5,5
				u celini zdravstveno stanje sastojine je osrednje. po kvalitetu malo								57,5			2				2	0,6			7,1
				vredna sastojina (ima do 20% tehnickog drveta). Srednja ugroženost od								UKUP.	298	108	4	10	7	7	433	29,9	164,7	146,7	12,6
				insekata. Srednja ugroženost od fitopatoloških oboljenja-oboljenja lista.																			
				srednje negovana sastojina. Stabla srebrna lipa su zakrivljena i sa																			
				srednjim padom precnika (srednja punodrvnost), sa srednje dugim krošnjama																			
				(dužine izmedu 1/3 i 1/2 visine stabala) i ekscentricnim krošnjama, suvih																			
				i suhovrhih stabala ima do 10%, zdravstveno stanje stabala ove vrste																			
				drveca je dobro. Stabla kitnjaka su zakrivljena i sa srednjim padom																			
				precnika (srednja punodrvnost), sa srednje dugim krošnjama (dužine izmedu																			
				1/3 i 1/2 visine stabala) i normalno razvijenim krošnjama, do 10%																			

ОПИС СТАНИШТА И САСТОЈИНА

Ozn.mesta		gazdi-	površ-	OPIS	Osnovni taksacioni elementi						visi	deb.	Broj stabala po hektaru							G	Zapremina po		
ode-	od-	nska	ina		vrsta	sme	obr	sta-	sred.stablo		nski			Vrsta drveta						po		Vrsta drv	
ljenje	sek	klasa	ha		drveća	sa	ast	rost	Ds	Hs	step.	st.	1	2	3	4	5	6	svg.	ha	1	2	3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
				oštecenih stabala od insekata i fitopatoloških obolenja, suvih i																			
				suhovrhih stabala ima do 10%, zdravstveno stanje stabala ove vrste																			
42	b	59288482	12,90	drveca je osrednje.																			

Ozn.mesta		gazdi-	površ-	OPIS	Osnovni taksacioni elementi						visi	deb.	Broj stabala po hektaru							G	Zapremina po		
ode-	od-	nska	ina		vrsta	sme	obr	sta-	sred.stablo		nski			Vrsta drveta						po		Vrsta drv	
ljenje	sek	klasa	ha		drveća	sa	ast	rost	Ds	Hs	step.	st.	1	2	3	4	5	6	svg.	ha	1	2	3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
				Šuma - nalazi se na strani i na srednje strmom terenu (nagiba od 6° do	1. SrLip	0,5		110	18	15,3	5	7,5	191		51	6	41	6	295	1,3	4,3		0,9
				10°) - nagib ujednacen. Nadmorska visina 430 do 465m. Ekspozicija 1	2. Kit	0,5			34	22,1	8	12,5	21		4			6	31	0,4	2,0		0,5
				istocna. Ne postoji ugroženost od erozije - stablian teren u prirodnim	3. Gr				8	5,2	8	17,5	23	2		8			33	0,8	4,9	0,6	
				uslovima. Mrtvi pokrivac srednje zastupljen - povoljan proces	4. Bk				13	9,9	11	22,5	39	8					47	1,9	15,6	2,8	
				humifikacije. Gusta prizemna vegetacija. Srednje gusto žbunje. Slaba	5. Cjas				8	4,8	8	27,5	52	37					89	5,3	31,5	22,6	
				zakorovljenost. tip šume kitnjaka (Quercetum montanum typicum) na kiselom	6. Brk				10	7,1	8	32,5	37	39					75	6,2	30,1	38,5	
				smedem i lesiviranom kiselom smedjem zemljištu..								37,5	30	41					71	7,8	34,0	54,9	
												42,5	8	10					18	2,5	13,4	17,8	
				Izdanacka mešovita šuma lipa (izdanacka šuma lipa i kitnjaka) -								47,5	11	6					17	2,9	21,2	12,0	
				jednodobna (u fazi razgradnje). Ocuvana sastojina. Mešovita sastojina								52,5		6					6	1,2		14,6	
				(smeša stablimicna) gustog sklopa (0.8 - 0.9). u celini zdravstveno								UKUP.	412	147	55	13	41	11	680	30,3	157,0	163,8	1,4
				stanje sastojine je osrednje. po kvalitetu malo vredna sastojina (ima do																			
				20% tehnickog drveta). Srednja ugroženost od insekata. Srednja ugroženost																			
				od fitopatoloških oboljenja-oboljenja lista. srednje negovana sastojina.																			
				Stabla srebrna lipa su zakrivljena i sa velikim padom precnika (mala																			
				punodrvnost), sa srednje dugim krošnjama (dužine izmedu 1/3 i 1/2 visine																			
				stabala) i ekscentricnim krošnjama, do 10% oštecenih stabala od vetra,																			
				snega i leda, suvih i suhovrhih stabala ima do 10%, zdravstveno stanje																			
				stabala ove vrste drveca je osrednje. Stabla kitnjaka su zakrivljena i sa																			
				srednjim padom precnika (srednja punodrvnost), sa srednje dugim krošnjama																			
				(dužine izmedu 1/3 i 1/2 visine stabala) i normalno razvijenim krošnjama,																			
				do 10% oštecenih stabala od insekata i fitopatoloških obolenja, suvih i																			
				suhovrhih stabala ima do 10%, zdravstveno stanje stabala ove vrste																			
42	c	59288482	5,23	drveca je osrednje.																			
				Put.																			
42	1	59	0,09																				
				Šuma - nalazi se na strani i na vrlo strmom terenu(nagiba od 16° do	1. Bk	0,5		95	29	17,9	14	7,5	49	6					55	0,2	0,9	0,1	
				20°) - nagib valovit. Nadmorska visina 290 do 395m. Ekspozicija 1	2. SrLip	0,3			38	20,6	8	12,5	6	6					13	0,2	0,5	0,5	
				istocna. Ne postoji ugroženost od erozije - stablian teren u prirodnim	3. Kit	0,2			40	21,0	10	17,5	19						19	0,5	3,4		
				uslovima. Mrtvi pokrivac srednje zastupljen - povoljan proces	4. Gr				30	18,4	10	22,5				6			6	0,2			
				humifikacije. Retka prizemna vegetacija. Retko žbunje. Slaba								32,5	6	6					12	1,0	5,9	4,1	
				zakorovljenost. tip šume bukve i kitnjaka (Querco-Fagetum typicum) na								37,5	24	18	25	6			73	8,0	26,5	18,6	28,5
				kiselom smedem i lesiviranom kiselom smedjem zemljištu..								42,5	13	18	19				49	7,0	18,5	25,3	30,6
												47,5	13						13	2,2	25,6		
				Izdanacka mešovita šuma bukve - jednodobna (u fazi razgradnje). Ocuvana								52,5	6						6	1,3	13,8		
				sastojina. Mešovita sastojina (smeša stablimicna) potpunog sklopa (0.7).								57,5	19	6					24	6,3	50,3	17,4	
				u celini zdravstveno stanje sastojine je dobro. po kvalitetu malo vredna								67,5		6					6	2,1		22,2	
				sastojina (ima do 20% tehnickog drveta). Srednja ugroženost od insekata.								UKUP.	155	65	44	12			276	29,1	145,4	88,3	59,1
				pogrešno negovana sastojina. Stabla srebrna lipa su zakrivljena i sa																			
				srednjim padom precnika (srednja punodrvnost), sa srednje dugim krošnjama																			
				(dužine izmedu 1/3 i 1/2 visine stabala) i ekscentricnim krošnjama, do																			
				10% oštecenih stabala od vetra, snega i leda, suvih i suhovrhih stabala																			
				ima do 10%, zdravstveno stanje stabala ove vrste drveca je dobro. Stabla																			
				kitnjaka su zakrivljena i sa srednjim padom precnika (srednja																			
				punodrvnost), sa srednje dugim krošnjama (dužine izmedu 1/3 i 1/2 visine																			
				stabala) i normalno razvijenim krošnjama, do 10% oštecenih stabala od																			

ОПИС СТАНИШТА И САСТОЈИНА

Ozn.mesta		gazdi-	površ-	OPIS	Osnovni taksacioni elementi						visi	deb.	Broj stabala po hektaru							G	Zapremina po		
ode-	od-	nska	ina		vrsta	sme	obr	sta-	sred.stablo		nski			Vrsta drveta						po		Vrsta drv	
ljenje	sek	klasa	ha		drveća	sa	ast	rost	Ds	Hs	step.	st.	1	2	3	4	5	6	svg.	ha	1	2	3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
				vetra, snega i leda, do 10% oštecenih stabala od insekata i																			
				fitopatoloških obolenja, suvih i suhovrhih stabala ima do 10%,																			
				zdravstveno stanje stabala ove vrste drveca je osrednje. Stabla bukve su																			
				zakrivljena i sa srednjim padom precnika (srednja punodrvnost), sa																			
				srednje dugim krošnjama (dužine izmedu 1/3 i 1/2 visine stabala) i																			
				normalno razvijenim krošnjama, do 10% oštecenih stabala od vetra, snega i																			
				leda, suvih i suhovrhih stabala ima do 10%, zdravstveno stanje stabala																			
43	a	59361602	1,48	ove vrste drveca je dobro.																			

ОПИС СТАНИШТА И САСТОЈИНА

Ozn.mesta		gazdi-	površ-	OPIS	Osnovni taksacioni elementi						visi	deb.	Broj stabala po hektaru							G	Zapremina po		
ode-	od-	nska	ina		vrsta	sme	obr	sta-	sred.stablo		nski			Vrsta drveta						po		Vrsta drv	
ljenje	sek	klasa	ha		drveća	sa	ast	rost	Ds	Hs	step.	st.	1	2	3	4	5	6	svg.	ha	1	2	3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
				Šuma - nalazi se na strani i na vrlo strmom terenu(nagiba od 16° do	1. Kit	0,7		95	40	21,8	10	7,5		34	62	69	7	7	179	0,8		0,8	1,4
				20°) - nagib valovit. Nadmorska visina 315 do 360m. Ekspozicija 1	2. Bk	0,1			20	14,8	13	12,5		4	13	16		2	35	0,4		0,3	1,0
				istocna. Ne postoji ugroženost od erozije - stablian teren u prirodnim	3. SrLip	0,1			17	13,2	8	17,5		4	10	13	2		29	0,7		0,7	1,6
				uslovima. Mrtvi pokrivac srednje zastupljen - povoljan proces	4. Gr				12	9,8	12	22,5	2		7	20			30	1,2	0,8		2,2
				humifikacije. Retka prizemna vegetacija. Srednje gusto žbunje. Srednja	5. OTL				24	16,5	10	27,5	2	2	11	2			17	1,0	1,1	1,4	5,6
				zakorovljenost. tip šume kitnjaka (Quercetum montanum typicum) na kiselom	6. Klen				9	7,1	10	32,5	26	2	10	2			40	3,3	22,1	1,9	7,5
				smedem i lesiviranom kiselom smedjem zemljištu..								37,5	60	2	9				70	7,8	68,6	2,3	9,4
												42,5	27	2	8				37	5,2	44,6	3,3	11,8
				Izdanacka mešovita šuma kitnjaka (izdanacka šuma kitnjaka, bukve i lipe)								47,5	30	4					34	6,0	63,3	8,3	
				- jednodobna (u fazi razgradnje). Razredjena sastojina. Mešovita								52,5	5	4			2		12	2,5	13,1	11,0	
				sastojina (smeša stablimicna) nepotpunog sklopa (0.5-0.6). u celini								57,5					2		2	0,5			
				zdravstveno stanje sastojine je dobro. po kvalitetu sastojina bez								62,5		2					2	0,7		7,5	
				vrednosti (bez ucešca tehnickog drveta). Srednja ugroženost od insekata.								UKUP.	152	62	128	122	14	9	486	30,2	213,6	37,6	40,5
				Srednja ugroženost od vetra. nenegovana sastojina. Stabla srebrna lipa																			
				su zakrivljena i sa srednjim padom precnika (srednja punodrvnost), sa																			
				srednje dugim krošnjama (dužine izmedu 1/3 i 1/2 visine stabala) i																			
				ekscentricnim krošnjama, do 10% oštecenih stabala od vetra, snega i leda,																			
				suvih i suhovrhih stabala ima do 10%, zdravstveno stanje stabala ove																			
				vrste drveca je dobro. Stabla kitnjaka su zakrivljena i sa srednjim padom																			
				precnika (srednja punodrvnost), sa srednje dugim krošnjama (dužine izmedu																			
				1/3 i 1/2 visine stabala) i normalno razvijenim krošnjama, do 10%																			
				oštecenih stabala od vetra, snega i leda, do 10% oštecenih stabala od																			
				insekata i fitopatoloških obolenja, suvih i suhovrhih stabala ima do 10%,																			
				zdravstveno stanje stabala ove vrste drveca je osrednje. Stabla bukve su																			
				zakrivljena i sa srednjim padom precnika (srednja punodrvnost), sa																			
				srednje dugim krošnjama (dužine izmedu 1/3 i 1/2 visine stabala) i																			
				normalno razvijenim krošnjama, do 10% oštecenih stabala od vetra, snega i																			
43	b	59307482	4,29	leda, zdravstveno stanje stabala ove vrste drveca je dobro.																			
				Šuma - nalazi se na platou i na blago nagnutom terenu (nagiba do 5°) -	1. Kit	0,3		85	38	23,1	9	7,5		6	27	16	7	89	143	0,6		0,2	0,8
				nagib ujednacen. Nadmorska visina 345 do 360m. Ekspozicija 1 bez jasno	2. Gr	0,3			23	17,2	8	12,5		12	28	4	2	58	104	1,3		1,2	2,0
				izražene ekspozicije. Ne postoji ugroženost od erozije - stablian teren u	3. Klen	0,1			18	14,6	8	17,5		24	42	2		22	91	2,2		5,2	9,2
				prirodnim uslovima. Mrtvi pokrivac srednje zastupljen - povoljan proces	4. SrLip	0,2			27	19,3	6	22,5	2	71	24				97	3,9	0,9	25,5	8,6
				humifikacije. Retka prizemna vegetacija. Srednje gusto žbunje. Slaba	5. OTL				21	16,4	9	27,5	13	37	4	2			56	3,3	7,8	22,0	2,5
				zakorovljenost. tip šume kitnjaka, graba i cera (Carpino-Quercetum	6. Bag				11	9,3	15	32,5	13	21	18	11			63	5,2	11,6	18,9	15,5
				petraeae-cerris typicum) na intervalu zemljišta od pararendzine na lesu i								37,5	9	2		6	2		19	2,1	11,0	2,3	
				laporcu do lesivirane gajnjace ..								42,5	13	2		6			21	3,0	21,6	3,1	
												47,5	11			6			17	2,9	24,0		
				Izdanacka mešovita šuma kitnjaka (izdanacka šuma kitnjaka, graba i lipe)								52,5					2		2	0,5			
				- jednodobna (u fazi razgradnje). Razredjena sastojina. Mešovita								57,5	2						2	0,6	7,6		
				sastojina (smeša stablimicna) nepotpunog sklopa (0.5-0.6). u celini								62,5	2						2	0,7	8,5		
				zdravstveno stanje sastojine je osrednje. po kvalitetu malo vredna								67,5				2			2	0,8			
				sastojina (ima do 20% tehnickog drveta). Srednja ugroženost od insekata.								UKUP.	66	175	143	54	13	169	620	27,0	93,1	78,4	38,7
				Srednja ugroženost od fitopatoloških oboljenja-oboljenja lista. pogrešno																			
				negovana sastojina. Stabla graba su zakrivljena i sa velikim padom																			
				precnika (mala punodrvnost), sa dugim krošnjama (dužine izmedu 1/2 i 2/3																			
				visine stabala) i preširokim krošnjama, suvih i suhovrhih stabala ima do																			
				10%, zdravstveno stanje stabala ove vrste drveca je dobro. Stabla																			
				srebrna lipa su zakrivljena i sa srednjim padom precnika (srednja																			

ОПИС СТАНИШТА И САСТОЈИНА

Ozn.mesta		gazdi-	površ-	OPIS	Osnovni taksacioni elementi						visi	deb.	Broj stabala po hektaru							G	Zapremina po		
ode-	od-	nska	ina		vrsta	sme	obr	sta-	sred.stablo		nski			Vrsta drveta						po		Vrsta drv	
ljenje	sek	klasa	ha		drveća	sa	ast	rost	Ds	Hs	step.	st.	1	2	3	4	5	6	svg.	ha	1	2	3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
				punodrvnost), sa srednje dugim krošnjama (dužine izmedu 1/3 i 1/2 visine																			
				stabala) i normalno razvijenim krošnjama, do 10% oštecenih stabala od																			
				insekata, suvih i suhovrhih stabala ima do 10%, zdravstveno stanje																			
				stabala ove vrste drveca je osrednje. Stabla kitnjaka su zakrivljena i sa																			
				srednjim padom precnika (srednja punodrvnost), sa srednje dugim krošnjama																			
				(dužine izmedu 1/3 i 1/2 visine stabala) i normalno razvijenim krošnjama,																			
				do 10% oštecenih stabala od insekata i fitopatoloških obolenja, suvih i																			
				suhovrhih stabala ima do 10%, zdravstveno stanje stabala ove vrste																			
43	c	59307246	5,45	drveca je osrednje.																			

Ozn.mesta		gazdi-	površ-	OPIS	Osnovni taksacioni elementi						visi	deb.	Broj stabala po hektaru							G	Zapremina po		
ode-	od-	nska	ina		vrsta	sme	obr	sta-	sred.stablo		nski			Vrsta drveta						po		Vrsta drv	
ljenje	sek	klasa	ha		drveća	sa	ast	rost	Ds	Hs	step.	st.	1	2	3	4	5	6	svg.	ha	1	2	3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
				Šuma - nalazi se u dolini i na blago nagnutom terenu (nagiba do 5°) -	1. Kit	0,5		95	33	21,2	9	7,5						10	10				
				nagib valovit. Nadmorska visina 295 do 330m. Ekspozicija 1 jugozapadna.	2. Bk	0,2			31	20,3	12	12,5					10		10	0,1			
				Mrtvi pokrivac srednje zastupljen - povoljan proces humifikacije. Retko	3. SrLip	0,2			23	16,4	7	17,5		10	40		10		60	1,4		1,5	6,7
				žbunje. Slaba zakorovljenost. tip šume kitnjaka, graba i cera	4. Cer	0,1			34	21,7	8	22,5			20	10	10		40	1,6			6,0
				(Carpino-Quercetum petraeae-cerris typicum) na intervalu zemljišta od	5. Gr				18	13,0	10	27,5	10		30				40	2,4	6,3		16,1
				pararendzine na lesu i laporcu do lesivirane gajnjace ..	6. Cjas				8	5,0	10	32,5	70	40	10				120	9,9	64,4	33,1	8,0
												37,5	20	10		10			40	4,4	24,1	13,0	
				Izdanacka mešovita šuma kitnjaka (izdanacka šuma kitnjaka, bukve i lipe)								42,5				10			10	1,4			
				- jednodobna (u fazi razgradnje). Ocuvana sastojina. Mešovita sastojina								UKUP.	100	60	100	30	30	10	329	21,3	94,7	47,6	36,8
				(smeša stablimicna) potpunog sklopa (0.7). u celini zdravstveno stanje																			
				sastojine je osrednje. po kvalitetu malo vredna sastojina (ima do 20%																			
				tehnickog drveta). Srednja ugroženost od insekata. Srednja ugroženost od																			
				drugih štetnih uticaja. Stabla srebrna lipa su zakrivljena i sa srednjim																			
				padom precnika (srednja punodrvnost), sa kratkim krošnjama (dužine izmedu																			
				1/4 i1/3 visine stabala) i uskim krošnjama, do 10% oštecenih stabala od																			
				insekata, suvih i suhovrhih stabala ima do 10%, zdravstveno stanje																			
				stabala ove vrste drveca je osrednje. Stabla kitnjaka su zakrivljena i sa																			
				srednjim padom precnika (srednja punodrvnost), sa srednje dugim krošnjama																			
				(dužine izmedu 1/3 i 1/2 visine stabala) i normalno razvijenim krošnjama,																			
				do 10% oštecenih stabala od insekata, do 10% oštecenih stabala od																			
				fitopatoloških obolenja, suvih i suhovrhih stabala ima do 10%,																			
				zdravstveno stanje stabala ove vrste drveca je osrednje. Stabla bukve su																			
				zakrivljena i sa srednjim padom precnika (srednja punodrvnost), sa dugim																			
				krošnjama (dužine izmedu 1/2 i 2/3 visine stabala) i ekscentricnim																			
				krošnjama, do 10% oštecenih stabala od fitopatoloških obolenja, suvih i																			
				suhovrhih stabala ima do 10%, zdravstveno stanje stabala ove vrste																			
43	d	59307246	0,38	drveca je osrednje.																			
				Šuma - nalazi se na platou i na blago nagnutom terenu (nagiba do 5°) -	1. Bag			6																
				nagib ujednacen. Nadmorska visina 315 do 330m. Ekspozicija 1																			
				jugozapadna. Ne postoji ugroženost od erozije - stablian teren u																			
				prirodnim uslovima. Retka prizemna vegetacija. Srednja zakorovljenost.																			
				tip šume kitnjaka i graba sa klokocikom (Querco-Carpinetum staphyletosum)																			
				na kiselom smedem do lesiviranom kiselom smedjem zemljištu..																			
				Izdanacka šuma bagrema - jednodobna (u fazi izgradnje). Ocuvana																			
				sastojina. Cista sastojina (smeša stablimicna) potpunog sklopa (0.7). u																			
				celini zdravstveno stanje sastojine je dobro. po kvalitetu sastojina bez																			
				vrednosti (bez ucešca tehnickog drveta). Srednja ugroženost od insekata.																			
				Srednja ugroženost od drugih štetnih uticaja. srednje negovana sastojina.																			
43	e	59325263	1,72	0.																			
				Šuma - nalazi se na strani i na strmom terenu (nagiba od 11° do 15°) -	1. SrLip	0,5		46	19	13,3	9	7,5			24			24	49	0,2			0,7
				nagib konveksan (ispupcen). Nadmorska visina 320 do 340m. Ekspozicija 1	2. Kit	0,4			25	16,1	11	12,5	96		24	48	24		192	2,4	7,4		0,8
				jugozapadna. Slaba zakorovljenost. tip šume kitnjaka i graba sa	3. Bag	0,1			15	11,4	16	17,5	144		24	24	24	24	240	5,8	23,1		2,6
				klokocikom (Querco-Carpinetum staphyletosum) na kiselom smedem do	4. Gr				14	10,9	11	22,5	72	73	24				168	6,7	23,5	23,9	5,0
				lesiviranom kiselom smedjem zemljištu..	5. OTL				15	11,4	11	27,5	48	24					72	4,3	19,5	13,5	
					6. Klen				13	9,9	11	32,5		24					24	2,0		16,1	
				Izdanacka mešovita šuma lipa (izdanacka šuma lipa i kitnjaka) -								UKUP.	360	120	96	72	48	49	744	21,3	73,5	53,5	9,1
				jednodobna (u optimalnoj fazi). Ocuvana sastojina. Mešovita sastojina																			

ОПИС СТАНИШТА И САСТОЈИНА

Ozn.mesta		gazdi-	površ-	OPIS	Osnovni taksacioni elementi						visi	deb.	Broj stabala po hektaru							G	Zapremina po		
ode-	od-	nska	ina		vrsta	sme	obr	sta-	sred.stablo		nski			Vrsta drveta						po		Vrsta drv	
ljenje	sek	klasa	ha		drveća	sa	ast	rost	Ds	Hs	step.	st.	1	2	3	4	5	6	svg.	ha	1	2	3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
				(smeša stablimicna) gustog sklopa (0.8 - 0.9). u celini zdravstveno																			
				stanje sastojine je osrednje. Srednja ugroženost od insekata. Srednja																			
				ugroženost od drugih štetnih uticaja. srednje negovana sastojina. 0.																			
				Stabla srebrna lipa su zakrivljena i sa srednjim padom precnika (srednja																			
				punodrvnost), sa kratkim krošnjama (dužine izmedu 1/4 i1/3 visine																			
				stabala) i uskim krošnjama, do 10% oštecenih stabala od insekata, suvih i																			
				suhovrhih stabala ima do 10%, zdravstveno stanje stabala ove vrste																			
				drveca je osrednje. Stabla kitnjaka su zakrivljena i sa srednjim padom																			
				precnika (srednja punodrvnost), sa srednje dugim krošnjama (dužine izmedu																			
				1/3 i 1/2 visine stabala) i normalno razvijenim krošnjama, do 10%																			
				oštecenih stabala od insekata, suvih i suhovrhih stabala ima do 10%,																			
43	f	59288263	0,32	zdravstveno stanje stabala ove vrste drveca je osrednje.																			
				Livada.																			
43	1	60	1,47																				
				Put.																			
43	2	59	0,15																				

Ozn.mesta		gazdi-	površ-	OPIS	Osnovni taksacioni elementi						visi	deb.	Broj stabala po hektaru							G	Zapremina po		
					vrsta	sme	obr	sta-	sred.stablo		nski		Vrsta drveta							po	Vrsta drv		
ode-	od-	nska	ina		drveća	sa	ast	rost	Ds	Hs	step.	st.	1	2	3	4	5	6	svg.	ha	1	2	3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
				Put.																			
43	3	59	0,29																				
				Šuma - nalazi se na platou i na blago nagnutom terenu (nagiba do 5°) -	1. Klen	0,3		70	26	14,9	12	7,5	39	20		20	10		89	0,4	0,7	0,6	
				nagib ujednacen. Nadmorska visina 325 do 335m. Ekspozicija 1 bez jasno	2. Gr	0,2			28	15,5	12	12,5						10	10	0,1				
				izražene ekspozicije. Ne postoji ugroženost od erozije - stablian teren u	3. Kit	0,2			39	18,4	13	22,5		10					10	0,4		3,6	
				prirodnim uslovima. Mrtvi pokrivac srednje zastupljen - povoljan proces	4. SrLip	0,2			30	16,1	11	27,5	29	10				10	49	2,9	14,9	4,0	
				humifikacije. Retka prizemna vegetacija. Srednje gusto žbunje. Slaba	5. OTL				23	13,5	13	32,5	10	20	20	20			69	5,7	6,4	14,6	13,4
				zakorovljenost. tip šume kitnjaka, graba i cera (Carpino-Quercetum	6. Bag				20	12,3	18	37,5	20	40	20	10	10		99	10,9	19,3	40,0	17,3
				petraeae-cerris typicum) na intervalu zemljišta od pararendzine na lesu i								42,5	10		10				20	2,8	13,6		12,7
				laporcu do lesivirane gajnjace ..								52,5	10		10				20	4,3	17,8		22,5
												62,5				10			10	3,0			
				Izdanacka mešovita šuma lipa - jednodobna (u optimalnoj fazi). Ocuvana								UKUP.	118	99	59	59	20	20	374	30,5	72,8	62,8	65,9
				sastojina. Mešovita sastojina (smeša stablimicna) gustog sklopa (0.8 -																			
				0.9). u celini zdravstveno stanje sastojine je dobro. po kvalitetu malo																			
				vredna sastojina (ima do 20% tehnickog drveta). Srednja ugroženost od																			
				insekata. srednje negovana sastojina. Stabla graba su zakrivljena i sa																			
				velikim padom precnika (mala punodrvnost), sa srednje dugim krošnjama																			
				(dužine izmedu 1/3 i 1/2 visine stabala) i normalno razvijenim krošnjama,																			
				do 10% oštecenih stabala od insekata i fitopatoloških obolenja,																			
				zdravstveno stanje stabala ove vrste drveca je dobro. Stabla srebrna lipa																			
				su zakrivljena i sa srednjim padom precnika (srednja punodrvnost), sa																			
				srednje dugim krošnjama (dužine izmedu 1/3 i 1/2 visine stabala) i																			
				ekscentricnim krošnjama, do 10% oštecenih stabala od insekata i																			
				fitopatoloških obolenja, suvih i suhovrhih stabala ima do 10%,																			
44	a	59288246	0,55	zdravstveno stanje stabala ove vrste drveca je dobro.																			
				Šuma - nalazi se na strani i na strmom terenu (nagiba od 11° do 15°) -	1. SrLip	0,7		35	25	17,1	9	7,5	82		99	165	17		363	1,6	1,5		2,2
				nagib konkavan (ugnut). Nadmorska visina 330 do 345m. Ekspozicija 1	2. Tre	0,1			29	15,2	17	12,5			33	49	17		99	1,2			3,4
				zapadna. Ne postoji ugroženost od erozije - stablian teren u prirodnim	3. Klen	0,1			10	9,7	11	17,5	17		33		33	17	99	2,4	2,4		5,0
				uslovima. Mrtvi pokrivac srednje zastupljen - povoljan proces	4. Bag				9	8,3	15	22,5	33	17					49	2,0	8,4	5,5	
				humifikacije. Retka prizemna vegetacija. Srednje gusto žbunje. Srednja	5. Gr				14	10,6	9	27,5	17						17	1,0	8,0		
				zakorovljenost. tip šume kitnjaka, graba i cera (Carpino-Quercetum	6. Cjas				18	13,3	12	32,5	17	33					49	4,1	13,8	23,2	
				petraeae-cerris typicum) na intervalu zemljišta od pararendzine na lesu i								37,5	33						33	3,6	33,7		
				laporcu do lesivirane gajnjace ..								42,5	17						17	2,3	22,5		
												47,5	33						33	5,9	59,4		
				Izdanacka mešovita šuma lipa - jednodobna (u fazi izgradnje). Ocuvana								UKUP.	247	49	165	214	66	17	758	24,1	149,7	28,7	10,5
				sastojina. Mešovita sastojina (smeša stablimicna) gustog sklopa (0.8 -																			
				0.9). u celini zdravstveno stanje sastojine je dobro. po kvalitetu malo																			
				vredna sastojina (ima do 20% tehnickog drveta). Srednja ugroženost od																			
				insekata. Srednja ugroženost od drugih štetnih uticaja. srednje negovana																			
				sastojina. 0. Stabla graba su zakrivljena i sa velikim padom precnika																			
				(mala punodrvnost), sa srednje dugim krošnjama (dužine izmedu 1/3 i 1/2																			
				visine stabala) i normalno razvijenim krošnjama, do 10% oštecenih stabala																			
				od insekata i fitopatoloških obolenja, suvih i suhovrhih stabala ima do																			
				10%, zdravstveno stanje stabala ove vrste drveca je dobro. Stabla																			
				srebrna lipa su zakrivljena i sa srednjim padom precnika (srednja																			
				punodrvnost), sa srednje dugim krošnjama (dužine izmedu 1/3 i 1/2 visine																			

Ozn.mesta		gazdi-	površ-	OPIS	Osnovni taksacioni elementi						visi	deb.	Broj stabala po hektaru							G	Zapremina po		
ode-	od-	nska	ina		vrsta	sme	obr	sta-	sred.stablo		nski			Vrsta drveta						po		Vrsta drv	
ljenje	sek	klasa	ha		drveća	sa	ast	rost	Ds	Hs	step.	st.	1	2	3	4	5	6	svg.	ha	1	2	3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
				stabala) i ekscentricnim krošnjama, do 10% oštecenih stabala od insekata																			
				i fitopatoloških obolenja, suvih i suhovrhih stabala ima do 10%,																			
44	b	59288246	1,15	zdravstveno stanje stabala ove vrste drveca je dobro.																			
				Šuma - nalazi se na strani i na srednje strmom terenu (nagiba od 6° do	1. SrLip	0,8		70	32	22,1	5	7,5	46	7		27		13	93	0,4	1,2	0,3	
				10°) - nagib konkavan (ugnut). Nadmorska visina 325 do 350m.	2. Gr	0,1			19	16,1	7	12,5	13	13				7	33	0,4	1,4	1,5	
				Ekspozicija 1 istocna. Ne postoji ugroženost od erozije - stablian teren	3. Kit	0,1			34	22,9	8	17,5		20			7		27	0,6		5,1	
				u prirodnim uslovima. Mrtvi pokrivac srednje zastupljen - povoljan proces	4. OTL	0,1			18	15,8	8	22,5	13	33	7	7			60	2,4	5,9	12,2	2,1
				humifikacije. Retka prizemna vegetacija. Retko žbunje. Nema	5. Cjas				23	18,2	7	27,5	7	7		7	7		27	1,6	3,5	4,8	
				zakorovljenosti. tip šume kitnjaka i graba sa klokocikom	6. Klen				9	8,6	7	32,5	27		7				33	2,8	24,2		6,5
				(Querco-Carpinetum staphyletosum) na kiselom smedem do lesiviranom								37,5	33						33	3,7	40,9		
				kiselom smedjem zemljištu..								42,5	53						53	7,5	83,4		
												47,5	13		7	7			27	4,7	27,2		15,2
				Izdanacka mešovita šuma lipa - jednodobna (u optimalnoj fazi). Ocuvana								52,5	20						20	4,3	52,1		
				sastojina. Mešovita sastojina (smeša stablimicna) gustog sklopa (0.8 -								57,5	7						7	1,7	19,7		
				0.9). u celini zdravstveno stanje sastojine je dobro. po kvalitetu malo								UKUP.	232	80	20	47	13	20	412	30,1	259,5	23,9	23,8
				vredna sastojina (ima do 20% tehnickog drveta). Srednja ugroženost od																			
				insekata. Mala ugroženost od vetra. srednje negovana sastojina. Stabla																			
				srebrna lipa su zakrivljena i sa srednjim padom precnika (srednja																			
				punodrvnost), sa srednje dugim krošnjama (dužine izmedu 1/3 i 1/2 visine																			
				stabala) i ekscentricnim krošnjama, do 10% oštecenih stabala od vetra,																			
				snega i leda, suvih i suhovrhih stabala ima do 10%, zdravstveno stanje																			
44	c	59288263	0,71	stabala ove vrste drveca je dobro.																			

Ozn.mesta		gazdi-	površ-	OPIS	Osnovni taksacioni elementi						visi	deb.	Broj stabala po hektaru							G	Zapremina po		
ode-	od-	nska	ina		vrsta	sme	obr	sta-	sred.stablo		nski			Vrsta drveta						po		Vrsta drv	
ljenje	sek	klasa	ha		drveća	sa	ast	rost	Ds	Hs	step.	st.	1	2	3	4	5	6	svg.	ha	1	2	3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
				Šuma - nalazi se na strani i na strmom terenu (nagiba od 11° do 15°) -	1. SrLip	0,8		42	27	20,0	6	7,5	59	13				13	85	0,4	1,6	0,2	
				nagib konkavan (ugnut). Nadmorska visina 320 do 350m. Ekspozicija 1	2. Gr	0,1			20	16,9	8	12,5	13	7	7	7			33	0,4	1,3	0,9	0,8
				istocna. Ne postoji ugroženost od erozije - stablian teren u prirodnim	3. Bag				19	16,3	15	17,5	7	27	7	27	7		73	1,8	1,0	4,9	1,3
				uslovima. Mrtvi pokrivac srednje zastupljen - povoljan proces	4. Klen				17	15,0	8	22,5	13	20	13				46	1,8	5,1	6,9	4,8
				humifikacije. Retka prizemna vegetacija. Srednje gusto žbunje. Slaba	5. Cjas				18	15,6	8	27,5	13	7					20	1,2	6,4	4,6	
				zakorovljenost. tip šume kitnjaka (Quercetum montanum cariecetosum	6. OTL				8	7,5	8	32,5	26	13					39	3,3	21,7	10,0	
				pilosae) na gajnjaci do lesiviranoj gajnjaci..								37,5	53						53	5,8	61,1		
												42,5	13						13	1,9	19,2		
				Izdanacka mešovita šuma lipa (izdanacka šuma lipa i graba) - jednodobna								47,5	13						13	2,3	25,9		
				(u optimalnoj fazi). Ocuvana sastojina. Mešovita sastojina (smeša								67,5	7						7	2,3	29,2		
				stablimicna) gustog sklopa (0.8 - 0.9). u celini zdravstveno stanje								UKUP.	217	86	26	33	7	13	382	21,1	172,6	27,4	6,9
				sastojine je dobro. po kvalitetu malo vredna sastojina (ima do 20%																			
				tehnickog drveta). Srednja ugroženost od insekata. Mala ugroženost od																			
				vetra. srednje negovana sastojina. Stabla srebrna lipa su zakrivljena i																			
				sa srednjim padom precnika (srednja punodrvnost), sa srednje dugim																			
				krošnjama (dužine izmedu 1/3 i 1/2 visine stabala) i ekscentricnim																			
				krošnjama, do 10% oštecenih stabala od vetra, snega i leda, suvih i																			
				suhovrhih stabala ima do 10%, zdravstveno stanje stabala ove vrste																			
				drveca je dobro. Stabla bagrema su prava i sa srednjim padom precnika																			
				(srednja punodrvnost), sa kratkim krošnjama (dužine izmedu 1/4 i1/3																			
				visine stabala) i uskim krošnjama, do 10% oštecenih stabala od vetra,																			
				snega i leda, suvih i suhovrhih stabala ima do 10%, zdravstveno stanje																			
44	d	59288484	0,73	stabala ove vrste drveca je dobro.																			
				Šuma - nalazi se na strani i na srednje strmom terenu (nagiba od 6° do	1. Bk	0,8		120	35	24,9	12	7,5	50	4	8				62	0,3	1,0	0,1	0,2
				10°) - nagib konkavan (ugnut). Nadmorska visina 320 do 355m.	2. Kit	0,1			44	22,1	10	12,5	12						12	0,1	0,7		
				Ekspozicija 1 istocna. Ne postoji ugroženost od erozije - stablian teren	3. SrLip	0,1			29	17,9	8	17,5				4			4	0,1			
				u prirodnim uslovima. Mrtvi pokrivac srednje zastupljen - povoljan proces	4. Gr				26	16,7	10	22,5				8			8	0,3			
				humifikacije. Retka prizemna vegetacija. Retko žbunje. Slaba								27,5	4			4			8	0,5	1,8		
				zakorovljenost. tip šume bukve i kitnjaka (Querco-Fagetum caricetosum								32,5	8		4	8			19	1,6	7,6		2,5
				silvaticae) na beskarbonatnom deluvijumu..								37,5	12		8				19	2,1	14,4		8,4
												42,5	33	4					36	5,2	54,0	5,9	
				Izdanacka mešovita šuma bukve - jednodobna (u fazi razgradnje).								47,5	25	4					29	5,1	53,0	7,7	
				Razredjena sastojina. Mešovita sastojina (smeša stablimicna) nepotpunog								52,5	12	4	4				19	4,1	29,2	10,1	9,2
				sklopa (0.5-0.6). u celini zdravstveno stanje sastojine je osrednje. po								57,5	2	8					10	2,5	5,7	24,2	
				kvalitetu malo vredna sastojina (ima do 20% tehnickog drveta). Srednja								62,5	17						17	5,3	62,8		
				ugroženost od insekata. Mala ugroženost od vetra. pogrešno negovana								67,5	12						12	4,1	49,7		
				sastojina. Stabla kitnjaka su zakrivljena i sa srednjim padom precnika								UKUP.	184	23	23	23			254	31,3	279,8	48,0	20,3
				(srednja punodrvnost), sa srednje dugim krošnjama (dužine izmedu 1/3 i																			
				1/2 visine stabala) i normalno razvijenim krošnjama, do 10% oštecenih																			
				stabala od vetra, snega i leda, do 10% oštecenih stabala od insekata i																			
				fitopatoloških obolenja, suvih i suhovrhih stabala ima do 10%,																			
				zdravstveno stanje stabala ove vrste drveca je osrednje. Stabla bukve su																			
				zakrivljena i sa srednjim padom precnika (srednja punodrvnost), sa																			
				srednje dugim krošnjama (dužine izmedu 1/3 i 1/2 visine stabala) i																			
				normalno razvijenim krošnjama, do 10% oštecenih stabala od vetra, snega i																			
				leda, suvih i suhovrhih stabala ima do 10%, zdravstveno stanje stabala																			
44	e	59361603	2,38	ove vrste drveca je dobro.																			
				Šuma - nalazi se na platou i na srednje strmom terenu (nagiba od 6° do	1. Kit																		

ОПИС СТАНИШТА И САСТОЈИНА

Ozn.mesta		gazdi-	površ-	OPIS	Osnovni taksacioni elementi						visi	deb.	Broj stabala po hektaru							G	Zapremina po		
ode-	od-	nska	ina		vrsta	sme	obr	sta-	sred.stablo		nski			Vrsta drveta						po		Vrsta drv	
ljenje	sek	klasa	ha		drveća	sa	ast	rost	Ds	Hs	step.	st.	1	2	3	4	5	6	svg.	ha	1	2	3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
				10°) - nagib ujednacen. Nadmorska visina 340 do 350m. Ekspozicija 1 bez																			
				jasno izražene ekspozicije. Ne postoji ugroženost od erozije - stablian																			
				teren u prirodnim uslovima. Mrtvi pokrivac srednje zastupljen -																			
				nepovoljan proces humifikacije. Srednje gusta prizemna vegetacija. Gusto																			
				žbunje. Jaka zakorovljenost. tip šume kitnjaka i graba sa klokocikom																			
				(Querco-Carpinetum staphyletosum) na kiselom smedem do lesiviranom																			
				kiselom smedjem zemljištu..																			
44	f	59266263	1,62	Šikara (šikara kitnjaka.).																			
				Šuma - nalazi se na strani i na strmom terenu (nagiba od 11° do 15°) -	1. Kit																		
				nagib konveksan (ispupcen). Nadmorska visina 335 do 385m. Ekspozicija 1																			
				istocna. Ne postoji ugroženost od erozije - stablian teren u prirodnim																			
				uslovima. Mrtvi pokrivac srednje zastupljen - povoljan proces																			
				humifikacije. Retka prizemna vegetacija. Srednje gusto žbunje. Srednja																			
				zakorovljenost. tip šume kitnjaka (Quercetum montanum typicum) na kiselom																			
				smedem i lesiviranom kiselom smedjem zemljištu..																			
44	g	59266482	4,42	Šikara.																			

ОПИС СТАНИШТА И САСТОЈИНА

Ozn.mesta		gazdi-	površ-	OPIS	Osnovni taksacioni elementi						visi	deb.	Broj stabala po hektaru							G	Zapremina po		
ode-	od-	nska	ina		vrsta	sme	obr	sta-	sred.stablo		nski			Vrsta drveta						po		Vrsta drv	
ljenje	sek	klasa	ha		drveća	sa	ast	rost	Ds	Hs	step.	st.	1	2	3	4	5	6	svg.	ha	1	2	3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
				Šuma - nalazi se na strani i na strmom terenu (nagiba od 11° do 15°) -	1. Bag			6															
				nagib ujednacen. Nadmorska visina 335 do 370m. Ekspozicija 1 jug -	2. OTL																		
				jugoistok. Ne postoji ugroženost od erozije - stablian teren u prirodnim																			
				uslovima. Mrtvi pokrivac slabo zastupljen - povoljan proces humifikacije.																			
				Gusta prizemna vegetacija. Nema žbunja. Jaka zakorovljenost. tip šume																			
				kitnjaka (Quercetum montanum typicum) na kiselom smedem i lesiviranom																			
				kiselom smedjem zemljištu..																			
				Izdanacka šuma bagrema - jednodobna (u optimalnoj fazi). Ocuvana																			
				sastojina. Mešovita sastojina (smeša stablimicna) gustog sklopa (0.8 -																			
				0.9). u celini zdravstveno stanje sastojine je dobro. po kvalitetu																			
				sastojina bez vrednosti (bez ucešca tehnickog drveta). Srednja ugroženost																			
44	h	59325482	0,76	od insekata. pogrešno negovana sastojina.																			
				Šuma - nalazi se na strani i na strmom terenu (nagiba od 11° do 15°) -	1. SrLip	0,4		93	19	14,8	9	7,5	106	34		29			169	0,7	1,9	0,4	
				nagib valovit. Nadmorska visina 285 do 385m. Ekspozicija 1 jug -	2. Gr	0,4			25	16,7	11	12,5	58			24		10	92	1,1	3,0		
				jugoistok. Ne postoji ugroženost od erozije - stablian teren u prirodnim	3. Kit	0,3			48	21,4	11	17,5	34	24			24		82	2,0	4,9	3,6	
				uslovima. Mrtvi pokrivac slabo zastupljen - povoljan proces humifikacije.	4. Bk				10	8,5	14	22,5		19					19	0,8		6,1	
				Retka prizemna vegetacija. Retko žbunje. Slaba zakorovljenost. tip šume	5. Slip				18	13,5	9	27,5		24					24	1,4		11,3	
				kitnjaka (Quercetum montanum typicum) na kiselom smedem i lesiviranom	6. PlBr				13	10,5	11	32,5	10	34					44	3,6	7,5	28,3	
				kiselom smedjem zemljištu..								37,5	29	34					63	6,9	27,1	35,0	
												42,5	10	10	10				29	4,1	13,1	13,9	13,2
				Izdanacka mešovita šuma lipa - jednodobna (u fazi razgradnje). Ocuvana								47,5	10		19				29	5,1	15,3		38,5
				sastojina. Mešovita sastojina (smeša stablimicna) potpunog sklopa (0.7).								52,5			10				10	2,1			23,2
				u celini zdravstveno stanje sastojine je osrednje. po kvalitetu malo								57,5	10						10	2,5	27,7		
				vredna sastojina (ima do 20% tehnickog drveta). Srednja ugroženost od								UKUP.	266	179	39	53	24	10	570	30,4	100,7	98,8	74,8
				insekata. Srednja ugroženost od fitopatoloških oboljenja-oboljenja lista.																			
				srednje negovana sastojina. Stabla graba su zakrivljena i sa srednjim																			
				padom precnika (srednja punodrvnost), sa srednje dugim krošnjama (dužine																			
				izmedu 1/3 i 1/2 visine stabala) i normalno razvijenim krošnjama, do 10%																			
				oštecenih stabala od insekata, suvih i suhovrhih stabala ima do 10%,																			
				zdravstveno stanje stabala ove vrste drveca je osrednje. Stabla srebrna																			
				lipa su zakrivljena i sa srednjim padom precnika (srednja punodrvnost),																			
				sa srednje dugim krošnjama (dužine izmedu 1/3 i 1/2 visine stabala) i																			
				ekscentricnim krošnjama, do 10% oštecenih stabala od insekata, suvih i																			
				suhovrhih stabala ima do 10%, zdravstveno stanje stabala ove vrste																			
				drveca je dobro. Stabla kitnjaka su zakrivljena i sa srednjim padom																			
				precnika (srednja punodrvnost), sa srednje dugim krošnjama (dužine izmedu																			
				1/3 i 1/2 visine stabala) i normalno razvijenim krošnjama, do 10%																			
				oštecenih stabala od insekata i fitopatoloških obolenja, suvih i																			
				suhovrhih stabala ima do 10%, zdravstveno stanje stabala ove vrste																			
44	i	59288482	0,31	drveca je osrednje.																			
				Šuma - nalazi se na strani i na vrlo strmom terenu (nagiba od 21° do	1. Med	1,0		45	22	12,3	15	7,5		20					20	0,1		0,4	
				25°) - nagib ujednacen. Nadmorska visina 220 do 320m. Ekspozicija 1 jug	2. Cjas				9	8,8	14	12,5		10	10				20	0,2		0,4	0,4
				- jugozapad. Ne postoji ugroženost od erozije - stablian teren u	3. OTL				13	10,1	14	17,5	50						50	1,2	6,7		
				prirodnim uslovima. Mrtvi pokrivac slabo zastupljen - povoljan proces								22,5	20						20	0,8	4,2		
				humifikacije. Retka prizemna vegetacija. Gusto žbunje. Jaka								27,5	20						20	1,2	7,2		
				zakorovljenost. tip šume razlicitih hrastova sa crnim jasenom								32,5	10						10	0,8	5,4		
				(Orno-Polyquercetum) na slabo razvijenim zemljištima na krecnjacima i								UKUP.	100	30	10				140	4,3	23,5	0,8	0,4

ОПИС СТАНИШТА И САСТОЈИНА

Ozn.mesta		gazdi-	površ-	OPIS	Osnovni taksacioni elementi						visi	deb.	Broj stabala po hektaru							G	Zapremina po		
ode-	od-	nska	ina		vrsta	sme	obr	sta-	sred.stablo		nski			Vrsta drveta						po		Vrsta drv	
ljenje	sek	klasa	ha		drveća	sa	ast	rost	Ds	Hs	step.	st.	1	2	3	4	5	6	svg.	ha	1	2	3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
				bazicnim silikatnim stenama..																			
				Devastirana šuma medunca (izdanacka devastirana šuma medunca i crnog																			
				jasena) - jednodobna (u fazi izgradnje). Devastirana (previše razredjena)																			
				sastojina. Mešovita sastojina (smeša stablimicna) vrlo retkog sklopa																			
				(0.4). u celini zdravstveno stanje sastojine je osrednje. po kvalitetu																			
				sastojina bez vrednosti (bez ucešca tehnickog drveta). Srednja ugroženost																			
				od insekata. Srednja ugroženost od drugih štetnih uticaja. pogrešno																			
45	a	59237371	13,53	negovana sastojina.																			
				Šuma - nalazi se na strani i na vrlo strmom terenu(nagiba od 16° do	1. SrLip	0,9		45	21	11,0	13	7,5		10	20				30	0,1		0,2	0,4
				20°) - nagib valovit. Nadmorska visina 240 do 325m. Ekspozicija 1 jug -	2. OTL	0,1			13	8,1	15	12,5	20	10	10				40	0,5	1,1	0,5	0,3
				jugozapad. Ne postoji ugroženost od erozije - stablian teren u prirodnim	3. Gr				9	6,3	15	17,5	30	10					40	1,0	3,7	1,0	
				uslovima. Mrtvi pokrivac slabo zastupljen - povoljan proces humifikacije.								22,5	10						10	0,4	2,2		
				Gusta prizemna vegetacija. Gusto žbunje. Jaka zakorovljenost. tip šume								27,5	20						20	1,2	6,6		
				razlicitih hrastova i graba (Carpino-Polyquercetum typicum) na intervalu								32,5	10						10	0,8	6,4		
				zemljišta od duboke pararendzine na lesu do lesivirane gajnjace..								UKUP.	90	30	30				150	4,0	19,9	1,6	0,7
				Devastirana šuma lipa (izdanacka devastirana šuma lipa, graba i cera) -																			
				jednodobna (u fazi izgradnje). Devastirana (previše razredjena)																			
				sastojina. Mešovita sastojina (smeša stablimicna) vrlo retkog sklopa																			
				(0.4). u celini zdravstveno stanje sastojine je osrednje. po kvalitetu																			
				sastojina bez vrednosti (bez ucešca tehnickog drveta). Srednja ugroženost																			
				od insekata. Srednja ugroženost od drugih štetnih uticaja. pogrešno																			
45	b	59289201	25,05	negovana sastojina.																			

Ozn.mesta		gazdi-	površ-	OPIS	Osnovni taksacioni elementi						visi	deb.	Broj stabala po hektaru							G	Zapremina po		
ode-	od-	nska	ina		vrsta	sme	obr	sta-	sred.stablo		nski			Vrsta drveta						po		Vrsta drv	
ljenje	sek	klasa	ha		drveća	sa	ast	rost	Ds	Hs	step.	st.	1	2	3	4	5	6	svg.	ha	1	2	3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
				Šuma - nalazi se na platou i na blago nagnutom terenu (nagiba do 5°) -	1. CB	1,0		53	22	18,8	1	12,5	160	50	11		5	6	231	2,8	12,4	4,2	0,9
				nagib ujednacen. Nadmorska visina 325 do 350m. Ekspozicija 1 bez jasno	2. SrLip				13	11,6	4	17,5	154			6			160	3,8	31,3		
				izražene ekspozicije. Ne postoji ugroženost od erozije - stablian teren u	3. Gr				13	11,6	7	22,5	199						199	7,9	80,6		
				prirodnim uslovima. Mrtvi pokrivac srednje zastupljen - nepovoljan proces	4. Bag				18	15,7	13	27,5	143						143	8,5	94,6		
				humifikacije. Retka prizemna vegetacija. Srednje gusto žbunje. Srednja	5. Cjas				13	11,6	7	32,5	44						44	3,7	42,7		
				zakorovljenost. tip šume kitnjaka (Quercetum montanum typicum) na kiselom	6. Tre				13	11,6	4	37,5	39						39	4,2	54,9		
				smedem i lesiviranom kiselom smedjem zemljištu..								UKUP.	739	50	11	6	5	6	816	31,0	316,6	4,2	0,9
				Veštacki podignuta sastojina crnog bora - jednodobna (srednjedobna)																			
				sastojina. Ocuvana sastojina. Cista sastojina (smeša stablimicna) vrlo																			
				gustog sklopa (1.0). u celini zdravstveno stanje sastojine je osrednje.																			
				po kvalitetu malo vredna sastojina (ima do 20% tehnickog drveta). Srednja																			
				ugroženost od insekata. Srednja ugroženost od fitopatoloških																			
				oboljenja-oboljenja lista. nenegovana sastojina. 0. Stabla crni bor su																			
				prava i sa srednjim padom precnika (srednja punodrvnost), sa kratkim																			
				krošnjama (dužine izmedu 1/4 i1/3 visine stabala) i ekscentricnim																			
				krošnjama, do 10% oštecenih stabala od insekata i fitopatoloških																			
				obolenja, suvih i suhovrhih stabala ima do 10%, zdravstveno stanje																			
45	c	59475482	6,07	stabala ove vrste drveca je dobro.																			
				Šuma - nalazi se na platou i na blago nagnutom terenu (nagiba do 5°) -	1. SrLip	0,6		25	12	11,0	9	7,5	332	33	33	33		33	465	2,1	6,6	0,5	0,5
				nagib ujednacen. Nadmorska visina 340 do 350m. Ekspozicija 1 bez jasno	2. Jas	0,2			14	12,7	17	12,5	199	149	17		17		381	4,7	15,5	8,4	0,9
				izražene ekspozicije. Ne postoji ugroženost od erozije - stablian teren u	3. Gr	0,1			14	11,2	9	17,5	83	66		17			166	4,0	12,1	8,8	
				prirodnim uslovima. Mrtvi pokrivac slabo zastupljen - povoljan proces	4. Kit				11	10,9	11	22,5	83	33	33				149	5,9	25,3	9,3	11,7
				humifikacije. Retka prizemna vegetacija. Srednje gusto žbunje. Srednja	5. OTL				13	10,6	13	27,5	17						17	1,0	8,8		
				zakorovljenost. tip šume kitnjaka (Quercetum montanum typicum) na kiselom	6. Klen				8	7,2	11												
				smedem i lesiviranom kiselom smedjem zemljištu..								UKUP.	714	281	83	50	17	33	1177	17,6	68,4	27,0	13,1
				Izdanacka mešovita šuma lipa - jednodobna (u optimalnoj fazi). Ocuvana																			
				sastojina. Mešovita sastojina (smeša stablimicna) potpunog sklopa (0.7).																			
				u celini zdravstveno stanje sastojine je osrednje. po kvalitetu malo																			
				vredna sastojina (ima do 20% tehnickog drveta). Srednja ugroženost od																			
				insekata. Srednja ugroženost od drugih štetnih uticaja. nenegovana																			
				sastojina. Stabla srebrna lipa su zakrivljena i sa srednjim padom																			
				precnika (srednja punodrvnost), sa srednje dugim krošnjama (dužine izmedu																			
				1/3 i 1/2 visine stabala) i ekscentricnim krošnjama, do 10% oštecenih																			
				stabala od insekata i fitopatoloških obolenja, suvih i suhovrhih stabala																			
45	d	59288482	0,70	ima do 10%, zdravstveno stanje stabala ove vrste drveca je osrednje.																			
				Šuma - nalazi se na strani i na srednje strmom terenu (nagiba od 6° do	1. CB	1,0		45	23	15,0	9	12,5	72	25					97	1,2	3,7	1,3	
				10°) - nagib ujednacen. Nadmorska visina 335 do 350m. Ekspozicija 1 jug	2. Klen				13	6,6	11	17,5	95						95	2,3	14,3		
				- jugoistok. Ne postoji ugroženost od erozije - stablian teren u								22,5	289						289	11,5	90,6		
				prirodnim uslovima. Mrtvi pokrivac slabo zastupljen - nepovoljan proces								27,5	170						170	10,1	84,0		
				humifikacije. Gusta prizemna vegetacija. Gusto žbunje. Jaka								32,5	99						99	8,2	76,3		
				zakorovljenost. tip šume kitnjaka sa mahovinom (Musco-Quercetum montanum								UKUP.	724	25					749	33,2	269,0	1,3	
				na erodiranom, skeletnom, jako kiselom smedem zemljištu..																			
				Veštacki podignuta sastojina crnog bora - jednodobna (srednjedobna)																			
				sastojina. Ocuvana sastojina. Cista sastojina (smeša stablimicna) vrlo																			
				gustog sklopa (1.0). u celini zdravstveno stanje sastojine je osrednje.																			

ОПИС СТАНИШТА И САСТОЈИНА

Ozn.mesta		gazdi-	površ-	OPIS	Osnovni taksacioni elementi						visi	deb.	Broj stabala po hektaru							G	Zapremina po		
ode-	od-	nska	ina		vrsta	sme	obr	sta-	sred.stablo		nski			Vrsta drveta						po		Vrsta drv	
ljenje	sek	klasa	ha		drveća	sa	ast	rost	Ds	Hs	step.	st.	1	2	3	4	5	6	svg.	ha	1	2	3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
				po kvalitetu malo vredna sastojina (ima do 20% tehnickog drveta). Srednja																			
				ugroženost od insekata. Srednja ugroženost od požara. nenegovana																			
				sastojina. Stabla crni bor su prava i sa srednjim padom precnika																			
				(srednja punodrvnost), sa kratkim krošnjama (dužine izmedu 1/4 i1/3																			
				visine stabala) i ekscentricnim krošnjama, do 10% oštecenih stabala , do																			
				10% oštecenih stabala od insekata i fitopatoloških obolenja, suvih i																			
				suhovrhih stabala ima do 10%, zdravstveno stanje stabala ove vrste																			
45	e	59475489	0,48	drveca je osrednje.																			

Ozn.mesta		gazdi-	površ-	OPIS	Osnovni taksacioni elementi						visi	deb.	Broj stabala po hektaru							G	Zapremina po		
ode-	od-	nska	ina		vrsta	sme	obr	sta-	sred.stablo		nski			Vrsta drveta						po		Vrsta drv	
ljenje	sek	klasa	ha		drveća	sa	ast	rost	Ds	Hs	step.	st.	1	2	3	4	5	6	svg.	ha	1	2	3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
				Šuma - nalazi se na strani i na srednje strmom terenu (nagiba od 6° do	1. CB	1,0		45	24	16,3	8	12,5	60	10	10				80	1,0	4,6	0,5	0,7
				10°) - nagib ujednacen. Nadmorska visina 330 do 350m. Ekspozicija 1	2. SrLip				21	15,9	8	17,5	189						189	4,5	35,7		
				istocna. Mrtvi pokrivac slabo zastupljen - nepovoljan proces	3. Klen				13	13,5	10	22,5	179	20					199	7,9	61,8	6,7	
				humifikacije. Srednje gusta prizemna vegetacija. Srednje gusto žbunje.								27,5	219	10					229	13,6	127,2	4,2	
				Srednja zakorovljenost. tip šume kitnjaka sa mahovinom (Musco-Quercetum								32,5	90						90	7,4	75,0		
				montanum) na erodiranom, skeletnom, jako kiselom smedem zemljištu..								37,5	10						10	1,1	10,7		
												42,5	10						10	1,4	15,7		
				Veštacki podignuta sastojina crnog bora - jednodobna (srednjedobna)								UKUP.	756	40	10				806	36,9	330,6	11,4	0,7
				sastojina. Ocuvana sastojina. Cista sastojina (smeša stablimicna) vrlo																			
				gustog sklopa (1.0). u celini zdravstveno stanje sastojine je osrednje.																			
				po kvalitetu malo vredna sastojina (ima do 20% tehnickog drveta). Srednja																			
				ugroženost od insekata. Srednja ugroženost od fitopatoloških																			
				oboljenja-oboljenja kore. nenegovana sastojina. Stabla crni bor su prava																			
				i sa srednjim padom precnika (srednja punodrvnost), sa kratkim krošnjama																			
				(dužine izmedu 1/4 i1/3 visine stabala) i ekscentricnim krošnjama, do 10%																			
				oštecenih stabala od požara, do 10% oštecenih stabala od insekata i																			
				fitopatoloških obolenja, suvih i suhovrhih stabala ima do 10%,																			
45	f	59475489	2,01	zdravstveno stanje stabala ove vrste drveca je osrednje.																			
				Šuma - nalazi se na strani i na srednje strmom terenu (nagiba od 6° do	1. CB	1,0		45	23	16,3	7	12,5	96	20	10				125	1,5	7,0	1,6	0,7
				10°) - nagib ujednacen. Nadmorska visina 315 do 325m. Ekspozicija 1 jug	2. SrLip				19	15,7	7	17,5	149						149	3,6	27,9		
				- jugozapad. Ne postoji ugroženost od erozije - stablian teren u	3. Klen				13	14,2	10	22,5	173	10					183	7,3	57,9	3,7	
				prirodnim uslovima. Mrtvi pokrivac slabo zastupljen - povoljan proces								27,5	137	10					147	8,7	79,6	4,5	
				humifikacije. Retka prizemna vegetacija. Srednje gusto žbunje. Srednja								32,5	80						80	6,6	65,8		
				zakorovljenost. tip šume razlicitih hrastova i graba								37,5	10						10	1,1	10,9		
				(Carpino-Polyquercetum typicum) na intervalu zemljišta od duboke								42,5	10						10	1,4	16,1		
				pararendzine na lesu do lesivirane gajnjace..								UKUP.	655	40	10				704	30,2	265,1	9,7	0,7
				Veštacki podignuta sastojina crnog bora - jednodobna (srednjedobna)																			
				sastojina. Ocuvana sastojina. Cista sastojina (smeša stablimicna)																			
				potpunog sklopa (0.7). u celini zdravstveno stanje sastojine je osrednje.																			
				po kvalitetu malo vredna sastojina (ima do 20% tehnickog drveta). Srednja																			
				ugroženost od požara. Srednja ugroženost od drugih štetnih uticaja.																			
				nenegovana sastojina. Stabla crni bor su prava i sa srednjim padom																			
				precnika (srednja punodrvnost), sa kratkim krošnjama (dužine izmedu 1/4																			
				i1/3 visine stabala) i ekscentricnim krošnjama, do 10% oštecenih stabala																			
				od požara, do 10% oštecenih stabala od insekata i fitopatoloških																			
				obolenja, suvih i suhovrhih stabala ima do 10%, zdravstveno stanje																			
45	g	59475201	0,22	stabala ove vrste drveca je osrednje.																			
				Vocnjak.																			
45	1	60	0,99																				
				Livada.																			
45	2	60	0,15																				
				Livada.																			

ОПИС СТАНИШТА И САСТОЈИНА

Ozn.mesta		gazdi-	površ-	OPIS	Osnovni taksacioni elementi						visi	deb.	Broj stabala po hektaru							G	Zapremina po		
ode-	od-	nska	ina		vrsta	sme	obr	sta-	sred.stablo		nski			Vrsta drveta						po		Vrsta drv	
ljenje	sek	klasa	ha		drveća	sa	ast	rost	Ds	Hs	step.	st.	1	2	3	4	5	6	svg.	ha	1	2	3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
45	3	60	1,48																				
				Put.																			
45	4	59	0,04																				

Ozn.mesta		gazdi-	površ-	OPIS	Osnovni taksacioni elementi						visi	deb.	Broj stabala po hektaru							G	Zapremina po		
ode-	od-	nska	ina		vrsta	sme	obr	sta-	sred.stablo		nski			Vrsta drveta						po		Vrsta drv	
ljenje	sek	klasa	ha		drveća	sa	ast	rost	Ds	Hs	step.	st.	1	2	3	4	5	6	svg.	ha	1	2	3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
				Šuma - nalazi se na platou i na blago nagnutom terenu (nagiba do 5°) -	1. Kit	0,4		99	34	21,1	11	7,5		28		7	7		43	0,2		1,0	
				nagib ujednacen. Nadmorska visina 350 do 370m. Ekspozicija 1 bez jasno	2. Gr	0,3			19	16,6	8	12,5		64		14	7		85	1,0		6,4	
				izražene ekspozicije. Mrtvi pokrivac srednje zastupljen - povoljan proces	3. Klen	0,1			29	15,8	13	17,5		21	10	14			45	1,1		4,8	1,5
				humifikacije. Nema prizemne vegetacije. Retko žbunje. Slaba	4. SrLip	0,1			25	16,8	10	22,5	3	67	3		20		92	3,7	1,0	26,0	0,9
				zakorovljenost. tip šume kitnjaka, graba i cera (Carpino-Quercetum	5. Cjas				19	14,5	10	27,5	35	47	31	7			121	7,2	18,8	27,2	14,8
				petraeae-cerris typicum) na intervalu zemljišta od pararendzine na lesu i	6. Cer				38	20,0	10	32,5	34	16	11			3	64	5,3	26,7	13,9	8,2
				laporcu do lesivirane gajnjace ..								37,5	38		9	14	3		64	7,1	44,6		7,2
												42,5	3					3	6	0,8	3,9		
				Izdanacka mešovita šuma kitnjaka - jednodobna (u fazi razgradnje).								47,5	3		3				6	1,0	6,3		4,0
				Ocuvana sastojina. Mešovita sastojina (smeša stablimicna) gustog sklopa								52,5				7			7	1,5			
				(0.8 - 0.9). u celini zdravstveno stanje sastojine je osrednje. po								92,5	3						3	1,9	24,1		
				kvalitetu malo vredna sastojina (ima do 20% tehnickog drveta). Srednja								UKUP.	119	243	67	64	37	6	535	30,8	125,4	79,2	36,7
				ugroženost od insekata. Srednja ugroženost od fitopatoloških																			
				oboljenja-oboljenja lista. srednje negovana sastojina. Stabla graba su																			
				zakrivljena i sa velikim padom precnika (mala punodrvnost), sa dugim																			
				krošnjama (dužine izmedu 1/2 i 2/3 visine stabala) i ekscentricnim																			
				krošnjama, do 10% oštecenih stabala od guljenja kore, suvih i suhovrhih																			
				stabala ima do 10%, zdravstveno stanje stabala ove vrste drveca je																			
				osrednje. Stabla srebrna lipa su zakrivljena i sa srednjim padom precnika																			
				(srednja punodrvnost), sa srednje dugim krošnjama (dužine izmedu 1/3 i																			
				1/2 visine stabala) i ekscentricnim krošnjama, do 10% oštecenih stabala																			
				od guljenja kore, suvih i suhovrhih stabala ima do 10%, zdravstveno																			
				stanje stabala ove vrste drveca je osrednje. Stabla kitnjaka su																			
				zakrivljena i sa srednjim padom precnika (srednja punodrvnost), sa																			
				srednje dugim krošnjama (dužine izmedu 1/3 i 1/2 visine stabala) i																			
				normalno razvijenim krošnjama, do 10% oštecenih stabala od insekata i																			
				fitopatoloških obolenja, suvih i suhovrhih stabala ima do 10%,																			
46	a	60307246	3,45	zdravstveno stanje stabala ove vrste drveca je osrednje.																			
				Šuma - nalazi se na strani i na srednje strmom terenu (nagiba od 6° do	1. Kit	0,5		99	32	22,6	7	7,5		10	5				15	0,1		0,5	0,1
				10°) - nagib ujednacen. Nadmorska visina 330 do 365m. Ekspozicija 1	2. Gr	0,3			20	18,9	6	12,5		39		5			44	0,5		4,2	
				severna. Mrtvi pokrivac srednje zastupljen - povoljan proces	3. SrLip	0,2			30	22,0	4	17,5		20		5	5		30	0,7		3,9	
				humifikacije. Retka prizemna vegetacija. Retko žbunje. Slaba	4. Bk	0,1			26	20,6	9	22,5	20	40	5				64	2,5	7,6	14,8	2,0
				zakorovljenost. tip šuma kitnjaka i graba sa lazarkinjom (Querco -	5. Klen				24	20,0	7	27,5	20	24		5	10		59	3,5	12,1	15,0	
				Carpinetum asperulosum) na gajnjaci do lesiviranoj gajnjaci i lesiviranom								32,5	35	10	20	5			69	5,7	35,2	10,1	18,8
				smedem zemljištu na serpentinitu ..								37,5	20	5	5	5			35	3,8	24,7	6,2	5,8
												42,5	10		5				15	2,1	16,8		7,4
				Izdanacka mešovita šuma kitnjaka - jednodobna (u fazi razgradnje).								UKUP.	104	147	40	25	15		330	19,0	96,4	54,8	34,1
				Ocuvana sastojina. Mešovita sastojina (smeša stablimicna) vrlo gustog																			
				sklopa (1.0). u celini zdravstveno stanje sastojine je osrednje. po																			
				kvalitetu malo vredna sastojina (ima do 20% tehnickog drveta). Srednja																			
				ugroženost od insekata. Srednja ugroženost od fitopatoloških																			
				oboljenja-oboljenja lista. srednje negovana sastojina. Stabla graba su																			
				zakrivljena i sa velikim padom precnika (mala punodrvnost), sa dugim																			
				krošnjama (dužine izmedu 1/2 i 2/3 visine stabala) i normalno razvijenim																			
				krošnjama, do 10% oštecenih stabala od insekata i fitopatoloških																			
				obolenja, suvih i suhovrhih stabala ima do 10%, zdravstveno stanje																			
				stabala ove vrste drveca je osrednje. Stabla kitnjaka su zakrivljena i sa																			
				srednjim padom precnika (srednja punodrvnost), sa srednje dugim krošnjama																			

ОПИС СТАНИШТА И САСТОЈИНА

Ozn.mesta		gazdi-	površ-	OPIS	Osnovni taksacioni elementi						visi	deb.	Broj stabala po hektaru							G	Zapremina po		
ode-	od-	nska	ina		vrsta	sme	obr	sta-	sred.stablo		nski			Vrsta drveta						po		Vrsta drv	
ljenje	sek	klasa	ha		drveća	sa	ast	rost	Ds	Hs	step.	st.	1	2	3	4	5	6	svg.	ha	1	2	3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
				(dužine izmedu 1/3 i 1/2 visine stabala) i normalno razvijenim krošnjama,																			
				do 10% oštecenih stabala od guljenja kore, do 10% oštecenih stabala od																			
				insekata i fitopatoloških obolenja, suvih i suhovrhih stabala ima do 10%,																			
				zdravstveno stanje stabala ove vrste drveca je osrednje. Stabla bukve su																			
				zakrivljena i sa srednjim padom precnika (srednja punodrvnost), sa																			
				srednje dugim krošnjama (dužine izmedu 1/3 i 1/2 visine stabala) i																			
				normalno razvijenim krošnjama, do 10% oštecenih stabala od insekata i																			
				fitopatoloških obolenja, suvih i suhovrhih stabala ima do 10%,																			
46	b	60307261	1,86	zdravstveno stanje stabala ove vrste drveca je osrednje.																			

Ozn.mesta		gazdi-	površ-	OPIS	Osnovni taksacioni elementi						visi	deb.	Broj stabala po hektaru							G	Zapremina po		
ode-	od-	nska	ina		vrsta	sme	obr	sta-	sred.stablo		nski			Vrsta drveta						po		Vrsta drv	
ljenje	sek	klasa	ha		drveća	sa	ast	rost	Ds	Hs	step.	st.	1	2	3	4	5	6	svg.	ha	1	2	3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
				Šuma - nalazi se na strani i na strmom terenu (nagiba od 11° do 15°) -	1. SrLip	0,3		74	31	19,0	9	7,5	13		72	45		2	132	0,6	0,2		1,6
				nagib valovit. Nadmorska visina 280 do 365m. Ekspozicija 1 severna.	2. Kit	0,4			31	18,3	11	12,5			21	29		5	55	0,7			1,8
				Mrtvi pokrivac srednje zastupljen - povoljan proces humifikacije. Nema	3. Bk	0,2			16	12,4	14	17,5	8	5	11	10			33	0,8	1,4	1,2	1,7
				prizemne vegetacije. Retko žbunje. Nema zakorovljenosti. tip šume bukve i	4. Gr	0,1			15	12,1	11	22,5	10	20	11	28			69	2,7	2,7	6,5	3,8
				kitnjaka (Querco-Fagetum typicum) na kiselom smedem i lesiviranom kiselom	5. Cer				38	19,8	10	27,5	21	28	19	11		5	84	5,0	10,4	15,2	10,7
				smedjem zemljištu..	6. OTL				18	13,4	11	32,5	5	38	9	5			57	4,8	3,6	30,9	6,6
												37,5	15	29	11		8		62	6,8	15,4	30,1	12,2
				Izdanacka mešovita šuma bukve - jednodobna (u optimalnoj fazi). Ocuvana								42,5	30	11					40	5,7	42,3	16,2	
				sastojina. Mešovita sastojina (smeša stablimicna) gustog sklopa (0.8 -								47,5			2				2	0,4			4,2
				0.9). u celini zdravstveno stanje sastojine je osrednje. po kvalitetu								52,5	6						6	1,3	14,3		
				malo vredna sastojina (ima do 20% tehnickog drveta). Srednja ugroženost								UKUP.	107	131	156	127	8	13	541	28,8	90,2	100,1	42,6
				od insekata. Srednja ugroženost od fitopatoloških oboljenja-oboljenja																			
				lista. srednje negovana sastojina. Stabla srebrna lipa su zakrivljena i																			
				sa srednjim padom precnika (srednja punodrvnost), sa srednje dugim																			
				krošnjama (dužine izmedu 1/3 i 1/2 visine stabala) i ekscentricnim																			
				krošnjama, do 10% oštecenih stabala od insekata i fitopatoloških																			
				obolenja, suvih i suhovrhih stabala ima do 10%, zdravstveno stanje																			
				stabala ove vrste drveca je dobro. Stabla kitnjaka su zakrivljena i sa																			
				srednjim padom precnika (srednja punodrvnost), sa srednje dugim krošnjama																			
				(dužine izmedu 1/3 i 1/2 visine stabala) i normalno razvijenim krošnjama,																			
				do 10% oštecenih stabala od insekata i fitopatoloških obolenja, suvih i																			
				suhovrhih stabala ima do 10%, zdravstveno stanje stabala ove vrste																			
				drveca je osrednje. Stabla bukve su zakrivljena i sa srednjim padom																			
				precnika (srednja punodrvnost), sa srednje dugim krošnjama (dužine izmedu																			
				1/3 i 1/2 visine stabala) i normalno razvijenim krošnjama, suvih i																			
				suhovrhih stabala ima do 10%, zdravstveno stanje stabala ove vrste																			
46	c	60361602	4,24	drveca je dobro.																			
				Šuma - nalazi se na strani i na srednje strmom terenu (nagiba od 6° do	1. Kit	0,6		99	33	18,6	11	7,5		16	104		66		187	0,8		0,2	2,1
				10°) - nagib konkavan (ugnut). Nadmorska visina 295 do 320m.	2. SrLip	0,3			25	16,3	9	12,5		49	92				142	1,7		3,2	5,9
				Ekspozicija 1 severna. Mrtvi pokrivac srednje zastupljen - povoljan	3. Gr	0,1			13	10,5	11	17,5			20				20	0,5			3,3
				proces humifikacije. Retka prizemna vegetacija. Retko žbunje. Slaba	4. Orah				48	21,2	10	22,5	33		20				53	2,1	9,7		6,1
				zakorovljenost. tip šume kitnjaka (Quercetum montanum typicum) na kiselom	5. Bag				8	6,4	17	27,5	17		7				23	1,4	10,3		3,6
				smedem i lesiviranom kiselom smedjem zemljištu..								32,5	65	33					98	8,1	57,0	22,7	
												37,5	33		7				39	4,3	36,8		6,3
				Izdanacka mešovita šuma kitnjaka - jednodobna (u fazi razgradnje).								42,5	33						33	4,6	51,7		
				Ocuvana sastojina. Mešovita sastojina (smeša stablimicna) potpunog sklopa								47,5		17		7			23	4,1		31,7	
				(0.7). u celini zdravstveno stanje sastojine je osrednje. po kvalitetu								62,5		7					7	2,0		19,6	
				malo vredna sastojina (ima do 20% tehnickog drveta). Srednja ugroženost								UKUP.	180	121	249	7	66		623	29,7	165,4	77,5	27,4
				od insekata. Srednja ugroženost od fitopatoloških oboljenja-oboljenja																			
				lista. srednje negovana sastojina. Stabla graba su zakrivljena i sa																			
				velikim padom precnika (mala punodrvnost), sa srednje dugim krošnjama																			
				(dužine izmedu 1/3 i 1/2 visine stabala) i ekscentricnim krošnjama, do																			
				10% oštecenih stabala od insekata i fitopatoloških obolenja, suvih i																			
				suhovrhih stabala ima do 10%, zdravstveno stanje stabala ove vrste																			
				drveca je osrednje. Stabla srebrna lipa su zakrivljena i sa velikim padom																			
				precnika (mala punodrvnost), sa srednje dugim krošnjama (dužine izmedu																			
				1/3 i 1/2 visine stabala) i ekscentricnim krošnjama, do 10% oštecenih																			
				stabala od insekata i fitopatoloških obolenja, suvih i suhovrhih stabala																			

ОПИС СТАНИШТА И САСТОЈИНА

Ozn.mesta		gazdi-	površ-	OPIS	Osnovni taksacioni elementi						visi	deb.	Broj stabala po hektaru							G	Zapremina po		
ode-	od-	nska	ina		vrsta	sme	obr	sta-	sred.stablo		nski			Vrsta drveta						po		Vrsta drv	
ljenje	sek	klasa	ha		drveća	sa	ast	rost	Ds	Hs	step.	st.	1	2	3	4	5	6	svg.	ha	1	2	3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
				ima do 10%, zdravstveno stanje stabala ove vrste drveca je osrednje.																			
				Stabla kitnjaka su zakrivljena i sa srednjim padom precnika (srednja																			
				punodrvnost), sa srednje dugim krošnjama (dužine izmedu 1/3 i 1/2 visine																			
				stabala) i normalno razvijenim krošnjama, do 10% oštecenih stabala od																			
				insekata i fitopatoloških obolenja, suvih i suhovrhih stabala ima do 10%,																			
46	d	60307482	1,23	zdravstveno stanje stabala ove vrste drveca je osrednje.																			

Ozn.mesta		gazdi-	površ-	OPIS	Osnovni taksacioni elementi						visi	deb.	Broj stabala po hektaru							G	Zapremina po		
ode-	od-	nska	ina		vrsta	sme	obr	sta-	sred.stablo		nski			Vrsta drveta						po		Vrsta drv	
ljenje	sek	klasa	ha		drveća	sa	ast	rost	Ds	Hs	step.	st.	1	2	3	4	5	6	svg.	ha	1	2	3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
				Šuma - nalazi se na platou i na blago nagnutom terenu (nagiba do 5°) -	1. SrLip	0,5		99	25	13,3	10	7,5	70		6	166	15	54	311	1,4	1,5		0,2
				nagib ujednacen. Nadmorska visina 365 do 375m. Ekspozicija 1 bez jasno	2. Kit	0,4			33	19,0	11	12,5	23			19	7	24	73	0,9	1,7		
				izražene ekspozicije. Mrtvi pokrivac srednje zastupljen - povoljan proces	3. OTL				20	13,1	11	17,5	2	2	8	6	10	11	39	0,9	0,3	0,4	1,2
				humifikacije. Retka prizemna vegetacija. Srednje gusto žbunje. Slaba	4. Klen				9	6,0	11	22,5	19	8	4	6	8		44	1,8	5,3	2,2	1,4
				zakorovljenost. tip šume kitnjaka i cera (Quercetum petraeae-cerris	5. Cjas				14	9,4	11	27,5	10	22		6			38	2,2	4,7	13,8	
				typicum) na lesiviranim gajnjacama i beskarbonatnom deluvijumu..	6. Bag				10	6,7	17	32,5	21	25					46	3,8	14,2	19,9	
												37,5	20	35					55	6,1	19,6	41,1	
				Izdanacka mešovita šuma lipa (izdanacka šuma lipa i kitnjaka) -								42,5	23	10					33	4,7	31,2	15,5	
				jednodobna (u fazi razgradnje). Razredjena sastojina. Mešovita sastojina								47,5	22						22	3,9	36,4		
				(smeša stablimicna) nepotpunog sklopa (0.5-0.6). u celini zdravstveno								52,5	2		2				4	0,9	4,4		5,0
				stanje sastojine je osrednje. po kvalitetu malo vredna sastojina (ima do								57,5	8						8	2,0	18,2		
				20% tehnickog drveta). Srednja ugroženost od insekata. Srednja ugroženost								UKUP.	219	103	20	202	40	90	673	28,7	137,5	92,9	7,7
				od fitopatoloških oboljenja-oboljenja lista. nenegovana sastojina.																			
				Stabla srebrna lipa su zakrivljena i sa velikim padom precnika (mala																			
				punodrvnost), sa dugim krošnjama (dužine izmedu 1/2 i 2/3 visine stabala)																			
				i ekscentricnim krošnjama, do 10% oštecenih stabala od insekata i																			
				fitopatoloških obolenja, suvih i suhovrhih stabala ima do 10%,																			
				zdravstveno stanje stabala ove vrste drveca je osrednje. Stabla kitnjaka																			
				su zakrivljena i sa srednjim padom precnika (srednja punodrvnost), sa																			
				srednje dugim krošnjama (dužine izmedu 1/3 i 1/2 visine stabala) i																			
				normalno razvijenim krošnjama, do 10% oštecenih stabala od insekata i																			
				fitopatoloških obolenja, suvih i suhovrhih stabala ima do 10%,																			
46	e	59288463	4,55	zdravstveno stanje stabala ove vrste drveca je osrednje.																			
				Šuma - nalazi se na strani i na srednje strmom terenu (nagiba od 6° do	1. SrLip	0,7		99	24	17,6	8	7,5	146		5	2	8		162	0,7	2,7		0,1
				10°) - nagib konveksan (ispupcen). Nadmorska visina 320 do 390m.	2. Kit	0,3			35	18,1	12	12,5	49				5		54	0,7	4,3		
				Ekspozicija 1 severna. Mrtvi pokrivac srednje zastupljen - povoljan	3. Slip				24	13,4	10	17,5	8		6	5		5	24	0,6	1,0		0,9
				proces humifikacije. Retka prizemna vegetacija. Retko žbunje. Nema	4. Bk				22	12,7	15	22,5	46	6	2		2	2	57	2,3	14,8	1,4	0,6
				zakorovljenosti. tip šume kitnjaka (Quercetum montanum cariecetosum	5. OTL				11	6,3	12	27,5	63	17					80	4,8	31,7	9,1	
				pilosae) na gajnjaci do lesiviranoj gajnjaci..	6. Gr				19	11,0	12	32,5	36	26	5	6			73	6,1	27,3	21,5	3,7
												37,5	74	21	5				101	11,2	78,4	20,9	5,2
				Izdanacka mešovita šuma lipa (izdanacka šuma lipa i kitnjaka) -								42,5	42	15					57	8,1	58,6	22,1	
				jednodobna (u fazi razgradnje). Ocuvana sastojina. Mešovita sastojina								47,5	18	11					29	5,2	31,5	20,9	
				(smeša stablimicna) potpunog sklopa (0.7). u celini zdravstveno stanje								52,5	9						9	1,8	19,0		
				sastojine je osrednje. po kvalitetu malo vredna sastojina (ima do 20%								UKUP.	491	96	24	13	15	8	646	41,3	269,4	96,0	10,6
				tehnickog drveta). Srednja ugroženost od insekata. Srednja ugroženost od																			
				fitopatoloških oboljenja-oboljenja lista. srednje negovana sastojina.																			
				Stabla srebrna lipa su zakrivljena i sa srednjim padom precnika (srednja																			
				punodrvnost), sa srednje dugim krošnjama (dužine izmedu 1/3 i 1/2 visine																			
				stabala) i ekscentricnim krošnjama, do 10% oštecenih stabala od insekata																			
				i fitopatoloških obolenja, suvih i suhovrhih stabala ima do 10%,																			
				zdravstveno stanje stabala ove vrste drveca je dobro. Stabla kitnjaka su																			
				zakrivljena i sa srednjim padom precnika (srednja punodrvnost), sa																			
				srednje dugim krošnjama (dužine izmedu 1/3 i 1/2 visine stabala) i																			
				normalno razvijenim krošnjama, do 10% oštecenih stabala od insekata i																			
				fitopatoloških obolenja, suvih i suhovrhih stabala ima do 10%,																			
46	f	59288484	6,89	zdravstveno stanje stabala ove vrste drveca je osrednje.																			

Ozn.mesta		gazdi-	površ-	OPIS	Osnovni taksacioni elementi						visi	deb.	Broj stabala po hektaru							G	Zapremina po		
ode-	od-	nska	ina		vrsta	sme	obr	sta-	sred.stablo		nski			Vrsta drveta						po		Vrsta drv	
ljenje	sek	klasa	ha		drveća	sa	ast	rost	Ds	Hs	step.	st.	1	2	3	4	5	6	svg.	ha	1	2	3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
				Šuma - nalazi se na strani i na strmom terenu (nagiba od 11° do 15°) -	1. SrLip	0,4		90	26	16,9	8	7,5	21		66		2	7	96	0,4	0,4		1,5
				nagib konveksan (ispupcen). Nadmorska visina 270 do 370m. Ekspozicija 1	2. Kit	0,4			35	18,3	12	12,5	20		16	10	13	10	69	0,8	1,6		1,1
				severna. Mrtvi pokrivac srednje zastupljen - povoljan proces	3. Bk	0,1			17	13,2	14	17,5	25		11		4	6	47	1,1	4,5		1,8
				humifikacije. Retka prizemna vegetacija. Srednje gusto žbunje. Slaba	4. OTL	0,1			28	17,2	11	22,5	36		11		4		51	2,0	11,7		2,8
				zakorovljenost. tip šume bukve i kitnjaka (Querco-Fagetum typicum) na	5. Gr				15	12,2	11	27,5	34	31	9				74	4,4	19,3	15,2	5,3
				kiselom smedem i lesiviranom kiselom smedjem zemljištu..	6. Cjas				12	10,8	11	32,5	35	19	7				61	5,1	27,7	15,0	6,0
												37,5	28	49	5	2			84	9,3	29,3	53,0	5,7
				Izdanacka mešovita šuma kitnjaka (izdanacka šuma kitnjaka i lipe) -								42,5	10	10	2	7			28	4,0	13,0	14,8	3,2
				jednodobna (u fazi razgradnje). Ocuvana sastojina. Mešovita sastojina								47,5	2	7	7	2			19	3,3	3,4	13,9	13,1
				(smeša stablimicna) gustog sklopa (0.8 - 0.9). u celini zdravstveno								52,5	4						4	0,9	9,0		
				stanje sastojine je osrednje. po kvalitetu malo vredna sastojina (ima do								62,5	2						2	0,6	7,1		
				20% tehnickog drveta). Srednja ugroženost od insekata. Srednja ugroženost								UKUP.	217	115	135	21	23	23	535	32,0	127,0	112,0	40,4
				od vetra. srednje negovana sastojina. Stabla srebrna lipa su zakrivljena																			
				i sa srednjim padom precnika (srednja punodrvnost), sa srednje dugim																			
				krošnjama (dužine izmedu 1/3 i 1/2 visine stabala) i ekscentricnim																			
				krošnjama, do 10% oštecenih stabala od vetra, snega i leda, suvih i																			
				suhovrhih stabala ima do 10%, zdravstveno stanje stabala ove vrste																			
				drveca je dobro. Stabla kitnjaka su zakrivljena i sa srednjim padom																			
				precnika (srednja punodrvnost), sa srednje dugim krošnjama (dužine izmedu																			
				1/3 i 1/2 visine stabala) i normalno razvijenim krošnjama, do 10%																			
				oštecenih stabala od vetra, snega i leda, do 10% oštecenih stabala od																			
				insekata i fitopatoloških obolenja, suvih i suhovrhih stabala ima do 10%,																			
				zdravstveno stanje stabala ove vrste drveca je osrednje. Stabla bukve su																			
				zakrivljena i sa srednjim padom precnika (srednja punodrvnost), sa																			
				srednje dugim krošnjama (dužine izmedu 1/3 i 1/2 visine stabala) i																			
				normalno razvijenim krošnjama, do 10% oštecenih stabala od vetra, snega i																			
46	g	59307602	6,23	leda, suvih i suhovrhih stabala ima do 10%.																			
				Šuma - nalazi se na strani i na srednje strmom terenu (nagiba od 6° do	1. Cer	0,9		99	27	20,6	6	7,5			308	37	37	13	395	1,7			6,6
				10°) - nagib ujednacen. Nadmorska visina 365 do 395m. Ekspozicija 1	2. Kit	0,1			17	11,9	8	12,5		36					36	0,4		3,5	
				sever - severoistok. Mrtvi pokrivac slabo zastupljen - povoljan proces	3. Cjas				8	4,0	9	17,5	49	12					61	1,5	14,6	1,7	
				humifikacije. Retka prizemna vegetacija. Gusto žbunje. Slaba	4. PBr				8	4,0	8	22,5	74	25					98	3,9	37,3	8,0	
				zakorovljenost. tip šume bukve i kitnjaka (Querco-Fagetum typicum) na	5. Klen				8	4,0	9	27,5	49						49	2,9	36,9		
				kiselom smedem i lesiviranom kiselom smedjem zemljištu..	6. SrLip				8	4,0	6	32,5	111						111	9,2	110,4		
												37,5	25						25	2,7	36,5		
				Izdanacka mešovita šuma cera (izdanacka šuma cera i kitnjaka) -								UKUP.	307	74	308	37	37	13	776	22,4	235,7	13,2	6,6
				jednodobna (u fazi razgradnje). Ocuvana sastojina. Mešovita sastojina																			
				(smeša stablimicna) gustog sklopa (0.8 - 0.9). u celini zdravstveno																			
				stanje sastojine je osrednje. po kvalitetu malo vredna sastojina (ima do																			
				20% tehnickog drveta). Srednja ugroženost od insekata. Srednja ugroženost																			
				od fitopatoloških oboljenja-oboljenja lista. srednje negovana sastojina.																			
				Stabla cera su zakrivljena i mišorepasta, sa dugim krošnjama (dužine																			
				izmedu 1/2 i 2/3 visine stabala) i ekscentricnim krošnjama, do 10%																			
				oštecenih stabala od insekata i fitopatoloških obolenja, suvih i																			
				suhovrhih stabala ima do 10%, zdravstveno stanje stabala ove vrste																			
				drveca je nezadovoljavajuce. Stabla kitnjaka su zakrivljena i sa velikim																			
				padom precnika (mala punodrvnost), sa dugim krošnjama (dužine izmedu 1/2																			
				i 2/3 visine stabala) i ekscentricnim krošnjama, do 10% oštecenih stabala																			
				od insekata i fitopatoloških obolenja, suvih i suhovrhih stabala ima do																			

ОПИС СТАНИШТА И САСТОЈИНА

Ozn.mesta		gazdi-	površ-	OPIS	Osnovni taksacioni elementi						visi	deb.	Broj stabala po hektaru							G	Zapremina po		
ode-	od-	nska	ina		vrsta	sme	obr	sta-	sred.stablo		nski			Vrsta drveta						po		Vrsta drv	
ljenje	sek	klasa	ha		drveća	sa	ast	rost	Ds	Hs	step.	st.	1	2	3	4	5	6	svg.	ha	1	2	3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
46	h	59196602	1,97	10%, zdravstveno stanje stabala ove vrste drveca je osrednje.																			
				Šuma - nalazi se na strani i na srednje strmom terenu (nagiba od 6° do																			
				10°) - nagib ujednacen. Nadmorska visina 325 do 375m. Ekspozicija 1																			
				istok - severoistok. Mrtvi pokrivac slabo zastupljen - povoljan proces																			
				humifikacije. Gusta prizemna vegetacija. Gusto žbunje. Slaba																			
				zakorovljenost. tip šuma kitnjaka i graba sa lazarkinjom (Querco -																			
				Carpinetum asperulosum) na gajnjaci do lesiviranoj gajnjaci i lesiviranom																			
				smedem zemljištu na serpentinitu ..																			
46	i	60266261	3,16	Šikara.																			
				Vocnjak.																			
46	1	60	0,10																				
				Put.																			
46	2	60	0,08																				

ОПИС СТАНИШТА И САСТОЈИНА

Ozn.mesta		gazdi-	površ-	OPIS	Osnovni taksacioni elementi						visi	deb.	Broj stabala po hektaru							G	Zapremina po		
ode-	od-	nska	ina		vrsta	sme	obr	sta-	sred.stablo		nski			Vrsta drveta						po		Vrsta drv	
ljenje	sek	klasa	ha		drveća	sa	ast	rost	Ds	Hs	step.	st.	1	2	3	4	5	6	svg.	ha	1	2	3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
				Šuma - nalazi se na strani i na blago nagnutom terenu (nagiba do 5°) -	1. Bag			3															
				nagib ujednacen. Nadmorska visina 310 do 370m. Ekspozicija 1 severna.																			
				Mrtvi pokrivac slabo zastupljen - povoljan proces humifikacije. Retka																			
				prizemna vegetacija. Gusto žbunje. Nema zakorovljenosti. tip šuma																			
				kitnjaka i graba sa lazarkinjom (Querco - Carpinetum asperulosum) na																			
				gajnjaci do lesiviranoj gajnjaci i lesiviranom smedem zemljištu na																			
				serpentinitu ..																			
				Izdanacka mešovita šuma bagrema - jednodobna (u fazi izgradnje). Ocuvana																			
				sastojina. Mešovita sastojina (smeša stablimicna) vrlo gustog sklopa																			
				(1.0). u celini zdravstveno stanje sastojine je dobro. po kvalitetu																			
				sastojina bez vrednosti (bez ucešca tehnickog drveta). Srednja ugroženost																			
				od insekata. Srednja ugroženost od drugih štetnih uticaja. srednje																			
47	a	60326261	13,61	negovana sastojina.																			
				Šuma - nalazi se na strani i na blago nagnutom terenu (nagiba do 5°) -	1. Cer	0,6		76	40	20,2	10	7,5		696		67			763	3,4		13,8	
				nagib ujednacen. Nadmorska visina 385 do 395m. Ekspozicija 1 sever -	2. Cjas	0,2			9	9,2	12	12,5		282		33			315	3,9		17,5	
				severoistok. Mrtvi pokrivac slabo zastupljen - nepovoljan proces	3. Kit	0,1			28	18,2	11	17,5		33					33	0,8		4,7	
				humifikacije. Gusta prizemna vegetacija. Gusto žbunje. Nema	4. Klen				9	8,6	11	27,5			33				33	2,0			15,7
				zakorovljenosti. tip šume cera i krupnolisnog medunca na nagibima								32,5	33						33	2,8	28,2		
				(Quercetum cerris -virgilianae xerphyllum) na intervalu zemljišta od								37,5	17						17	1,8	21,7		
				pararendzina na lesu do rendzina i plicih smedih zemljišta na laporcima,								57,5	17						17	4,3	49,6		
				laporovitim krecnjacima i dolomitima..								UKUP.	67	1011	33	100			1211	18,9	99,5	36,1	15,7
				Izdanacka mešovita šuma cera - jednodobna (u optimalnoj fazi). Ocuvana																			
				sastojina. Mešovita sastojina (smeša stablimicna) gustog sklopa (0.8 -																			
				0.9). u celini zdravstveno stanje sastojine je osrednje. po kvalitetu																			
				malo vredna sastojina (ima do 20% tehnickog drveta). Srednja ugroženost																			
				od insekata. Srednja ugroženost od fitopatoloških oboljenja-oboljenja																			
				lista. srednje negovana sastojina. Stabla cera su zakrivljena i sa																			
				srednjim padom precnika (srednja punodrvnost), sa srednje dugim krošnjama																			
				(dužine izmedu 1/3 i 1/2 visine stabala) i ekscentricnim krošnjama, od																			
				11-25% oštecenih stabala od insekata i fitopatoloških obolenja, suvih i																			
				sihovrhih stabala ima od 11-25%, zdravstveno stanje stabala ove vrste																			
				drveca je osrednje. Stabla kitnjaka su zakrivljena i sa srednjim padom																			
				precnika (srednja punodrvnost), sa srednje dugim krošnjama (dužine izmedu																			
				1/3 i 1/2 visine stabala) i ekscentricnim krošnjama, od 11-25% oštecenih																			
				stabala od insekata i fitopatoloških obolenja, suvih i sihovrhih stabala																			
47	b	59196381	1,08	ima od 11-25%, zdravstveno stanje stabala ove vrste drveca je osrednje.																			
				Šuma - nalazi se na strani i na blago nagnutom terenu (nagiba do 5°) -	1. SrLip	0,3		101	25	17,0	9	7,5	20						20	0,1	0,7		
				nagib ujednacen. Nadmorska visina 360 do 390m. Ekspozicija 1 severna.	2. Kit	0,3			33	19,4	11	12,5	30						30	0,4	2,3		
				Mrtvi pokrivac slabo zastupljen - nepovoljan proces humifikacije. Gusta	3. Gr	0,3			29	19,8	9	17,5	10	10					20	0,5	1,4	2,2	
				prizemna vegetacija. Gusto žbunje. Nema zakorovljenosti. tip šume sera i	4. Cer	0,1			38	19,6	10	27,5	20	25	60				104	6,2	9,7	15,4	33,7
				krupnolisnog medunca na platoima (Quercetum cerris-virgilianae typicum)								32,5	10	10	25				45	3,7	7,2	6,7	22,0
				na intervalu zemljišta od dubokih pararendzina na lesu do plicih								37,5	10	20		10			40	4,4	10,7	21,0	
				lesiviranih gajnjaca..								42,5	10						10	1,4	14,2		
												52,5		10					10	2,1		22,7	
				Izdanacka mešovita šuma lipa - jednodobna (u fazi razgradnje). Ocuvana								57,5	10						10	2,6	25,3		
				sastojina. Mešovita sastojina (smeša stablimicna) potpunog sklopa (0.7).								UKUP.	119	74	84	10			287	21,3	71,6	68,0	55,7

ОПИС СТАНИШТА И САСТОЈИНА

Ozn.mesta		gazdi-	površ-	OPIS	Osnovni taksacioni elementi						visi	deb.	Broj stabala po hektaru							G	Zapremina po		
ode-	od-	nska	ina		vrsta	sme	obr	sta-	sred.stablo		nski			Vrsta drveta						po		Vrsta drv	
ljenje	sek	klasa	ha		drveća	sa	ast	rost	Ds	Hs	step.	st.	1	2	3	4	5	6	svg.	ha	1	2	3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
				u celini zdravstveno stanje sastojine je osrednje. po kvalitetu malo																			
				vredna sastojina (ima do 20% tehnickog drveta). Srednja ugroženost od																			
				insekata. Srednja ugroženost od fitopatoloških oboljenja-oboljenja lista.																			
				srednje negovana sastojina. Stabla graba su zakrivljena i sa velikim																			
				padom precnika (mala punodrvnost), sa srednje dugim krošnjama (dužine																			
				izmedu 1/3 i 1/2 visine stabala) i normalno razvijenim krošnjama,																			
				zdravstveno stanje stabala ove vrste drveca je dobro. Stabla cera su																			
				zakrivljena i sa velikim padom precnika (mala punodrvnost), sa srednje																			
				dugim krošnjama (dužine izmedu 1/3 i 1/2 visine stabala) i preširokim																			
				krošnjama, od 11-25% oštecenih stabala od insekata i fitopatoloških																			
				obolenja, suvih i sihovrhih stabala ima od 11-25%, zdravstveno stanje																			
				stabala ove vrste drveca je osrednje. Stabla kitnjaka su zakrivljena i sa																			
				velikim padom precnika (mala punodrvnost), sa srednje dugim krošnjama																			
				(dužine izmedu 1/3 i 1/2 visine stabala) i ekscentricnim krošnjama, od																			
				11-25% oštecenih stabala od insekata i fitopatoloških obolenja, suvih i																			
				sihovrhih stabala ima od 11-25%, zdravstveno stanje stabala ove vrste																			
47	c	59288383	0,62	drveca je osrednje.																			

ОПИС СТАНИШТА И САСТОЈИНА

Ozn.mesta		gazdi-	površ-	OPIS	Osnovni taksacioni elementi						visi	deb.	Broj stabala po hektaru							G	Zapremina po		
ode-	od-	nska	ina		vrsta	sme	obr	sta-	sred.stablo		nski			Vrsta drveta						po		Vrsta drv	
ljenje	sek	klasa	ha		drveća	sa	ast	rost	Ds	Hs	step.	st.	1	2	3	4	5	6	svg.	ha	1	2	3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
				Šuma - nalazi se na platou i na blago nagnutom terenu (nagiba do 5°) -	1. Bag	0,6		34	11	9,5	16	7,5	619	200		20	20	20	879	3,9	13,7	4,9	
				nagib ujednacen. Nadmorska visina 370 do 380m. Ekspozicija 1 bez jasno	2. Klen	0,4			13	10,3	13	12,5	459	140	20				619	7,6	35,6	9,0	1,0
				izražene ekspozicije. Mrtvi pokrivac slabo zastupljen - nepovoljan proces	3. Tre				13	10,2	16	17,5	120	60					180	4,3	20,4	8,4	
				humifikacije. Gusta prizemna vegetacija. Gusto žbunje. Nema	4. PBr				8	6,8	13	22,5	60	20					80	3,2	18,1	6,9	
				zakorovljenosti. tip šume sera i krupnolisnog medunca na platoima	5. Cjas				8	6,8	13	42,5		20					20	2,8		21,4	
				(Quercetum cerris-virgilianae typicum) na intervalu zemljišta od dubokih	6. Kit				8	6,8	13												
				pararendzina na lesu do plicih lesiviranih gajnjaca..								UKUP.	1258	439	20	20	20	20	1777	21,8	87,8	50,6	1,0
				Izdanacka šuma bagrema - jednodobna (u optimalnoj fazi). Ocuvana																			
				sastojina. Mešovita sastojina (smeša stablimicna) vrlo gustog sklopa																			
				(1.0). u celini zdravstveno stanje sastojine je dobro. po kvalitetu																			
				sastojina bez vrednosti (bez ucešca tehnickog drveta). Srednja ugroženost																			
				od insekata. srednje negovana sastojina. Stabla bagrema su zakrivljena i																			
				sa malim padom precnika (velika punodrvnost), sa kratkim krošnjama																			
				(dužine izmedu 1/4 i1/3 visine stabala) i uskim krošnjama, do 10%																			
				oštecenih stabala od insekata, suvih i suhovrhih stabala ima do 10%,																			
47	d	59325383	2,17	zdravstveno stanje stabala ove vrste drveca je dobro.																			
				Šuma - nalazi se na strani i na blago nagnutom terenu (nagiba do 5°) -	1. CB	1,0		46	19	16,5	5	12,5	228	20	10				258	3,2	14,7	1,7	0,6
				nagib ujednacen. Nadmorska visina 340 do 390m. Ekspozicija 1	2. Bag				13	13,4	14	17,5	248						248	6,0	46,9		
				jugoistocna. Mrtvi pokrivac obilno zastupljen (tanak sloj) - povoljan	3. Cjas				13	13,4	9	22,5	159						159	6,3	59,1		
				proces humifikacije. Retka prizemna vegetacija. Retko žbunje. Nema								27,5	129						129	7,7	70,0		
				zakorovljenosti. tip šume cera i krupnolisnog medunca na nagibima								32,5	40						40	3,3	33,5		
				(Quercetum cerris -virgilianae xerphyllum) na intervalu zemljišta od								UKUP.	803	20	10				832	26,4	224,1	1,7	0,6
				pararendzina na lesu do rendzina i plicih smedih zemljišta na laporcima,																			
				laporovitim krecnjacima i dolomitima..																			
				Veštacki podignuta sastojina crnog bora - jednodobna (srednjedobna)																			
				sastojina. Ocuvana sastojina. Cista sastojina (smeša stablimicna) vrlo																			
				gustog sklopa (1.0). u celini zdravstveno stanje sastojine je osrednje.																			
				po kvalitetu srednjevredna sastojina (ima od 21-40% tehnickog drveta).																			
				Srednja ugroženost od insekata. Srednja ugroženost od požara. srednje																			
				negovana sastojina. Stabla crni bor su prava i sa srednjim padom																			
				precnika (srednja punodrvnost), sa vrlo dugim krošnjama (dužine preko 2/3																			
				visine stabala) i ekscentricnim krošnjama, suvih i suhovrhih stabala ima																			
47	e	60475381	2,98	do 10%, zdravstveno stanje stabala ove vrste drveca je dobro.																			
				Šuma - nalazi se na strani i na blago nagnutom terenu (nagiba do 5°) -	1. Bag	0,8		23	10	9,2	15	7,5	1090	132		166	33		1421	6,3	24,0	2,3	
				nagib ujednacen. Nadmorska visina 340 do 370m. Ekspozicija 1 južna.	2. Klen	0,2			11	9,8	11	12,5	330	99					429	5,3	28,2	6,9	
				Mrtvi pokrivac srednje zastupljen - povoljan proces humifikacije. Srednje	3. Orah				18			17,5	165	33	33				231	5,6	29,1	6,6	
				gusta prizemna vegetacija. Gusto žbunje. Nema zakorovljenosti. tip šume	4. PBr				8	6,4	9												
				cera i krupnolisnog medunca na nagibima (Quercetum cerris -virgilianae	5. Tre				8	7,6	17												
				xerphyllum) na intervalu zemljišta od pararendzina na lesu do rendzina i								UKUP.	1585	264	33	166	33		2081	17,1	81,3	15,8	
				plicih smedih zemljišta na laporcima, laporovitim krecnjacima i																			
				dolomitima..																			
				Izdanacka mešovita šuma bagrema - jednodobna (u fazi izgradnje). Ocuvana																			
				sastojina. Mešovita sastojina (smeša stablimicna) gustog sklopa (0.8 -																			
				0.9). u celini zdravstveno stanje sastojine je dobro. po kvalitetu																			
				sastojina bez vrednosti (bez ucešca tehnickog drveta). Srednja ugroženost																			

ОПИС СТАНИШТА И САСТОЈИНА

Ozn.mesta		gazdi-	površ-	OPIS	Osnovni taksacioni elementi						visi	deb.	Broj stabala po hektaru							G	Zapremina po		
ode-	od-	nska	ina		vrsta	sme	obr	sta-	sred.stablo		nski			Vrsta drveta						po		Vrsta drv	
ljenje	sek	klasa	ha		drveća	sa	ast	rost	Ds	Hs	step.	st.	1	2	3	4	5	6	svg.	ha	1	2	3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
				od insekata. Srednja ugroženost od drugih štetnih uticaja. srednje																			
				negovana sastojina. Stabla bagrema su zakrivljena i sa srednjim padom																			
				precnika (srednja punodrvnost), sa kratkim krošnjama (dužine izmedu 1/4																			
				i1/3 visine stabala) i uskim krošnjama, zdravstveno stanje stabala ove																			
47	f	60326381	0,79	vrste drveca je dobro.																			

ОПИС СТАНИШТА И САСТОЈИНА

Ozn.mesta		gazdi-	površ-	OPIS	Osnovni taksacioni elementi						visi	deb.	Broj stabala po hektaru							G	Zapremina po		
ode-	od-	nska	ina		vrsta	sme	obr	sta-	sred.stablo		nski			Vrsta drveta						po		Vrsta drv	
ljenje	sek	klasa	ha		drveća	sa	ast	rost	Ds	Hs	step.	st.	1	2	3	4	5	6	svg.	ha	1	2	3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
				Šuma - nalazi se u uvali i na vrlo strmom terenu (nagiba od 21° do 25°)	1. Med	0,4		65	15	9,5	14	7,5	71			24			96	0,4	1,3		
				- nagib izlomljen. Nadmorska visina 310 do 335m. Ekspozicija 1 južna.	2. Cer	0,5			24	11,7	14	12,5	379		95				474	5,8	24,9		4,9
				Mrtvi pokrivac srednje zastupljen - povoljan proces humifikacije. Retka	3. SrLip	0,1			14	8,5	14	17,5	311	71	47				430	10,3	42,3	12,6	7,6
				prizemna vegetacija. Gusto žbunje. Nema zakorovljenosti. tip šume cera i	4. PBr				8	4,8	15	22,5	48	119					167	6,6	10,8	34,3	
				krupnolisnog medunca na nagibima (Quercetum cerris -virgilianae								27,5	24	95					119	7,0	9,7	40,3	
				xerphyllum) na intervalu zemljišta od pararendzina na lesu do rendzina i								32,5		24					24	2,0		18,9	
				plicih smedih zemljišta na laporcima, laporovitim krecnjacima i								UKUP.	834	309	142	24			1309	32,2	89,0	106,1	12,5
				dolomitima..																			
				Izdanacka mešovita šuma medunca i ostalih hrastova - jednodobna (u																			
				optimalnoj fazi). Ocuvana sastojina. Mešovita sastojina (smeša																			
				stablimicna) gustog sklopa (0.8 - 0.9). u celini zdravstveno stanje																			
				sastojine je osrednje. po kvalitetu malo vredna sastojina (ima do 20%																			
				tehnickog drveta). Srednja ugroženost od insekata. Srednja ugroženost od																			
				fitopatoloških oboljenja-oboljenja lista. srednje negovana sastojina.																			
				Stabla cera su zakrivljena i sa srednjim padom precnika (srednja																			
				punodrvnost), sa srednje dugim krošnjama (dužine izmedu 1/3 i 1/2 visine																			
				stabala) i ekscentricnim krošnjama, od 11-25% oštecenih stabala od																			
				insekata i fitopatoloških obolenja, suvih i sihovrhih stabala ima od																			
				11-25%, zdravstveno stanje stabala ove vrste drveca je osrednje. Stabla																			
				medunaca su zakrivljena i sa velikim padom precnika (mala punodrvnost),																			
				sa dugim krošnjama (dužine izmedu 1/2 i 2/3 visine stabala) i																			
				ekscentricnim krošnjama, od 26-40% oštecenih stabala od insekata i																			
				fitopatoloških obolenja, suvih i sihovrhih stabala ima od 11-25%,																			
47	g	60236381	0,23	zdravstveno stanje stabala ove vrste drveca je osrednje.																			
				Šuma - nalazi se na strani i na srednje strmom terenu (nagiba od 6° do	1. CB	1,0		46	21	18,4	2	7,5	12						12	0,1	0,5		
				10°) - nagib ujednacen. Nadmorska visina 310 do 370m. Ekspozicija 1								12,5	133						133	1,6	10,7		
				južna. Mrtvi pokrivac obilno zastupljen (tanak sloj) - povoljan proces								17,5	243						243	5,8	46,7		
				humifikacije. Retka prizemna vegetacija. Retko žbunje. Nema								22,5	218						218	8,7	80,9		
				zakorovljenosti. tip šume cera i krupnolisnog medunca na nagibima								27,5	182						182	10,8	110,9		
				(Quercetum cerris -virgilianae xerphyllum) na intervalu zemljišta od								32,5	12						12	1,0	9,6		
				pararendzina na lesu do rendzina i plicih smedih zemljišta na laporcima,								37,5	12						12	1,3	14,6		
				laporovitim krecnjacima i dolomitima..								UKUP.	811						811	29,3	273,9		
				Veštacki podignuta sastojina crnog bora - jednodobna (srednjedobna)																			
				sastojina. Ocuvana sastojina. Cista sastojina (smeša stablimicna) vrlo																			
				gustog sklopa (1.0). u celini zdravstveno stanje sastojine je osrednje.																			
				po kvalitetu srednjevredna sastojina (ima od 21-40% tehnickog drveta).																			
				Srednja ugroženost od insekata. Srednja ugroženost od požara. srednje																			
				negovana sastojina. Stabla crni bor su prava i sa velikim padom precnika																			
				(mala punodrvnost), sa kratkim krošnjama (dužine izmedu 1/4 i1/3 visine																			
				stabala) i uskim krošnjama, do 10% oštecenih stabala od fitopatoloških																			
				obolenja, suvih i suhovrhih stabala ima do 10%, zdravstveno stanje																			
47	h	60475381	1,78	stabala ove vrste drveca je osrednje.																			
				Šuma - nalazi se na strani i na srednje strmom terenu (nagiba od 6° do	1. Bag	0,6		23	10	8,4	19	7,5	556	119	20		20		714	3,2	8,4	1,2	0,5
				10°) - nagib ujednacen. Nadmorska visina 305 do 370m. Ekspozicija 1	2. Klen	0,4			13	9,3	15	12,5	297	39	10				346	4,2	16,2	2,7	0,5
				južna. Mrtvi pokrivac srednje zastupljen - povoljan proces humifikacije.	3. PBr				11	8,7	15	17,5	79	19	10	10			118	2,8	9,2	2,1	1,1
				Srednje gusta prizemna vegetacija. Gusto žbunje. Nema zakorovljenosti.	4. Orah				18	10,3	14	22,5		39					39	1,5		9,6	

ОПИС СТАНИШТА И САСТОЈИНА

Ozn.mesta		gazdi-	površ-	OPIS	Osnovni taksacioni elementi						visi	deb.	Broj stabala po hektaru							G	Zapremina po		
ode-	od-	nska	ina		vrsta	sme	obr	sta-	sred.stablo		nski			Vrsta drveta						po		Vrsta drv	
ljenje	sek	klasa	ha		drveća	sa	ast	rost	Ds	Hs	step.	st.	1	2	3	4	5	6	svg.	ha	1	2	3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
				tip šume cera i krupnolisnog medunca na nagibima (Quercetum cerris	5. Corh				8	6,9	13	27,5	10	19					29	1,7	3,4	8,0	
				-virgilianae xerphyllum) na intervalu zemljišta od pararendzina na lesu								UKUP.	942	235	39	10	20		1245	13,5	37,1	23,7	2,1
				do rendzina i plicih smedih zemljišta na laporcima, laporovitim																			
				krecnjacima i dolomitima..																			
				Izdanacka mešovita šuma bagrema - jednodobna (u optimalnoj fazi). Ocuvana																			
				sastojina. Mešovita sastojina (smeša i grupimicna i stablimicna) gustog																			
				sklopa (0.8 - 0.9). u celini zdravstveno stanje sastojine je dobro. po																			
				kvalitetu sastojina bez vrednosti (bez ucešca tehnickog drveta). Srednja																			
				ugroženost od insekata. Srednja ugroženost od drugih štetnih uticaja.																			
				srednje negovana sastojina. Stabla bagrema su zakrivljena i sa velikim																			
				padom precnika (mala punodrvnost), sa kratkim krošnjama (dužine izmedu																			
				1/4 i1/3 visine stabala) i uskim krošnjama, zdravstveno stanje stabala																			
47	i	60326381	2,76	ove vrste drveca je dobro.																			

ОПИС СТАНИШТА И САСТОЈИНА

Ozn.mesta		gazdi-	površ-	OPIS	Osnovni taksacioni elementi						visi	deb.	Broj stabala po hektaru							G	Zapremina po		
ode-	od-	nska	ina		vrsta	sme	obr	sta-	sred.stablo		nski			Vrsta drveta						po		Vrsta drv	
ljenje	sek	klasa	ha		drveća	sa	ast	rost	Ds	Hs	step.	st.	1	2	3	4	5	6	svg.	ha	1	2	3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
				Šuma - nalazi se na strani i na blago nagnutom terenu (nagiba do 5°) -	1. CB	1,0		58	23	15,9	8	12,5	98						98	1,2	6,5		
				nagib ujednacen. Nadmorska visina 290 do 300m. Ekspozicija 1 severna.								17,5	148						148	3,6	25,9		
				Mrtvi pokrivac obilno zastupljen (tanak sloj) - povoljan proces								22,5	122						122	4,9	41,3		
				humifikacije. Retka prizemna vegetacija. Srednje gusto žbunje. Nema								27,5	296						296	17,6	165,6		
				zakorovljenosti. tip šume kitnjaka i graba sa klokocikom								32,5	74						74	6,1	57,1		
				(Querco-Carpinetum staphyletosum) na kiselom smedem do lesiviranom								UKUP.	738						738	33,3	296,3		
				kiselom smedjem zemljištu..																			
				Veštacki podignuta sastojina crnog bora - jednodobna (srednjedobna)																			
				sastojina. Ocuvana sastojina. Cista sastojina (smeša stablimicna) vrlo																			
				gustog sklopa (1.0). u celini zdravstveno stanje sastojine je osrednje.																			
				po kvalitetu srednjevredna sastojina (ima od 21-40% tehnickog drveta).																			
				Srednja ugroženost od insekata. Srednja ugroženost od požara. srednje																			
				negovana sastojina. Stabla crni bor su prava i sa velikim padom precnika																			
				(mala punodrvnost), sa dugim krošnjama (dužine izmedu 1/2 i 2/3 visine																			
				stabala) i uskim krošnjama, od 11-25% oštecenih stabala od fitopatoloških																			
				obolenja, suvih i sihovrhih stabala ima od 11-25%, zdravstveno stanje																			
47	j	60475263	0,57	stabala ove vrste drveca je osrednje.																			
				Šuma - nalazi se na strani i na srednje strmom terenu (nagiba od 6° do	1. Bag	0,4		25	10	9,7	15	7,5	509	444		121	30	30	1135	5,0	10,6	9,0	
				10°) - nagib ujednacen. Nadmorska visina 285 do 320m. Ekspozicija 1	2. Klen	0,3			10	9,0	11	12,5	477	160	30		30		697	8,5	36,8	14,1	1,8
				istocna. Mrtvi pokrivac slabo zastupljen - povoljan proces humifikacije.	3. Kit	0,2			23	16,8	11	17,5	32	65					97	2,3	5,5	10,4	
				Srednje gusta prizemna vegetacija. Srednje gusto žbunje. Nema	4. Cjas				8	7,9	12	32,5			30				30	2,5			25,9
				zakorovljenosti. tip šume kitnjaka i graba sa klokocikom	5. OTL				10	8,9	13												
				(Querco-Carpinetum staphyletosum) na kiselom smedem do lesiviranom	6. Cer				8	5,2	10												
				kiselom smedjem zemljištu..								UKUP.	1019	669	60	121	60	30	1959	18,4	52,8	33,6	27,6
				Izdanacka mešovita šuma bagrema - jednodobna (u fazi izgradnje). Ocuvana																			
				sastojina. Mešovita sastojina (smeša stablimicna) gustog sklopa (0.8 -																			
				0.9). u celini zdravstveno stanje sastojine je dobro. po kvalitetu																			
				sastojina bez vrednosti (bez ucešca tehnickog drveta). Srednja ugroženost																			
				od insekata. Srednja ugroženost od drugih štetnih uticaja. srednje																			
				negovana sastojina. Stabla bagrema su zakrivljena i sa velikim padom																			
				precnika (mala punodrvnost), sa kratkim krošnjama (dužine izmedu 1/4 i1/3																			
				visine stabala) i uskim krošnjama, zdravstveno stanje stabala ove vrste																			
47	k	60326263	1,42	drveca je dobro.																			
				Šuma - nalazi se na platou i na blago nagnutom terenu (nagiba do 5°) -	1. Bag	0,8		25	9	9,1	15	7,5	1092	165					1257	5,6	23,6	4,0	
				nagib ujednacen. Nadmorska visina 320 do 335m. Ekspozicija 1 sever -	2. Klen	0,2			10	9,6	11	12,5	628	33					661	8,1	51,5	1,7	
				severoistok. Mrtvi pokrivac slabo zastupljen - povoljan proces								17,5	33						33	0,8	4,8		
				humifikacije. Srednje gusta prizemna vegetacija. Srednje gusto žbunje.								22,5		33					33	1,3		9,4	
				Nema zakorovljenosti. tip šume kitnjaka i graba sa klokocikom								UKUP.	1753	231					1984	15,8	79,9	15,1	
				(Querco-Carpinetum staphyletosum) na kiselom smedem do lesiviranom																			
				kiselom smedjem zemljištu..																			
				Izdanacka mešovita šuma bagrema - jednodobna (u fazi izgradnje). Ocuvana																			
				sastojina. Mešovita sastojina (smeša stablimicna) potpunog sklopa (0.7).																			
				u celini zdravstveno stanje sastojine je dobro. po kvalitetu sastojina																			
				bez vrednosti (bez ucešca tehnickog drveta). Srednja ugroženost od																			
				insekata. Srednja ugroženost od drugih štetnih uticaja. srednje negovana																			

ОПИС СТАНИШТА И САСТОЈИНА

Ozn.mesta		gazdi-	površ-	OPIS	Osnovni taksacioni elementi						visi	deb.	Broj stabala po hektaru							G	Zapremina po		
ode-	od-	nska	ina		vrsta	sme	obr	sta-	sred.stablo		nski			Vrsta drveta						po		Vrsta drv	
ljenje	sek	klasa	ha		drveća	sa	ast	rost	Ds	Hs	step.	st.	1	2	3	4	5	6	svg.	ha	1	2	3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
				sastojina. Stabla bagrema su zakrivljena i sa velikim padom precnika																			
				(mala punodrvnost), sa kratkim krošnjama (dužine izmedu 1/4 i1/3 visine																			
				stabala) i uskim krošnjama, suvih i suhovrhih stabala ima do 10%,																			
47	l	60326263	1,22	zdravstveno stanje stabala ove vrste drveca je dobro.																			
				Šuma - nalazi se na strani i na srednje strmom terenu (nagiba od 6° do	1. Bag	0,9		25	10	9,8	15	7,5	983						983	4,3	21,0		
				10°) - nagib ujednacen. Nadmorska visina 325 do 340m. Ekspozicija 1	2. Cjas	0,1			18	13,3	12	12,5	519	33	33				585	7,2	41,6	2,9	1,7
				istocna. Mrtvi pokrivac slabo zastupljen - povoljan proces humifikacije.	3. Klen				13	11,0	11	17,5	226						226	5,4	42,9		
				Gusta prizemna vegetacija. Srednje gusto žbunje. Nema zakorovljenosti.								22,5		33					33	1,3		8,0	
				tip šume kitnjaka i graba sa klokocikom (Querco-Carpinetum staphyletosum)								UKUP.	1728	66	33				1828	18,3	105,5	10,9	1,7
				na kiselom smedem do lesiviranom kiselom smedjem zemljištu..																			
				Izdanacka šuma bagrema - jednodobna (u fazi izgradnje). Ocuvana																			
				sastojina. Cista sastojina (smeša stablimicna) potpunog sklopa (0.7). u																			
				celini zdravstveno stanje sastojine je dobro. po kvalitetu sastojina bez																			
				vrednosti (bez ucešca tehnickog drveta). Srednja ugroženost od insekata.																			
				Srednja ugroženost od drugih štetnih uticaja. srednje negovana sastojina.																			
				Stabla bagrema su zakrivljena i sa velikim padom precnika (mala																			
				punodrvnost), sa kratkim krošnjama (dužine izmedu 1/4 i1/3 visine																			
				stabala) i uskim krošnjama, suvih i suhovrhih stabala ima do 10%,																			
47	m	60325263	1,39	zdravstveno stanje stabala ove vrste drveca je dobro.																			

Ozn.mesta		gazdi-	površ-	OPIS	Osnovni taksacioni elementi						visi	deb.	Broj stabala po hektaru							G	Zapremina po		
ode-	od-	nska	ina		vrsta	sme	obr	sta-	sred.stablo		nski			Vrsta drveta						po		Vrsta drv	
ljenje	sek	klasa	ha		drveća	sa	ast	rost	Ds	Hs	step.	st.	1	2	3	4	5	6	svg.	ha	1	2	3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
				Šuma - nalazi se na platou i na blago nagnutom terenu (nagiba do 5°) -	1. Bag	1,0		25	11	10,5	15	7,5	946						946	4,2	20,7		
				nagib ujednacen. Nadmorska visina 335 do 340m. Ekspozicija 1 istocna.	2. Klen				13	11,0	11	12,5	548	50					598	7,3	45,5	3,8	
				Mrtvi pokrivac slabo zastupljen - povoljan proces humifikacije. Srednje								17,5	224						224	5,4	52,5		
				gusta prizemna vegetacija. Gusto žbunje. Nema zakorovljenosti. tip šume								22,5	75						75	3,0	30,5		
				cera i krupnolisnog medunca na nagibima (Quercetum cerris -virgilianae								27,5	25						25	1,5	13,6		
				xerphyllum) na intervalu zemljišta od pararendzina na lesu do rendzina i								UKUP.	1817	50					1867	21,3	162,8	3,8	
				plicih smedih zemljišta na laporcima, laporovitim krecnjacima i																			
				dolomitima..																			
				Izdanacka šuma bagrema - jednodobna (u fazi izgradnje). Ocuvana																			
				sastojina. Cista sastojina (smeša stablimicna) potpunog sklopa (0.7). u																			
				celini zdravstveno stanje sastojine je dobro. po kvalitetu sastojina bez																			
				vrednosti (bez ucešca tehnickog drveta). Srednja ugroženost od insekata.																			
				Srednja ugroženost od drugih štetnih uticaja. srednje negovana sastojina.																			
				Stabla bagrema su zakrivljena i sa velikim padom precnika (mala																			
				punodrvnost), sa kratkim krošnjama (dužine izmedu 1/4 i1/3 visine																			
				stabala) i uskim krošnjama, suvih i suhovrhih stabala ima do 10%,																			
47	n	60325381	0,32	zdravstveno stanje stabala ove vrste drveca je dobro.																			
				Šuma - nalazi se na strani i na srednje strmom terenu (nagiba od 6° do	1. Bag	0,7		25	9	8,2	15	7,5	1522						1522	6,7	33,6		
				10°) - nagib ujednacen. Nadmorska visina 325 do 340m. Ekspozicija 1	2. Klen	0,3			16	13,1	11	12,5	394	98					493	6,0	31,0	6,3	
				severna. Mrtvi pokrivac srednje zastupljen - povoljan proces								17,5		49					49	1,2		8,5	
				humifikacije. Retka prizemna vegetacija. Srednje gusto žbunje. Nema								22,5		49					49	1,9		15,6	
				zakorovljenosti. tip šume cera i krupnolisnog medunca na nagibima								UKUP.	1917	196					2113	15,9	64,6	30,3	
				(Quercetum cerris -virgilianae xerphyllum) na intervalu zemljišta od																			
				pararendzina na lesu do rendzina i plicih smedih zemljišta na laporcima,																			
				laporovitim krecnjacima i dolomitima..																			
				Izdanacka mešovita šuma bagrema - jednodobna (u fazi izgradnje). Ocuvana																			
				sastojina. Mešovita sastojina (smeša stablimicna) potpunog sklopa (0.7).																			
				u celini zdravstveno stanje sastojine je dobro. po kvalitetu sastojina																			
				bez vrednosti (bez ucešca tehnickog drveta). Srednja ugroženost od																			
				insekata. Srednja ugroženost od drugih štetnih uticaja. srednje negovana																			
				sastojina. Stabla bagrema su zakrivljena i sa velikim padom precnika																			
				(mala punodrvnost), sa kratkim krošnjama (dužine izmedu 1/4 i1/3 visine																			
				stabala) i uskim krošnjama, suvih i suhovrhih stabala ima do 10%,																			
47	o	60326381	0,61	zdravstveno stanje stabala ove vrste drveca je dobro.																			
				Šuma - nalazi se na strani i na vrlo strmom terenu(nagiba od 16° do	1. Klen	0,3		25	11	9,8	11	7,5	395	493			50		938	4,1	8,7	10,0	
				20°) - nagib ujednacen. Nadmorska visina 250 do 300m. Ekspozicija 1	2. Bag	0,4			10	9,7	15	12,5	198	197			50		444	5,4	16,4	13,4	
				istok - severoistok. Mrtvi pokrivac srednje zastupljen - povoljan proces	3. CB	0,2			28	17,1	14	17,5	49						49	1,2	8,5		
				humifikacije. Srednje gusta prizemna vegetacija. Retko žbunje. Nema	4. Tre	0,1			23	14,0	17	22,5	50			50			99	3,9	14,1		
				zakorovljenosti. tip šume cera i krupnolisnog medunca na nagibima	5. SrLip				10	9,3	9	27,5		50	50				99	5,9		29,9	21,6
				(Quercetum cerris -virgilianae xerphyllum) na intervalu zemljišta od								UKUP.	691	740	50	50	99		1629	20,6	47,7	53,3	21,6
				pararendzina na lesu do rendzina i plicih smedih zemljišta na laporcima,																			
				laporovitim krecnjacima i dolomitima..																			
				Izdanacka mešovita šuma bagrema - jednodobna (u fazi izgradnje). Ocuvana																			
				sastojina. Mešovita sastojina (smeša stablimicna) potpunog sklopa (0.7).																			
				u celini zdravstveno stanje sastojine je dobro. po kvalitetu sastojina																			

ОПИС СТАНИШТА И САСТОЈИНА

Ozn.mesta		gazdi-	površ-	OPIS	Osnovni taksacioni elementi						visi	deb.	Broj stabala po hektaru							G	Zapremina po		
ode-	od-	nska	ina		vrsta	sme	obr	sta-	sred.stablo		nski			Vrsta drveta						po		Vrsta drv	
ljenje	sek	klasa	ha		drveća	sa	ast	rost	Ds	Hs	step.	st.	1	2	3	4	5	6	svg.	ha	1	2	3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
				bez vrednosti (bez ucešca tehnickog drveta). Srednja ugroženost od																			
				insekata. Srednja ugroženost od drugih štetnih uticaja. srednje negovana																			
				sastojina. Stabla bagrema su zakrivljena i sa velikim padom precnika																			
				(mala punodrvnost), sa kratkim krošnjama (dužine izmedu 1/4 i1/3 visine																			
				stabala) i uskim krošnjama, suvih i suhovrhih stabala ima do 10%,																			
47	p	60326381	0,24	zdravstveno stanje stabala ove vrste drveca je dobro.																			
				Šuma - nalazi se na strani i na srednje strmom terenu (nagiba od 6° do	1. CB	1,0		43	16	16,3	1	12,5	413	25					438	5,4	36,3	1,9	
				10°) - nagib ujednacen. Nadmorska visina 315 do 325m. Ekspozicija 1	2. Tre				13	14,0	4	17,5	338						338	8,1	64,9		
				istocna. Mrtvi pokrivac srednje zastupljen - povoljan proces								22,5	120						120	4,8	43,2		
				humifikacije. Srednje gusta prizemna vegetacija. Srednje gusto žbunje.								27,5	47						47	2,8	29,0		
				Nema zakorovljenosti. tip šume kitnjaka (Quercetum montanum typicum) na								UKUP.	918	25					943	21,1	173,4	1,9	
				kiselom smedem i lesiviranom kiselom smedjem zemljištu..																			
				Veštacki podignuta sastojina crnog bora - jednodobna (srednjedobna)																			
				sastojina. Ocuvana sastojina. Cista sastojina (smeša stablimicna) vrlo																			
				gustog sklopa (1.0). u celini zdravstveno stanje sastojine je osrednje.																			
				po kvalitetu srednjevredna sastojina (ima od 21-40% tehnickog drveta).																			
				Srednja ugroženost od insekata. Srednja ugroženost od požara. srednje																			
				negovana sastojina. Stabla crni bor su prava i sa velikim padom precnika																			
				(mala punodrvnost), sa dugim krošnjama (dužine izmedu 1/2 i 2/3 visine																			
				stabala) i uskim krošnjama, do 10% oštecenih stabala od snega, do 10%																			
				oštecenih stabala od požara, suvih i suhovrhih stabala ima do 10%,																			
47	q	60475482	0,41	zdravstveno stanje stabala ove vrste drveca je osrednje.																			

ОПИС СТАНИШТА И САСТОЈИНА

Ozn.mesta		gazdi-	površ-	OPIS	Osnovni taksacioni elementi						visi	deb.	Broj stabala po hektaru							G	Zapremina po		
ode-	od-	nska	ina		vrsta	sme	obr	sta-	sred.stablo		nski			Vrsta drveta						po		Vrsta drv	
ljenje	sek	klasa	ha		drveća	sa	ast	rost	Ds	Hs	step.	st.	1	2	3	4	5	6	svg.	ha	1	2	3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
				Šuma - nalazi se na strani i na vrlo strmom terenu(nagiba od 16° do	1. Kit	0,4		45	27	18,2	11	7,5		614		24	47	47	708	3,1		11,5	
				20°) - nagib ujednacen. Nadmorska visina 275 do 315m. Ekspozicija 1	2. Cjas	0,3			10	10,0	12	12,5		283		24	47		354	4,3		20,0	
				istok - severoistok. Mrtvi pokrivac srednje zastupljen - povoljan proces	3. Gr	0,1			23	16,5	9	17,5		94	24	24		47	189	4,5		12,4	5,2
				humifikacije. Srednje gusta prizemna vegetacija. Srednje gusto žbunje.	4. SrLip	0,1			11	10,2	9	22,5	47	47					95	3,8	11,7	11,3	
				Nema zakorovljenosti. tip šume kitnjaka (Quercetum montanum typicum) na	5. Klen				10	9,3	11	27,5	47		24				71	4,2	26,8		14,4
				kiselom smedem i lesiviranom kiselom smedjem zemljištu..	6. Bk				18	13,9	12	37,5	24						24	2,6	26,6		
												UKUP.	118	1039	47	94	94	47	1439	22,5	65,1	55,3	19,6
				Izdanacka mešovita šuma kitnjaka - jednodobna (u optimalnoj fazi).																			
				Ocuvana sastojina. Mešovita sastojina (smeša stablimicna) vrlo gustog																			
				sklopa (1.0). u celini zdravstveno stanje sastojine je dobro. po																			
				kvalitetu malo vredna sastojina (ima do 20% tehnickog drveta). Srednja																			
				ugroženost od insekata. Srednja ugroženost od drugih štetnih uticaja.																			
				srednje negovana sastojina. Stabla graba su zakrivljena i sa srednjim																			
				padom precnika (srednja punodrvnost), sa srednje dugim krošnjama (dužine																			
				izmedu 1/3 i 1/2 visine stabala) i preširokim krošnjama, zdravstveno																			
				stanje stabala ove vrste drveca je dobro. Stabla srebrna lipa su																			
				zakrivljena i sa srednjim padom precnika (srednja punodrvnost), sa																			
				srednje dugim krošnjama (dužine izmedu 1/3 i 1/2 visine stabala) i																			
				ekscentricnim krošnjama, zdravstveno stanje stabala ove vrste drveca je																			
47	r	60307482	0,51	dobro.																			
				Šuma - nalazi se na strani i na vrlo strmom terenu(nagiba od 16° do	1. CB	1,0		43	17	16,5	1	12,5	579						579	7,1	53,8		
				20°) - nagib ujednacen. Nadmorska visina 305 do 320m. Ekspozicija 1								17,5	502						502	12,1	96,8		
				istocna. Mrtvi pokrivac obilno zastupljen (tanak sloj) - nepovoljan								22,5	191						191	7,6	67,3		
				proces humifikacije. Srednje gusta prizemna vegetacija. Retko žbunje.								27,5	94						94	5,6	58,0		
				Slaba zakorovljenost. tip šume kitnjaka i graba sa klokocikom								UKUP.	1366						1366	32,3	276,0		
				(Querco-Carpinetum staphyletosum) na kiselom smedem do lesiviranom																			
				kiselom smedjem zemljištu..																			
				Veštacki podignuta sastojina crnog bora - jednodobna (srednjedobna)																			
				sastojina. Ocuvana sastojina. Cista sastojina (smeša stablimicna) gustog																			
				sklopa (0.8 - 0.9). u celini zdravstveno stanje sastojine je osrednje. po																			
				kvalitetu srednjevredna sastojina (ima od 21-40% tehnickog drveta).																			
				Srednja ugroženost od insekata. od požara. pogrešno negovana sastojina.																			
				0. Stabla crni bor su prava i sa velikim padom precnika (mala																			
				punodrvnost), sa dugim krošnjama (dužine izmedu 1/2 i 2/3 visine stabala)																			
				i uskim krošnjama, do 10% oštecenih stabala od snega, do 10% oštecenih																			
				stabala od požara, suvih i suhovrhih stabala ima do 10%, zdravstveno																			
47	s	60475263	0,46	stanje stabala ove vrste drveca je osrednje.																			
				Livada.																			
47	1	60	0,16																				
				Livada.																			
47	2	60	0,16																				
				Vocnjak.																			

ОПИС СТАНИШТА И САСТОЈИНА

Ozn.mesta		gazdi-	površ-	OPIS	Osnovni taksacioni elementi						visi	deb.	Broj stabala po hektaru							G	Zapremina po		
ode-	od-	nska	ina		vrsta	sme	obr	sta-	sred.stablo		nski			Vrsta drveta						po		Vrsta drv	
ljenje	sek	klasa	ha		drveća	sa	ast	rost	Ds	Hs	step.	st.	1	2	3	4	5	6	svg.	ha	1	2	3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
47	3	60	0,44																				
				Livada.																			
47	4	60	5,53																				
				Livada.																			
47	5	60	1,75																				
				Pašnjak.																			
47	6	60	1,01																				
				Livada.																			
47	7	60	0,28																				
				Livada.																			
47	8	60	0,52																				

ОПИС СТАНИШТА И САСТОЈИНА

Ozn.mesta		gazdi-	površ-	OPIS	Osnovni taksacioni elementi						visi	deb.	Broj stabala po hektaru							G	Zapremina po		
ode-	od-	nska	ina		vrsta	sme	obr	sta-	sred.stablo		nski			Vrsta drveta						po		Vrsta drv	
ljenje	sek	klasa	ha		drveća	sa	ast	rost	Ds	Hs	step.	st.	1	2	3	4	5	6	svg.	ha	1	2	3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
				Livada.																			
47	9	60	0,18																				
				Livada.																			
47	10	60	0,19																				
				Put.																			
47	11	60	0,15																				

ОПИС СТАНИШТА И САСТОЈИНА

hektaru eta				zaprem. na celoj povrsini	tekuci prirast na ha	tekuci prirast na cel pov.	Primedba
4	5	6	svega				
25	26	27	28	29	30	31	32
0,3		0,1	5,1	215	3,1	4,3	Osnovna namena:
1,1			1,6	60	1,0	1,4	nacionalni park
2,8			7,8	70	0,9	1,2	- II stepen
1,8			3,5	14	0,3	0,4	zaštite.
4,4	4,0		34,4	6	0,1	0,1	Sastojina za
			48,8	0			redovno
			15,2				gazdovanje.
			63,7				
			63,2				
			17,5				
10,3	4,0	0,1	260,7	365	5,3	7,5	
0,8		0,5	5,3	755	2,8	15,3	Osnovna namena:
		0,3	7,8	480	2,0	10,6	nacionalni park
2,5	1,5	0,7	13,3	119	0,5	2,5	- II stepen
3,1			22,9	155	0,8	4,5	zaštite.
			59,1	27	0,1	0,7	Sastojina za
	3,4		50,4	8		0,1	redovno
			29,0				gazdovanje.
			7,8				
22,2			22,2				
			68,0				
28,6	5,0	1,5	285,9	1544	6,2	33,7	
							Osnovna namena:
							nacionalni park
							- II stepen

ОПИС СТАНИШТА И САСТОЈИНА

hektaru eta				zaprem. na celoj povrsini	tekuci prirast na ha	 na cel pov.	Primedba
4	5	6	svega				
25	26	27	28	29	30	31	32
							zaštite.
							Sastojina za
							redovno
							gazdovanje.

hektaru eta				zaprem. na celoj povrsini	tekuci prirast na ha	tekuci prirast na cel pov.	Primedba
4	5	6	svega				
25	26	27	28	29	30	31	32
	0,2	2,3	3,7	116	2,2	2,0	Osnovna namena:
	2,1	1,8	5,5	95	2,1	1,8	nacionalni park
2,1	1,2		7,3	34	0,5	0,4	- II stepen
5,2			10,8	14	0,1	0,1	zaštite.
8,3			31,4	3	0,2	0,1	Sastojina za
			5,6	4	0,2	0,2	redovno
			27,8				gazdovanje.
			42,4				
			84,5				
			84,8				
15,6	3,5	4,0	303,7	264	5,3	4,6	
			6,4	165	2,8	1,9	Osnovna namena:
		0,8	15,7	69	2,6	1,7	nacionalni park
			28,8	27	0,8	0,6	- II stepen
			31,5	13	0,2	0,2	zaštite.
		5,5	11,7	8	0,2	0,1	Sastojina za
			15,4	4	0,1		redovno
			8,3				gazdovanje.
			49,9				
	11,9		11,9				
19,6			19,6				
			50,1				
			97,0				
			74,7				
19,6	11,9	6,4	421,0	286	6,6	4,5	
1,1	0,2	0,1	7,7	1337	3,3	26,9	Osnovna namena:
1,5			12,5	630	1,6	13,1	nacionalni park

ОПИС СТАНИШТА И САСТОЈИНА

hektaru				zaprem.	tekuci prirast		Primedba
eta				na celoj	na	na cel	
4	5	6	svega	povrsini	ha	pov.	
25	26	27	28	29	30	31	32
			19,5	144	0,4	3,2	- II stepen
2,3			24,7	108	0,3	2,1	zaštite.
			23,1	1			Sastojina za
			23,6	1			redovno
8,5			68,0				gazdovanje.
			52,7				
			15,1				
			18,8				
			8,2				
13,3	0,2	0,1	273,9	2222	5,6	45,4	

ОПИС СТАНИШТА И САСТОЈИНА

hektaru eta				zaprem. na celoj povrsini	tekuci prirast na ha	 na cel pov.	Primedba
4	5	6	svega				
25	26	27	28	29	30	31	32
			6,2	447	7,3	13,5	Osnovna namena:
			21,7	89	1,9	3,5	nacionalni park
2,7			36,4	5	0,1	0,1	- II stepen
			59,2	5	0,1	0,1	zaštite.
			65,1				Sastojina za
			45,2				redovno
			61,9				gazdovanje.
2,7			295,7	547	9,4	17,3	Uzg.pot.
							obnavljanje.
							Seca: cista seca
							obnova bagrema kotlicenjem.
2,2	2,4	0,8	25,1	40	2,6	2,1	Osnovna namena:
10,0	2,7		45,1	32	0,8	0,7	nacionalni park
	4,4		25,2	20	0,4	0,3	- III stepen
12,2			12,2	20	0,9	0,7	zaštite.
			16,7	8	0,4	0,3	Sastojina za
			22,8	1			redovno
24,4	9,5	0,8	147,1	121	5,2	4,2	gazdovanje.
1,0			28,9	81	3,8	4,8	Osnovna namena:
			30,9				nacionalni park
			5,6	2			- III stepen
				1			zaštite.
1,0			65,5	84	3,8	4,8	Sastojina za
							redovno
							gazdovanje.

ОПИС СТАНИШТА И САСТОЈИНА

hektaru eta				zaprem. na celoj	tekuci prirast na	 na cel	Primedba
4	5	6	svega	povrsini	ha	pov.	
25	26	27	28	29	30	31	32
	1,2	1,1	8,4	53	1,0	1,4	Osnovna namena:
12,5	2,8		24,8	40	1,5	1,9	nacionalni park
			24,1	30	0,5	0,7	- III stepen
			26,2	17	0,5	0,7	zaštite.
			27,3	5	0,2	0,2	Sastojina za
				2	0,1	0,1	redovno
12,5	4,0	1,1	110,8	146	3,8	5,0	gazdovanje.
							Osnovna namena:
							nacionalni park
							- II stepen
							zaštite.

ОПИС СТАНИШТА И САСТОЈИНА

hektaru				zaprem.	tekuci prirast		Primedba
eta			svega	na celoj	na	na cel	
4	5	6		povrsini	ha	pov.	
25	26	27	28	29	30	31	32
							Osnovna namena:
							nacionalni park
							- II stepen
							zaštite.
							Sastojina za
							redovno
							gazdovanje.
2,4	0,6	0,2	11,5	244	4,9	4,8	Osnovna namena:
1,3	1,8		6,1	44	1,3	1,3	nacionalni park
2,2			6,3	7	0,3	0,3	- II stepen
			17,4	6	0,2	0,2	zaštite.
			36,4	2			Sastojina za
			67,2	0			redovno
			67,7				gazdovanje.
			59,0				Uzg.pot.
			38,3				obnavljanje.
6,0	2,4	0,2	309,9	304	6,8	6,7	Seca: oplodna
							seca kratkog
							perioda za
							obnavljanje
							oplodna seca
							(oplodni sek)
							kratkog perioda
							za obnavljanje.
							Osnovna namena:
							nacionalni park
							- II stepen
							zaštite.
							Sastojina za
							redovno
							gazdovanje.

ОПИС СТАНИШТА И САСТОЈИНА

hektaru				zaprem.	tekuci prirast		
eta			svega	na celoj	na	na cel	Primedba
4	5	6		povrsini	ha	pov.	
25	26	27	28	29	30	31	32

ОПИС СТАНИШТА И САСТОЈИНА

hektaru				zaprem.	tekuci prirast		Primedba
eta				na celoj	na	na cel	
4	5	6	svega	povrsini	ha	pov.	
25	26	27	28	29	30	31	32
1,7	2,4		16,2	186	4,7	3,8	Osnovna namena:
1,9		1,3	12,8	24	0,9	0,8	nacionalni park
			16,9	19	0,4	0,4	- II stepen
			38,1	3	0,1	0,1	zaštite.
			46,7	2	0,1	0,1	Sastojina za
			51,8	1			redovno
			66,2				gazdovanje.
			42,6				
3,5	2,4	1,3	291,3	236	6,4	5,2	
0,9	1,2	0,5	8,1	117	3,4	2,3	Osnovna namena:
2,4		0,8	3,1	47	1,2	0,8	nacionalni park
			1,9	36	0,5	0,3	- II stepen
			9,2	8	0,4	0,3	zaštite.
			35,0	1			Sastojina za
8,8			83,7	1			redovno
			65,4				gazdovanje.
			18,0				
			30,9				
			52,8				
12,1	1,2	1,3	308,1	210	5,5	3,8	
0,7	1,7	0,6	9,7	567	3,2	13,2	Osnovna namena:
	3,1		15,0	483	2,9	11,8	nacionalni park

ОПИС СТАНИШТА И САСТОЈИНА

hektaru				zaprem.	tekuci prirast		Primedba
eta				na celoj	na	na cel	
4	5	6	svega	povrsini	ha	pov.	
25	26	27	28	29	30	31	32
3,2	2,2		26,4	39	0,4	1,5	- II stepen
3,3			36,0	30	0,2	0,7	zaštite.
			19,4	29	0,3	1,3	Sastojina za
			72,2	2		0,1	redovno
			43,7				gazdovanje.
			37,1				
			20,3				
7,2	7,0	0,6	279,8	1150	7,0	28,6	

ОПИС СТАНИШТА И САСТОЈИНА

hektaru				zaprem.	tekuci prirast		Primedba
eta			svega	na celoj	na	na cel	
4	5	6		povrsini	ha	pov.	
25	26	27	28	29	30	31	32
1,8	1,9	1,2	40,1	438	2,9	13,3	Osnovna namena:
3,0	1,7		18,9	33	0,2	1,1	nacionalni park
			10,1	24	0,2	0,8	- II stepen
			46,6	23	0,2	1,1	zaštite.
				17	0,2	0,8	Sastojina za
				6		0,1	redovno
4,8	3,6	1,2	115,6	540	3,7	17,2	gazdovanje.
							Uzg.pot.
							proreda. Seca:
							proredna seca
							selektivna proreda.
							Osnovna namena:
							nacionalni park
							- II stepen
							zaštite.
	2,2	0,2	9,0	512	3,1	9,4	Osnovna namena:
0,8		0,6	8,9	196	1,8	5,5	nacionalni park
			6,4	28	0,4	1,1	- II stepen
3,3			20,0	13	0,1	0,4	zaštite.
			2,3	7	0,1	0,2	Sastojina za
			96,6	2		0,1	redovno
			57,5				gazdovanje.
			13,0				
			8,5				
			28,2				
4,2	2,2	0,8	250,3	759	5,5	16,6	
			1,0	129	2,2	2,5	Osnovna namena:
			11,5	73	1,5	1,7	nacionalni park

hektaru				zaprem.	tekuci prirast		Primedba
eta				na celoj	na	na cel	
4	5	6	svega	povrsini	ha	pov.	
25	26	27	28	29	30	31	32
			23,9	2			- II stepen
			13,1				zaštite.
			29,0				Sastojina za
			42,3				redovno
			54,8				gazdovanje.
			175,7	204	3,7	4,3	Uzg.pot.
							obnavljanje.
							Seca: oplodna
							seca kratkog
							perioda za
							obnavljanje
							oplodna seca
							(završni sek)
							kratkog perioda
							za obnavljanje.

ОПИС СТАНИШТА И САСТОЈИНА

hektaru eta				zaprem. na celoj povrsini	tekuci prirast		Primedba
			svega		na ha	na cel pov.	
4	5	6	28	29	30	31	32
25	26	27					
1,5	1,4	0,8	29,5	261	2,0	7,2	Osnovna namena:
			21,7	34	0,3	1,1	nacionalni park
			9,7	19	0,2	0,9	- II stepen
			12,5	6		0,1	zaštite.
			17,5	5	0,1	0,2	Sastojina za
				3		0,2	redovno
1,5	1,4	0,8	90,9	328	2,7	9,7	gazdovanje.
0,1	0,3		5,5	2695	4,7	46,1	Osnovna namena:
0,8			8,0	764	2,0	19,7	nacionalni park
			5,0	32	0,1	1,2	- II stepen
0,3			8,2	13		0,2	zaštite.
			20,3	3		0,1	Sastojina za
			61,0	0			redovno
			73,3				gazdovanje.
			31,3				Uzg.pot.
			68,3				obnavljanje.
			53,1				Seca: oplodna
			3,9				seca kratkog
			19,5				perioda za
1,3	0,3		357,5	3507	6,9	67,3	obnavljanje
							oplodna seca
							(pripremni sek)
							kratkog perioda
							za obnavljanje.
							Osnovna namena:
							nacionalni park
							- II stepen
							zaštite.
							Sastojina za
							redovno
							gazdovanje.

ОПИС СТАНИШТА И САСТОЈИНА

hektaru				zaprem.	tekuci prirast		
eta				na celoj	na	na cel	Primedba
4	5	6	svega	povrsini	ha	pov.	
25	26	27	28	29	30	31	32
							Osnovna namena:
							nacionalni park
							- III stepen
							zaštite.
							Osnovna namena:
							nacionalni park
							- III stepen
							zaštite.
							Osnovna namena:
							nacionalni park
							- II stepen
							zaštite.

ОПИС СТАНИШТА И САСТОЈИНА

hektaru eta				zaprem. na celoj	tekuci prirast		Primedba
			svega	povrsini	na ha	na cel pov.	
4	5	6	28	29	30	31	32
25	26	27					
	2,9	0,3	8,2	120	3,6	2,6	Osnovna namena:
	1,9		7,5	39	1,2	0,9	nacionalni park
			9,7	12	0,4	0,3	- II stepen
6,4			32,2	13	0,3	0,2	zaštite.
			80,5	4	0,1	0,1	Sastojina za
12,0			74,5	0			redovno
			13,7				gazdovanje.
			31,4				
18,4	4,9	0,3	257,7	188	5,6	4,1	
0,1	0,7	0,5	5,1	1135	4,6	20,2	Osnovna namena:
0,2		0,4	3,9	260	1,1	4,8	nacionalni park
			8,4	142	0,6	2,7	- II stepen
0,7	1,4		20,8	85	0,4	1,7	zaštite.
			19,0	9	0,1	0,5	Sastojina za
3,0			30,9	4		0,1	redovno
			53,8				gazdovanje.
			46,4				Uzg.pot.
4,5			54,8				obnavljanje.
10,8			41,7				Seca: oplodna
			39,6				seca kratkog
			47,3				perioda za
19,3	2,1	0,9	371,7	1636	6,8	30,0	obnavljanje
							oplodna seca
							(pripremni sek)
							kratkog perioda
							za obnavljanje.

ОПИС СТАНИШТА И САСТОЈИНА

hektaru eta				zaprem. na celoj povrsini	tekuci prirast na ha	 na cel pov.	Primedba
4	5	6	svega				
25	26	27	28	29	30	31	32
1,2			9,2	372	5,5	7,9	Osnovna namena:
			18,2	36	0,4	0,5	nacionalni park
			56,7	4	0,1	0,1	- II stepen
			84,8	2	0,1	0,1	zaštite.
			74,8				Sastojina za
			43,8				redovno
1,2			287,5	414	6,0	8,6	gazdovanje.
							Osnovna namena:
							nacionalni park
							- III stepen
							zaštite.

hektaru eta				zaprem. na celoj povrsini	tekuci prirast		Primedba
			svega		na ha	na cel pov.	
4	5	6	28	29	30	31	32
							Osnovna namena:
							nacionalni park
							- II stepen
							zaštite.
0,9	1,1	0,8	8,0	1176	5,3	21,7	Osnovna namena:
3,2	1,7		7,9	186	1,2	4,8	nacionalni park
1,2			6,4	70	0,7	2,7	- II stepen
2,1			10,5	30	0,2	0,8	zaštite.
			17,5	12	0,1	0,2	Sastojina za
			79,2	3		0,1	redovno
			56,9				gazdovanje.
			65,7				Uzg.pot.
			53,6				obnavljanje.
			58,1				Seca: oplodna
7,5	2,8	0,8	363,8	1477	7,5	30,3	seca kratkog
							perioda za
							obnavljanje
							oplodna seca
							(oplodni sek)
							kratkog perioda
							za obnavljanje.
0,3	0,7	1,3	4,9	1882	3,9	28,5	Osnovna namena:
0,4	0,7	1,7	3,8	298	1,0	7,4	nacionalni park
1,7			3,2	414	1,3	9,3	- II stepen
1,6			2,9	70	0,2	1,3	zaštite.
			3,1	76	0,4	3,2	Sastojina za
5,6			24,1	22	0,1	0,7	redovno
			33,9				gazdovanje.
			62,6				Uzg.pot.
	9,1		67,8				obnavljanje.
			51,1				Seca: oplodna
			36,4				seca kratkog
			38,9				perioda za
			25,3				obnavljanje
			20,7				oplodna seca
9,6	10,4	3,0	378,8	2762	6,9	50,5	(pripremni sek)
							kratkog perioda
							za obnavljanje.
0,5	0,2		7,2	532	3,3	11,9	Osnovna namena:
0,2	0,2		2,7	496	2,3	8,3	nacionalni park

ОПИС СТАНИШТА И САСТОЈИНА

hektaru				zaprem.	tekuci prirast		Primedba
eta				na celoj	na	na cel	
4	5	6	svega	povrsini	ha	pov.	
25	26	27	28	29	30	31	32
			0,6	78	0,4	1,4	- II stepen
			11,1	3		0,1	zaštite.
			19,8	2		0,1	Sastojina za
			59,7				redovno
			37,3				gazdovanje.
			66,9				
			28,2				
			23,1				
			20,0				
			34,3				
0,7	0,4		310,9	1110	6,1	21,8	

ОПИС СТАНИШТА И САСТОЈИНА

hektaru eta				zaprem. na celoj povrsini	tekuci prirast na ha	tekuci prirast na cel pov.	Primedba
4	5	6	svega				
25	26	27	28	29	30	31	32
0,4	0,2	0,8	4,9	169	3,5	3,4	Osnovna namena:
	3,9		5,5	58	1,5	1,4	nacionalni park
			4,6	15	0,3	0,3	- II stepen
			30,6	11	0,3	0,3	zaštite.
10,8			140,1	4	0,1	0,1	Sastojina za
			57,8	1			redovno
			21,3				gazdovanje.
11,2	4,1	0,8	264,9	257	5,7	5,5	
							Osnovna namena:
							nacionalni park
							- II stepen
							zaštite.
0,5	0,2		8,6	195	2,8	3,7	Osnovna namena:
			6,4	116	2,2	3,0	nacionalni park
			7,4	2			- II stepen
			5,8	1			zaštite.
			34,4	0			Sastojina za
			39,0				redovno
			86,3				gazdovanje.
			43,9				
0,5	0,2		231,7	313	5,1	6,8	

ОПИС СТАНИШТА И САСТОЈИНА

hektaru				zaprem.	tekuci prirast		
eta			svega	na celoj	na	na cel	Primedba
4	5	6		povrsini	ha	pov.	
25	26	27	28	29	30	31	32
1,2	0,1	0,3	6,2	1094	3,3	18,6	Osnovna namena:
0,4	0,1		5,3	460	2,0	11,2	nacionalni park
	0,9		8,7	159	0,5	2,9	- II stepen
	0,6		4,6	54	0,4	2,3	zaštite.
2,6	1,2		12,1	16		0,2	Sastojina za
			20,0	2			redovno
			54,7				gazdovanje.
			78,3				
			64,1				
5,3			47,2				
			13,4				
9,5	2,8	0,3	314,7	1785	6,2	35,2	

hektaru				zaprem.	tekuci prirast		Primedba
eta				na celoj	na	na cel	
4	5	6	svega	povrsini	ha	pov.	
25	26	27	28	29	30	31	32
0,1	0,6	0,4	15,1	859	3,9	17,8	Osnovna namena:
	0,4	0,3	10,6	284	1,8	8,1	nacionalni park
	0,8		18,7	37	0,2	0,8	- II stepen
			9,8	79	0,4	1,9	zaštite.
			19,4	8	0,1	0,3	Sastojina za
4,5			35,9	3		0,1	redovno
12,6			74,3				gazdovanje.
			40,7				
			54,0				
17,3	1,8	0,7	278,5	1270	6,3	28,9	
1,6	2,5	0,4	10,1	202	1,8	4,2	Osnovna namena:
0,8	1,9		7,7	107	1,3	2,9	nacionalni park
0,6		0,5	4,5	86	0,6	1,3	- II stepen
4,1	1,0		22,3	26	0,3	0,6	zaštite.
4,1	3,8		39,9	21	0,2	0,4	Sastojina za
			38,6	2		0,1	redovno
			27,8				gazdovanje.
			40,1				
11,2	9,2	0,8	191,0	445	4,1	9,6	
0,3	0,6	0,7	3,1	238	2,1	4,5	Osnovna namena:
0,2			2,2	186	1,2	2,7	nacionalni park
			2,5	64	0,4	0,8	- II stepen

ОПИС СТАНИШТА И САСТОЈИНА

hektaru				zaprem.	tekuci prirast		Primedba
eta				na celoj	na	na cel	
4	5	6	svega	povrsini	ha	pov.	
25	26	27	28	29	30	31	32
	6,3		10,7	47	0,5	1,1	zaštite.
	5,8		13,6	27	0,4	0,9	Sastojina za
			18,8	1			redovno
5,1			25,7				gazdovanje.
			47,8				Uzg.pot.
			69,6				obnavljanje.
			8,3				Seca: oplodna
			26,3				seca kratkog
16,2			32,3				perioda za
21,7	12,7	0,7	261,1	564	4,6	10,0	obnavljanje
							oplodna seca
							(pripremni sek)
							kratkog perioda
							za obnavljanje.

ОПИС СТАНИШТА И САСТОЈИНА

hektaru eta				zaprem. na celoj povrsini	tekuci prirast na ha	tekuci prirast na cel pov.	Primedba
4	5	6	svega				
25	26	27	28	29	30	31	32
0,3	0,1	0,5	2,6	346	2,5	6,6	Osnovna namena:
1,4	0,2	0,9	4,4	141	0,9	2,5	nacionalni park
1,8			8,2	88	0,3	0,9	- II stepen
1,5	3,2		14,2	31	0,2	0,6	zaštite.
6,6	7,8		17,9	40	0,1	0,4	Sastojina za
	3,5	6,6	35,4	21	0,3	0,7	redovno
			40,5				gazdovanje.
			40,6				
			28,9				
			22,5				
			15,2				
			17,6				
11,6	14,8	8,0	248,2	668	4,4	11,7	
2,4	0,4	1,1	13,3	623	3,1	15,8	Osnovna namena:
1,8			16,6	459	2,0	10,2	nacionalni park
1,6			14,7	85	0,3	1,5	- II stepen
4,8	7,5		44,3	55	0,2	1,0	zaštite.
	2,5		24,8	53	0,4	1,8	Sastojina za
			49,0	6		0,2	redovno
			35,4				gazdovanje.
			32,7				
			17,9				
10,7	10,3	1,1	248,6	1281	5,9	30,5	
0,3	1,0	0,9	9,9	1067	3,2	18,6	Osnovna namena:
			9,5	664	2,9	16,8	nacionalni park
1,1			10,8	28	0,2	1,0	- II stepen

ОПИС СТАНИШТА И САСТОЈИНА

hektaru eta				zaprem. na celoj	tekuci prirast		Primedba
			svega	povrsini	na ha	na cel pov.	
4	5	6	28	29	30	31	32
			6,6	8	0,1	0,3	zaštite.
			18,1	6		0,2	Sastojina za
			62,5	6		0,3	redovno
			81,8				gazdovanje.
			46,2				Uzg.pot.
			31,0				obnavljanje.
			26,3				Seca: oplodna
1,4	1,0	0,9	302,8	1777	6,3	37,1	seca kratkog
							perioda za
							obnavljanje
							oplodna seca
							(oplodni sek)
							kratkog perioda
							za obnavljanje.
							Osnovna namena:
							nacionalni park
							- II stepen
							zaštite.

ОПИС СТАНИШТА И САСТОЈИНА

hektaru eta				zaprem. na celoj povrsini	tekuci prirast na ha	 na cel pov.	Primedba
4	5	6	svega				
25	26	27	28	29	30	31	32
1,2	0,2	0,6	4,6	180	2,3	4,2	Osnovna namena:
	4,6		6,0	185	2,2	4,0	nacionalni park
4,7	3,7	1,0	18,3	84	1,1	2,0	- II stepen
		4,0	40,3	22	0,3	0,5	zaštite.
6,1			37,3	16	0,3	0,5	Sastojina za
			42,6	10	0,1	0,1	redovno
			25,9				gazdovanje.
			58,8				
			35,0				
11,9	8,5	5,6	268,7	497	6,1	11,4	
0,1	0,1		2,9	757	2,7	13,4	Osnovna namena:
0,1		0,1	6,7	385	1,4	6,9	nacionalni park
			13,6	377	1,3	6,5	- II stepen
	1,5	1,6	30,6	40	0,2	1,0	zaštite.
			37,6	65	0,3	1,7	Sastojina za
1,8			42,0	8		0,2	redovno
2,1			77,8				gazdovanje.
			44,1				
3,8	11,4		46,2				
			24,7				
8,0	13,0	1,7	326,4	1632	6,0	29,8	

ОПИС СТАНИШТА И САСТОЈИНА

hektaru				zaprem.	tekuci prirast		Primedba
eta			svega	na celoj	na	na cel	
4	5	6		povrsini	ha	pov.	
25	26	27	28	29	30	31	32
2,8		0,4	5,5	102	2,7	2,0	Osnovna namena:
5,9	1,9		8,7	72	1,9	1,4	nacionalni park
14,7	3,4		18,1	48	1,5	1,1	- II stepen
9,9			33,4	31	0,9	0,7	zaštite.
7,4			26,5	4	0,2	0,1	Sastojina za
			35,9	0			redovno
			108,6				gazdovanje.
			28,1				
			30,5				
			43,8				
40,7	5,3	0,4	339,0	258	7,1	5,4	

ОПИС СТАНИШТА И САСТОЈИНА

hektaru eta				zaprem. na celoj povrsini	tekuci prirast na ha	tekuci prirast na cel pov.	Primedba
4	5	6	svega				
25	26	27	28	29	30	31	32
1,4	0,2	0,1	4,2	1062	3,1	18,9	Osnovna namena:
0,8		0,5	5,0	408	1,3	7,9	nacionalni park
0,7	0,5	0,9	12,8	191	0,6	3,4	- II stepen
		2,1	10,3	209	1,1	6,4	zaštite.
2,5			36,9	88	0,3	2,1	Sastojina za
			43,2	22	0,1	0,7	redovno
6,6			70,0				gazdovanje.
			56,4				
22,2			56,4				
	13,9		29,0				
34,3	14,5	3,6	324,1	1981	6,4	39,3	
			19,2	52	3,4	1,3	Osnovna namena:
			9,5	18	1,4	0,5	nacionalni park
			27,7	9	0,4	0,2	- II stepen
			50,1	12	0,7	0,3	zaštite.
32,0			131,8				Sastojina za
32,0			238,3	91	5,9	2,2	redovno
							gazdovanje.
0,5	1,1	0,7	10,1	2780	4,7	52,3	Osnovna namena:
0,6			6,5	561	1,5	16,5	nacionalni park
0,7			7,0	64	0,2	2,0	- II stepen
			10,5	21	0,1	1,1	zaštite.
			9,3	12		0,3	Sastojina za

ОПИС СТАНИШТА И САСТОЈИНА

hektaru				zaprem.	tekuci prirast		
eta				na celoj	na	na cel	Primedba
4	5	6	svega	povrsini	ha	pov.	
25	26	27	28	29	30	31	32
			62,9	8		0,3	redovno
			122,9				gazdovanje.
			70,2				
			11,3				
1,9	1,1	0,7	310,7	3445	6,5	72,4	

ОПИС СТАНИШТА И САСТОЈИНА

hektaru eta				zaprem. na celoj povrsini	tekuci prirast na ha	tekuci prirast na cel pov.	Primedba
4	5	6	svega				
25	26	27	28	29	30	31	32
0,6	0,6	0,3	7,3	304	2,7	6,0	Osnovna namena:
1,0			5,5	382	3,4	7,6	nacionalni park
			9,2	89	0,9	1,9	- II stepen
			20,3	4		0,1	zaštite.
			17,5	1		0,1	Sastojina za
			94,6	1			redovno
			81,5				gazdovanje.
			77,6				
			36,5				
1,6	0,6	0,3	350,1	781	7,0	15,6	
							Osnovna namena:
							nacionalni park
							- II stepen
							zaštite.
0,9	1,0	0,8	6,3	215	1,9	4,9	Osnovna namena:
1,9		0,5	3,3	244	1,9	4,9	nacionalni park
			2,8	296	1,6	4,0	- II stepen
	2,8		5,9	7	0,1	0,4	zaštite.
			9,9	10	0,1	0,3	Sastojina za
			46,2	3		0,1	redovno
			78,9				gazdovanje.
			52,6				
			60,5				
			37,4				
2,8	3,8	1,3	303,8	775	5,7	14,5	

ОПИС СТАНИШТА И САСТОЈИНА

hektaru eta				zaprem. na celoj povrsini	tekuci prirast na ha	 na cel pov.	Primedba
4	5	6	svega				
25	26	27	28	29	30	31	32

ОПИС СТАНИШТА И САСТОЈИНА

hektaru eta				zaprem. na celoj povrsini	tekuci prirast na ha	tekuci prirast na cel pov.	Primedba
4	5	6	svega				
25	26	27	28	29	30	31	32
	0,3	0,1	3,5	467	1,4	7,8	Osnovna namena:
		1,2	8,4	456	1,5	8,4	nacionalni park
		3,0	15,1	327	1,3	7,5	- II stepen
	1,0	1,1	20,6	212	0,6	3,2	zaštite.
			19,6	175	0,7	4,3	Sastojina za
5,8	7,0		50,3	45	0,2	1,4	redovno
	8,0	2,4	59,9				gazdovanje.
10,6			38,2				
10,8			41,2				
	14,4		20,1				
			7,7				
9,9			9,9				
37,1	30,7	7,8	294,4	1681	5,7	32,6	
1,4	1,4	0,5	7,0	2014	2,2	44,6	Osnovna namena:
1,0	1,5	0,1	5,0	3153	2,9	58,0	nacionalni park
0,2	1,0		5,2	1152	1,2	23,2	- II stepen
2,4	2,1		15,0	240	0,3	6,1	zaštite.
			18,1	119	0,2	4,5	Sastojina za
0,9			34,2	13		0,3	redovno
4,1			81,7				gazdovanje.
1,8			75,9				Uzg.pot.
			46,0				obnavljanje.
			23,7				Seca: oplodna
			20,7				seca kratkog
11,9	5,9	0,7	332,6	6692	6,8	136,8	perioda za
							obnavljanje
							oplodna seca
							(pripremni sek)
							kratkog perioda
							za obnavljanje.
	0,2	0,7	2,9	278	2,1	4,9	Osnovna namena:
		1,1	3,4	186	1,3	2,9	nacionalni park
			7,5	89	0,7	1,6	- II stepen

ОПИС СТАНИШТА И САСТОЈИНА

hektaru				zaprem.	tekuci prirast		Primedba
eta			svega	na celoj	na	na cel	
4	5	6		povrsini	ha	pov.	
25	26	27	28	29	30	31	32
			4,0	102	0,7	1,6	zaštite.
2,8	1,8		20,5	11	0,2	0,4	Sastojina za
	2,8		26,9	4	0,1	0,2	redovno
16,5			44,9				gazdovanje.
6,4			35,0				Uzg.pot.
18,7			82,4				obnavljanje.
			19,4				Seca: oplodna
			32,2				seca kratkog
			12,2				perioda za
44,3	4,8	1,8	291,2	670	5,0	11,6	obnavljanje
							oplodna seca
							(oplodni i
							završni sek)
							kratkog perioda
							za obnavljanje.
							Osnovna namena:
							nacionalni park
							- II stepen
							zaštite.

hektaru eta				zaprem. na celoj povrsini	tekuci prirast na ha	tekuci prirast na cel pov.	Primedba
4	5	6	svega				
25	26	27	28	29	30	31	32
0,3	0,9	0,5	3,6	633	1,9	10,9	Osnovna namena:
	0,5	0,4	2,7	640	2,1	11,8	nacionalni park
	0,3		5,9	237	0,6	3,7	- III stepen
	0,4		4,5	87	0,4	2,0	zaštite.
			16,5	12	0,1	0,5	Sastojina za
2,9			41,3	5		0,2	redovno
			37,0				gazdovanje.
4,5			29,5				Uzg.pot.
			34,2				obnavljanje.
7,5			58,4				Seca: oplodna
			20,8				seca kratkog
			14,9				perioda za
			15,3				obnavljanje
15,3	2,2	0,9	284,8	1615	5,1	29,0	oplodna seca
							(oplodni sek)
							kratkog perioda
							za obnavljanje.
1,5	1,8	0,4	10,4	1559	3,7	28,9	Osnovna namena:
0,4	0,2	0,4	8,4	523	1,7	13,7	nacionalni park
2,5	0,9	0,8	11,1	34	0,2	1,4	- III stepen
			10,1	34	0,2	1,6	zaštite.
			32,6	23	0,1	0,8	Sastojina za
			21,3	12		0,2	redovno
			19,2				gazdovanje.
			81,2				Uzg.pot.
			35,8				obnavljanje.
			48,1				Seca: oplodna
4,3	2,9	1,6	278,0	2185	5,9	46,6	seca kratkog
							perioda za
							obnavljanje
							oplodna seca
							(pripremni sek)
							kratkog perioda
							za obnavljanje.

ОПИС СТАНИШТА И САСТОЈИНА

hektaru				zaprem.	tekuci prirast		Primedba
eta			svega	na celoj	na	na cel	
4	5	6		povrsini	ha	pov.	
25	26	27	28	29	30	31	32
0,9	1,4	1,3	7,4	225	1,3	4,2	Osnovna namena:
0,5	0,5	1,9	7,3	207	1,5	5,0	nacionalni park
	1,1		8,5	103	0,8	2,7	- III stepen
	2,3		2,3	22	0,2	0,8	zaštite.
			7,9	17	0,1	0,3	Sastojina za
5,3			34,5	10	0,1	0,4	redovno
			26,8				gazdovanje.
			16,6				
			49,0				
			20,7				
6,7	5,3	3,2	181,1	583	4,2	13,4	

ОПИС СТАНИШТА И САСТОЈИНА

hektaru eta				zaprem. na celoj povrsini	tekuci prirast na ha	tekuci prirast na cel pov.	Primedba
4	5	6	svega				
25	26	27	28	29	30	31	32
							Osnovna namena:
							nacionalni park
							- III stepen
							zaštite.
							Osnovna namena:
							nacionalni park
							- II stepen
							zaštite.
2,9	1,4	0,6	6,2	214	2,3	3,0	Osnovna namena:
	0,4		1,6	71	1,0	1,3	nacionalni park
			2,1	120	1,1	1,4	- III stepen
			21,2	4	0,1	0,2	zaštite.
			63,7	2	0,1	0,1	Sastojina za
			86,2	1			redovno
			28,0				gazdovanje.
			62,6				
			49,3				
2,9	1,8	0,6	321,0	411	4,7	6,0	
0,7	0,3	0,2	2,4	779	1,7	10,5	Osnovna namena:
			0,5	640	1,5	9,7	nacionalni park
2,1		0,3	7,1	233	0,5	3,2	- III stepen
	1,4		12,2	103	0,4	2,7	zaštite.
2,1			36,2	10	0,1	0,4	Sastojina za
3,7			34,4	3		0,2	redovno
4,9			32,0				gazdovanje.
3,0			71,7				Uzg.pot.
			31,3				obnavljanje.
			18,9				Seca: oplodna
			20,2				seca kratkog
			6,9				perioda za
			8,5				obnavljanje
16,5	1,7	0,5	282,3	1767	4,3	26,6	oplodna seca
							(oplodni sek)
							kratkog perioda
							za obnavljanje.

ОПИС СТАНИШТА И САСТОЈИНА

hektaru				zaprem.	tekuci prirast		
eta			svega	na celoj	na	na cel	Primedba
4	5	6		povrsini	ha	pov.	
25	26	27	28	29	30	31	32

ОПИС СТАНИШТА И САСТОЈИНА

hektaru eta				zaprem. na celoj povrsini	tekuci prirast na ha	tekuci prirast na cel pov.	Primedba
4	5	6	svega				
25	26	27	28	29	30	31	32
2,1	4,9		8,3	104	2,2	2,3	Osnovna namena:
	4,8		11,2	86	1,0	1,0	nacionalni park
			16,3	33	0,4	0,4	- III stepen
5,2			14,0	15	0,5	0,6	zaštite.
7,7			24,5	10	0,4	0,4	Sastojina za
			58,2				redovno
			47,6				gazdovanje.
			63,9				
15,0	9,7		244,1	249	4,5	4,6	
3,8	2,0	1,4	10,4	1642	2,7	28,5	Osnovna namena:
2,8	0,9	0,8	6,8	730	1,2	12,5	nacionalni park
2,3	0,5		4,8	462	1,0	10,9	- III stepen
2,2		2,2	16,7	127	0,4	4,4	zaštite.
1,1			14,7	35	0,1	1,5	Sastojina za
			38,9	45	0,1	0,8	redovno
			48,3				gazdovanje.
			93,0				
			28,3				
			31,2				
12,2	3,4	4,3	293,1	3039	5,6	58,6	
	0,5		2,4	1448	3,4	25,9	Osnovna namena:
1,2	0,2	0,3	7,7	353	1,1	8,3	nacionalni park

ОПИС СТАНИШТА И САСТОЈИНА

hektaru				zaprem.	tekuci prirast		Primedba
eta				na celoj	na	na cel	
4	5	6	svega	povrsini	ha	pov.	
25	26	27	28	29	30	31	32
			8,9	40	0,1	1,0	- III stepen
			10,8	37	0,1	0,4	zaštite.
			12,7	5		0,2	Sastojina za
			41,0	2		0,1	redovno
			40,4				gazdovanje.
			47,5				Uzg.pot.
3,7			42,6				obnavljanje.
			16,1				Seca: oplodna
			21,1				seca kratkog
4,9	0,6	0,3	251,3	1885	4,8	35,9	perioda za
							obnavljanje
							oplodna seca
							(završni sek)
							kratkog perioda
							za obnavljanje.

hektaru eta				zaprem. na celoj povrsini	tekuci prirast na ha	tekuci prirast na cel pov.	Primedba
4	5	6	svega				
25	26	27	28	29	30	31	32
0,3	0,2		3,8	123	3,8	4,0	Osnovna namena:
0,9			7,6	18	0,7	0,7	nacionalni park
			6,2	14	0,3	0,3	- III stepen
			27,8	7	0,2	0,2	zaštite.
			69,2	0			Sastojina za
5,0			18,0				redovno
			8,4				gazdovanje.
			12,9				
6,2	0,2		154,0	162	5,0	5,3	
							Osnovna namena:
							nacionalni park
							- III stepen
							zaštite.
							Osnovna namena:
							nacionalni park
							- III stepen
							zaštite.
1,7	0,4		3,1	811	8,7	27,0	Osnovna namena:
	0,7		6,4	6	0,1	0,2	nacionalni park
			49,0	4		0,1	- III stepen
			45,0	5	0,1	0,2	zaštite.
			79,6	3		0,1	Sastojina za
			73,5				redovno
			11,7				gazdovanje.
1,7	1,0		268,2	829	8,9	27,6	Uzg.pot.
							proreda. Seca:
							proredna seca
							selektivna proreda.
	0,6	1,1	5,2	250	2,9	4,4	Osnovna namena:
		0,8	0,8	79	0,9	1,4	nacionalni park
			1,5	31	0,7	1,1	- III stepen
			6,5	16	0,2	0,2	zaštite.
	3,8		47,3	7	0,2	0,3	Sastojina za

hektaru				zaprem.	tekuci prirast		Primedba
eta				na celoj	na	na cel	
4	5	6	svega	povrsini	ha	pov.	
25	26	27	28	29	30	31	32
			38,8	3	0,1	0,1	redovno
			17,3				gazdovanje.
10,0			29,3				Uzg.pot.
			81,4				obnavljanje.
			18,7				Seca: oplodna
10,0	4,4	1,9	246,8	385	4,9	7,6	seca kratkog
							perioda za
							obnavljanje
							oplodna seca
							(oplodni sek)
							kratkog perioda
							za obnavljanje.

hektaru				zaprem.	tekuci prirast		Primedba
eta				na celoj	na	na cel	
4	5	6	svega	povrsini	ha	pov.	
25	26	27	28	29	30	31	32
0,7	1,1	1,4	6,6	678	1,8	13,7	Osnovna namena:
0,8	1,0	1,7	6,4	629	1,2	9,3	nacionalni park
3,7		0,8	8,4	296	1,0	8,1	- III stepen
4,8			14,8	132	0,5	4,3	zaštite.
			22,6	31	0,2	1,3	Sastojina za
	1,8		42,1	30	0,1	0,6	redovno
			35,0				gazdovanje.
7,0			62,6				
			14,4				
			6,6				
			11,2				
17,0	3,9	3,8	230,5	1796	4,8	37,2	
			0,7	310	3,4	5,7	Osnovna namena:
	0,5		2,0	83	1,0	1,7	nacionalni park
0,8			6,5	45	0,5	0,8	- III stepen
3,7			14,9	18	0,1	0,2	zaštite.
2,6			11,9	1			Sastojina za
4,0			64,1				redovno
			67,3				gazdovanje.
			52,8				Uzg.pot.
			25,5				obnavljanje.
			29,5				Seca: oplodna
11,1	0,5		275,3	457	5,1	8,4	seca kratkog
							perioda za
							obnavljanje
							oplodna seca
							(oplodni i
							završni sek)
							kratkog perioda
							za obnavljanje.

ОПИС СТАНИШТА И САСТОЈИНА

hektaru				zaprem.	tekuci prirast		
eta			svega	na celoj	na	na cel	Primedba
4	5	6		povrsini	ha	pov.	
25	26	27	28	29	30	31	32

ОПИС СТАНИШТА И САСТОЈИНА

hektaru eta				zaprem. na celoj	tekuci prirast		Primedba
			svega	povrsini	na ha	na cel pov.	
4	5	6	28	29	30	31	32
25	26	27					
0,1	0,9	0,3	5,3	341	2,1	6,0	Osnovna namena:
			3,0	131	0,8	2,3	nacionalni park
			11,2	201	1,6	4,7	- III stepen
			21,8	94	0,6	1,8	zaštite.
4,0			24,1	3	0,1	0,2	Sastojina za
3,4			22,0	1			redovno
			3,9				gazdovanje.
14,4			69,5				Uzg.pot.
			45,8				obnavljanje.
10,4			31,2				Seca: oplodna
			25,4				seca kratkog
32,2	0,9	0,3	263,2	771	5,1	15,1	perioda za
							obnavljanje
							oplodna seca
							(pripremni sek)
							kratkog perioda
							za obnavljanje.
	0,4	0,8	3,5	778	1,6	12,3	Osnovna namena:
	0,4	0,1	1,9	356	0,7	5,6	nacionalni park
		0,7	8,9	430	1,3	9,6	- III stepen
		0,6	17,4	325	0,6	4,7	zaštite.
			12,6	22	0,1	1,0	Sastojina za
7,0			32,8	17	0,1	0,7	redovno
2,8	2,2		32,3				gazdovanje.
9,7			27,6				Uzg.pot.
9,9			52,9				obnavljanje.
			11,3				Seca: oplodna
6,5			36,4				seca kratkog
6,8			15,5				perioda za
42,7	2,9	2,2	253,1	1929	4,5	34,0	obnavljanje
							oplodna seca
							(oplodni sek)
							kratkog perioda
							za obnavljanje.

ОПИС СТАНИШТА И САСТОЈИНА

hektaru				zaprem.	tekuci prirast		Primedba
eta			svega	na celoj	na	na cel	
4	5	6		povrsini	ha	pov.	
25	26	27	28	29	30	31	32
1,7	1,3	1,3	10,9	622	2,7	13,3	Osnovna namena:
	0,9	1,4	7,0	280	1,6	7,6	nacionalni park
3,1		2,7	16,8	45	0,2	1,1	- III stepen
			22,6	48	0,2	0,8	zaštite.
			36,1	45	0,4	1,9	Sastojina za
5,1			43,5	26	0,2	1,0	redovno
	7,1		42,2				gazdovanje.
			25,0				
			15,5				
9,9	9,2	5,4	219,5	1067	5,3	25,7	

ОПИС СТАНИШТА И САСТОЈИНА

hektaru eta				zaprem. na celoj povrsini	tekuci prirast		Primedba
			svega		na ha	na cel pov.	
4	5	6	28	29	30	31	32
							Osnovna namena:
							nacionalni park
							- II stepen
							zaštite.
3,0	1,0	0,5	5,0	182	2,0	2,7	Osnovna namena:
1,7	1,7	2,7	8,7	107	1,3	1,7	nacionalni park
0,7	1,1		4,2	34	0,6	0,8	- III stepen
6,1			6,1	34	0,6	0,8	zaštite.
10,0			15,8	5	0,2	0,3	Sastojina za
3,6			36,3	4	0,1	0,2	redovno
			20,2				gazdovanje.
			49,7				
			54,9				
			51,4				
			16,3				
25,0	3,7	3,2	268,7	365	4,8	6,5	
	0,2	0,4	4,4	2083	1,7	33,5	Osnovna namena:
		0,3	7,9	1283	1,5	28,2	nacionalni park
		0,3	10,8	1684	1,5	29,3	- III stepen
		0,4	26,0	415	0,3	6,4	zaštite.
			23,4	398	0,5	9,1	Sastojina za
3,0			37,4	27	0,1	1,1	redovno
1,6			36,7				gazdovanje.
5,4	1,9		63,5				Uzg.pot.
8,5			43,7				obnavljanje.
3,0	8,7		38,6				Seca: oplodna
	9,8		13,7				seca kratkog
21,5	20,7	1,4	306,0	5890	5,6	107,6	perioda za
							obnavljanje
							oplodna seca
							(pripremni sek)
							kratkog perioda
							za obnavljanje.

ОПИС СТАНИШТА И САСТОЈИНА

hektaru eta				zaprem. na celoj povrsini	tekuci prirast na ha	 na cel pov.	Primedba
4	5	6	svega				
25	26	27	28	29	30	31	32

hektaru				zaprem.	tekuci prirast		Primedba
eta			svega	na celoj	na	na cel	
4	5	6		povrsini	ha	pov.	
25	26	27	28	29	30	31	32
0,2	0,1	0,1	1,7	465	3,5	8,8	Osnovna namena:
0,5	0,6	0,1	5,0	147	1,2	3,1	nacionalni park
0,6	1,3		5,2	53	0,5	1,3	- III stepen
			5,3	12	0,2	0,4	zaštite.
3,5			26,7	5		0,1	Sastojina za
			43,0	1			redovno
			74,9				gazdovanje.
			65,4				Uzg.pot.
			39,6				obnavljanje.
			6,6				Seca: oplodna
4,9	2,0	0,2	273,3	683	5,5	13,8	seca kratkog
							perioda za
							obnavljanje
							oplodna seca
							(oplodni i
							završni sek)
							kratkog perioda
							za obnavljanje.
0,3	0,1	0,1	6,7	380	3,1	6,7	Osnovna namena:
	0,9	0,2	7,1	240	2,4	5,0	nacionalni park
0,7			6,4	91	0,9	2,0	- III stepen
			10,6	2		0,1	zaštite.
			22,6	2	0,1	0,1	Sastojina za
			39,7	1			redovno
			95,5				gazdovanje.
			61,0				
			50,1				
			26,4				
			8,3				
1,0	1,0	0,3	334,4	716	6,5	13,9	
0,2	1,8	0,4	5,1	462	3,6	8,2	Osnovna namena:
	1,9		10,2	170	1,7	3,9	nacionalni park
			6,4	47	0,4	0,8	- III stepen
			5,4	49	0,4	0,9	zaštite.

ОПИС СТАНИШТА И САСТОЈИНА

hektaru				zaprem.	tekuci prirast		Primedba
eta				na celoj	na	na cel	
4	5	6	svega	povrsini	ha	pov.	
25	26	27	28	29	30	31	32
			23,6	9	0,1	0,3	Sastojina za
			42,4	1			redovno
			77,6				gazdovanje.
			45,7				Uzg.pot.
			52,6				obnavljanje.
			8,7				Seca: oplodna
21,0			41,5				seca kratkog
21,2	3,7	0,4	319,1	737	6,1	14,2	perioda za
							obnavljanje
							oplodna seca
							(oplodni sek)
							kratkog perioda
							za obnavljanje.
							Osnovna namena:
							nacionalni park
							- III stepen
							zaštite.

hektaru				zaprem.	tekuci prirast		Primedba
eta				na celoj	na	na cel	
4	5	6	svega	povrsini	ha	pov.	
25	26	27	28	29	30	31	32
0,2	0,1	0,5	2,1	233	2,1	4,3	Osnovna namena:
	0,8	0,2	4,6	261	2,5	5,0	nacionalni park
	0,7		3,7	84	0,5	1,0	- III stepen
			3,9	35	0,5	0,9	zaštite.
	2,5		9,7	8	0,1	0,2	Sastojina za
			40,5	2		0,1	redovno
16,6			107,8				gazdovanje.
			43,2				
			38,0				
			35,5				
			14,1				
16,8	4,1	0,8	303,3	622	5,6	11,5	
0,5	0,7	0,8	7,4	1087	2,6	24,5	Osnovna namena:
1,0	1,3		6,4	1043	2,1	20,0	nacionalni park
	1,1		5,9	255	0,9	8,2	- III stepen
1,5	2,0		12,0	121	0,3	3,2	zaštite.
			27,1	48	0,1	0,8	Sastojina za
			47,4	8		0,3	redovno
			83,5				gazdovanje.
			40,5				
9,8			29,4				
			11,5				
12,8	5,1	0,8	271,1	2562	6,0	56,9	
0,1	0,4	0,3	5,4	1422	2,4	27,1	Osnovna namena:
		0,1	3,7	828	1,3	14,2	nacionalni park
	0,5		5,8	764	1,2	12,9	- III stepen

hektaru				zaprem.	tekuci prirast		Primedba
eta			svega	na celoj povrsini	na ha	na cel pov.	
4	5	6	28	29	30	31	32
			11,0	233	0,4	4,5	zaštite.
2,8			19,5	10		0,4	Sastojina za
			23,9	5		0,2	redovno
			49,2				gazdovanje.
			42,2				
			38,8				
17,9			28,9				
			32,4				
			23,2				
			8,1				
20,8	0,9	0,5	292,3	3262	5,3	59,2	

ОПИС СТАНИШТА И САСТОЈИНА

hektaru eta				zaprem. na celoj povrsini	tekuci prirast na ha	 na cel pov.	Primedba
4	5	6	svega				
25	26	27	28	29	30	31	32
2,5	0,4	2,1	7,3	795	3,9	19,4	Osnovna namena:
0,7	1,0		8,1	214	0,8	3,9	nacionalni park
3,0			14,8	163	0,9	4,4	- III stepen
	2,3		29,9	31	0,1	0,6	zaštite.
			50,5	19	0,1	0,7	Sastojina za
			70,8	10	0,1	0,6	redovno
			57,7				gazdovanje.
			10,3				
6,3	3,8	2,1	249,3	1232	6,0	29,5	
							Osnovna namena:
							nacionalni park
							- III stepen
							zaštite.
							Osnovna namena:
							nacionalni park
							- III stepen
							zaštite.
							Osnovna namena:
							nacionalni park
							- II stepen
							zaštite.
							Osnovna namena:
							nacionalni park
							- III stepen
							zaštite.
							Osnovna namena:
							nacionalni park
							- III stepen
							zaštite.
0,7	0,4	0,1	9,2	858	4,3	17,8	Osnovna namena:
0,6			4,7	363	1,7	6,8	nacionalni park
			3,2	19	0,1	0,6	- II stepen
2,8			9,0	17	0,1	0,3	zaštite.

ОПИС СТАНИШТА И САСТОЈИНА

hektaru				zaprem.	tekuci prirast		Primedba
eta				na celoj	na	na cel	
4	5	6	svega	povrsini	ha	pov.	
25	26	27	28	29	30	31	32
			25,4	1		0,1	Sastojina za
			29,5	1			redovno
			79,9				gazdovanje.
			89,6				
			57,4				
4,1	0,4	0,1	308,1	1260	6,2	25,5	

hektaru				zaprem.	tekuci prirast		
eta			svega	na celoj	na	na cel	Primedba
4	5	6		povrsini	ha	pov.	
25	26	27	28	29	30	31	32
0,3	0,5	0,4	9,0	1029	3,7	23,6	Osnovna namena:
0,9			10,0	763	2,2	14,2	nacionalni park
			5,0	39	0,1	0,8	- II stepen
			15,5	8		0,2	zaštite.
			17,5	3		0,2	Sastojina za
			45,2	3		0,1	redovno
			41,8				gazdovanje.
			104,3				
			39,0				
1,2	0,5	0,4	287,4	1845	6,1	39,1	
	0,5	0,3	2,8	298	2,5	6,0	Osnovna namena:
			7,1	162	1,0	2,4	nacionalni park
			17,7	224	1,8	4,2	- II stepen
			36,6	54	0,4	0,9	zaštite.
4,6	5,1		65,5	33	0,4	1,0	Sastojina za
	8,5		52,7	1			redovno
			42,9				gazdovanje.
			83,8				
18,3			18,3				
22,9	14,1	0,3	327,4	773	6,2	14,6	
		0,2	8,8	260	1,8	6,7	Osnovna namena:
			10,2	232	0,8	2,8	nacionalni park
	1,8		22,8	73	0,4	1,6	- II stepen
			29,7	49	0,2	0,7	zaštite.
			29,2	6		0,2	Sastojina za
			32,8	1			redovno
			9,4				gazdovanje.

ОПИС СТАНИШТА И САСТОЈИНА

hektaru				zaprem.	tekuci prirast		
eta			svega	na celoj	na	na cel	Primedba
4	5	6		povrsini	ha	pov.	
25	26	27	28	29	30	31	32
13,4			13,4				
			14,6				
13,4	1,8	0,2	171,0	621	3,3	12,0	

hektaru				zaprem.	tekuci prirast		Primedba
eta				na celoj	na	na cel	
4	5	6	svega	povrsini	ha	pov.	
25	26	27	28	29	30	31	32
0,4		0,3	4,2	1365	3,3	26,1	Osnovna namena:
1,4		0,2	3,2	768	1,9	15,5	nacionalni park
2,7		0,4	6,2	315	0,6	5,0	- II stepen
0,8		0,8	6,8	126	0,3	2,3	zaštite.
6,5		1,1	27,2	175	0,3	2,1	Sastojina za
4,1			29,4	22	0,1	0,5	redovno
			42,9				gazdovanje.
			54,4				
			17,1				
			32,0				
	21,9		40,4				
			49,0				
			33,7				
15,8	21,9	2,8	346,4	2771	6,5	51,7	
0,3	0,4	0,4	4,0	731	2,7	14,1	Osnovna namena:
		0,8	3,4	621	2,6	13,6	nacionalni park
1,1			8,2	142	0,8	3,9	- II stepen
			16,2	7		0,3	zaštite.
			44,5	2		0,1	Sastojina za
			72,9	6		0,2	redovno
			55,1				gazdovanje.
			37,1				Uzg.pot.
			51,7				obnavljanje.
1,4	0,4	1,2	293,1	1509	6,2	32,2	Seca: oplodna
							seca kratkog
							perioda za
							obnavljanje
							oplodna seca
							(pripremni sek)
							kratkog perioda
							za obnavljanje.
							Osnovna namena:
							nacionalni park
							- II stepen
							zaštite.
0,6	0,7	1,0	7,0	3016	3,9	58,5	Osnovna namena:
2,0	0,5	1,9	8,7	1326	1,5	22,8	nacionalni park
2,8	0,8		12,8	599	1,3	19,0	- II stepen
6,3	1,1		21,2	206	0,3	4,4	zaštite.

ОПИС СТАНИШТА И САСТОЈИНА

hektaru eta				zaprem. na celoj povrsini	tekuci prirast		Primedba
			svega		na ha	na cel pov.	
4	5	6	28	29	30	31	32
25	26	27					
2,2	4,8		25,2	118	0,2	3,0	Sastojina za
			38,4	42	0,1	1,4	redovno
			63,2				gazdovanje.
			78,3				
			41,0				
			30,6				
			13,4				
			16,6				
13,8	7,9	2,8	356,3	5306	7,3	109,0	

hektaru				zaprem.	tekuci prirast		
eta				na celoj	na	na cel	Primedba
4	5	6	svega	povrsini	ha	pov.	
25	26	27	28	29	30	31	32
0,3	1,1	0,6	8,7	224	2,7	4,3	Osnovna namena:
	1,2	1,3	7,8	126	1,9	3,1	nacionalni park
			1,8	20	0,2	0,3	- II stepen
5,5			15,1	9	0,1	0,2	zaštite.
			19,2	4	0,1	0,2	Sastojina za
			44,1	3	0,1	0,1	redovno
			50,1				gazdovanje.
			81,9				
			10,7				
5,8	2,3	1,9	239,3	385	5,1	8,1	
0,9	0,3		10,8	250	3,7	5,9	Osnovna namena:
			9,1	175	2,1	3,4	nacionalni park
			0,8	5	0,1	0,1	- II stepen
			10,6	1		0,1	zaštite.
			14,5	0			Sastojina za
			11,8				redovno
			120,8				gazdovanje.
			21,3				
			12,1				
			59,8				
0,9	0,3		271,7	432	5,9	9,4	
1,3	0,9	1,0	12,3	336	3,2	7,6	Osnovna namena:
1,0	2,0		11,4	228	1,8	4,2	nacionalni park
			31,4	63	0,4	0,8	- II stepen
2,5			32,2	11	0,1	0,3	zaštite.

ОПИС СТАНИШТА И САСТОЈИНА

hektaru				zaprem.	tekuci prirast		Primedba
eta				na celoj	na	na cel	
4	5	6	svega	povrsini	ha	pov.	
25	26	27	28	29	30	31	32
			42,7	7	0,1	0,3	Sastojina za
			64,8	2		0,1	redovno
			49,8				gazdovanje.
			29,4				
4,8	2,8	1,0	274,0	647	5,7	13,3	
							Osnovna namena:
							nacionalni park
							- II stepen
							zaštite.

ОПИС СТАНИШТА И САСТОЈИНА

hektaru eta				zaprem. na celoj povrsini	tekuci prirast na ha	 na cel pov.	Primedba
4	5	6	svega				
25	26	27	28	29	30	31	32
1,5	0,3	0,8	7,4	1716	2,8	30,4	Osnovna namena:
0,5	1,4	0,4	4,9	877	2,0	21,2	nacionalni park
2,6	1,8	1,0	8,8	420	1,0	11,1	- II stepen
9,4			23,0	214	0,3	3,1	zaštite.
2,5			16,8	37	0,1	1,3	Sastojina za
3,5			55,3	23	0,1	0,8	redovno
			40,9				gazdovanje.
			31,8				
			40,2				
			34,1				
			41,5				
19,8	3,5	2,2	304,7	3287	6,3	67,9	
3,7	0,1	0,2	8,0	143	1,1	2,2	Osnovna namena:
2,1			5,0	106	1,4	2,7	nacionalni park
1,2			6,3	79	0,8	1,7	- II stepen
2,8			11,2	19	0,2	0,4	zaštite.
			29,3	0			Sastojina za
			22,7	0			redovno
			13,2				gazdovanje.
			44,4				
			36,1				
9,8	0,1	0,2	176,2	347	3,5	7,0	
0,6	0,1	0,1	2,3	318	3,2	4,7	Osnovna namena:

hektaru				zaprem.	tekuci prirast		Primedba
eta			svega	na celoj	na	na cel	
4	5	6		povrsini	ha	pov.	
25	26	27	28	29	30	31	32
0,2	0,7		3,6	23	0,2	0,3	nacionalni park
0,9			0,9	4		0,1	- II stepen
			2,2	3	0,1	0,1	zaštite.
			1,8	1			Sastojina za
			21,1	0			redovno
			20,9				gazdovanje.
			20,6				Uzg.pot.
			32,1				obnavljanje.
			54,4				Seca: oplodna
			33,3				seca kratkog
			28,4				perioda za
			18,5				obnavljanje
1,8	0,7	0,1	240,0	348	3,6	5,2	oplodna seca
							(završni sek)
							kratkog perioda
							za obnavljanje.

hektaru				zaprem.	tekuci prirast		Primedba
eta			svega	na celoj	na	na cel	
4	5	6		povrsini	ha	pov.	
25	26	27	28	29	30	31	32
1,2	1,0	0,9	8,3	338	2,5	7,6	Osnovna namena:
0,2	0,6		4,2	483	3,0	9,2	nacionalni park
0,4			1,2	17	0,2	0,5	- II stepen
2,9			9,2	14	0,2	0,7	zaštite.
			14,5	5		0,1	Sastojina za
			32,6	3		0,1	redovno
			67,6				gazdovanje.
			77,0				
			31,4				
			5,8				
			6,8				
			11,1				
			12,9				
4,6	1,6	0,9	282,7	860	6,0	18,2	
0,4	0,3	0,2	2,7	891	3,3	13,9	Osnovna namena:
0,7		0,1	1,5	468	2,0	8,8	nacionalni park
			5,1	110	0,5	2,0	- II stepen
2,0			17,9	18	0,1	0,5	zaštite.
1,0	1,2		13,3	36	0,2	0,8	Sastojina za
			40,4	1		0,1	redovno
			49,4				gazdovanje.
	6,8		70,1				
			51,7				
			60,7				
			29,2				
			13,4				
4,1	8,3	0,3	355,3	1524	6,1	26,1	
0,1		0,2	2,5	280	3,3	4,7	Osnovna namena:
1,1		0,5	2,7	108	1,3	1,9	nacionalni park
			1,6	58	0,7	1,0	- II stepen
			3,6	41	0,6	0,9	zaštite.

ОПИС СТАНИШТА И САСТОЈИНА

hektaru eta				zaprem. na celoj	tekuci prirast na	 na cel	Primedba
4	5	6	svega	povrsini	ha	pov.	
25	26	27	28	29	30	31	32
			3,2				Sastojina za
			10,0	1			redovno
			32,6				gazdovanje.
			51,8				Uzg.pot.
11,9			100,2				obnavljanje.
			27,4				Seca: oplodna
15,6			52,4				seca kratkog
			20,7				perioda za
			30,9				obnavljanje
28,8		0,7	339,7	489	5,9	8,4	oplodna seca
							(oplodni i
							završni sek)
							kratkog perioda
							za obnavljanje.

hektaru eta				zaprem. na celoj povrsini	tekuci prirast		Primedba
			svega		na ha	na cel pov.	
4	5	6	28	29	30	31	32
							Osnovna namena:
							nacionalni park
							- II stepen
							zaštite.
	0,3		2,2	478	2,7	7,3	Osnovna namena:
1,0	0,3		3,4	125	0,8	2,3	nacionalni park
	3,5		6,1	57	0,4	1,1	- III stepen
			1,1	39	0,3	0,9	zaštite.
3,2		5,7	16,8	33	0,4	1,1	Sastojina za
2,3		5,8	13,3	30	0,3	0,7	redovno
3,4			21,8				gazdovanje.
4,8			37,8				
			97,0				
	8,2		50,0				
			18,8				
			19,6				
14,8	12,3	11,4	287,6	762	5,0	13,3	
3,3			16,7	65	3,2	2,1	Osnovna namena:
3,7			7,5	75	2,5	1,6	nacionalni park
			38,1	6	0,3	0,2	- III stepen
			69,9	4	0,3	0,2	zaštite.
			24,8				Sastojina za
			77,9				redovno
6,9			234,9	150	6,2	4,0	gazdovanje.

ОПИС СТАНИШТА И САСТОЈИНА

hektaru eta				zaprem. na celoj povrsini	tekuci prirast na ha	 na cel pov.	Primedba
4	5	6	svega				
25	26	27	28	29	30	31	32

ОПИС СТАНИШТА И САСТОЈИНА

hektaru				zaprem.	tekuci prirast		Primedba
eta			svega	na celoj povrsini	na ha	na cel pov.	
4	5	6	28	29	30	31	32
0,1	0,2	0,2	11,4	794	3,3	14,9	Osnovna namena:
0,7	1,2	0,8	12,8	468	2,6	11,9	nacionalni park
		0,6	4,6	17	0,1	0,4	- III stepen
2,9	3,2		15,4	17	0,1	0,5	zaštite.
			38,7	21	0,1	0,4	Sastojina za
			53,0	7	0,1	0,3	redovno
			86,4				gazdovanje.
			24,3				
			22,1				
			22,3				
3,8	4,6	1,6	290,9	1324	6,3	28,4	
2,7			7,2	99	3,5	2,1	Osnovna namena:
			5,2	64	1,7	1,0	nacionalni park
	3,2	3,3	17,5	9	0,4	0,3	- III stepen
			22,0	2	0,1	0,1	zaštite.
			52,4	2	0,1	0,1	Sastojina za
			71,6	2	0,1		redovno
			71,9				gazdovanje.
			47,0				
2,7	3,2	3,3	294,7	177	5,9	3,6	
0,6	0,7	0,6	5,6	361	3,9	5,9	Osnovna namena:
2,5			12,2	55	1,0	1,6	nacionalni park
			8,9	25	0,3	0,4	- III stepen

ОПИС СТАНИШТА И САСТОЈИНА

hektaru				zaprem.	tekuci prirast		Primedba
eta			svega	na celoj	na	na cel	
4	5	6		povrsini	ha	pov.	
25	26	27	28	29	30	31	32
			33,3	5	0,1	0,2	zaštite.
			11,0	1			Sastojina za
			43,3	1			redovno
			51,8				gazdovanje.
			36,3				
			92,4				
3,1	0,7	0,6	294,7	448	5,3	8,1	

hektaru				zaprem.	tekuci prirast		Primedba
eta				na celoj	na	na cel	
4	5	6	svega	povrsini	ha	pov.	
25	26	27	28	29	30	31	32
0,3	0,1	1,3	3,6	672	3,3	10,8	Osnovna namena:
0,7	0,3	0,3	1,8	293	1,5	4,8	nacionalni park
1,0	0,9		4,5	58	0,5	1,7	- III stepen
1,7			9,3	31	0,2	0,6	zaštite.
1,3			1,3	10	0,1	0,3	Sastojina za
1,9	1,9		21,0	5	0,1	0,2	redovno
2,6			53,3				gazdovanje.
			80,1				
			44,9				
			41,8				
			33,7				
			8,5				
			25,0				
9,6	3,2	1,6	328,9	1069	5,7	18,4	
							Osnovna namena:
							nacionalni park
							- III stepen
							zaštite.
0,2	0,1	0,3	4,1	317	3,0	6,1	Osnovna namena:
	0,2		0,5	210	2,1	4,4	nacionalni park
			4,6	24	0,3	0,7	- III stepen
3,1	2,2		30,8	19	0,3	0,5	zaštite.
			72,6	5	0,1	0,1	Sastojina za
5,7			101,0	1			redovno
			28,7				gazdovanje.
			16,6				
			19,7				
9,0	2,5	0,3	278,7	574	5,7	11,8	

ОПИС СТАНИШТА И САСТОЈИНА

hektaru eta				zaprem. na celoj povrsini	tekuci prirast na ha	 na cel pov.	Primedba
4	5	6	svega				
25	26	27	28	29	30	31	32

ОПИС СТАНИШТА И САСТОЈИНА

hektaru eta				zaprem. na celoj povrsini	tekuci prirast		Primedba
			svega		na ha	na cel pov.	
4	5	6	28	29	30	31	32
25	26	27					
	0,3		13,6	325	3,1	8,7	Osnovna namena:
			6,8	398	3,1	8,8	nacionalni park
			20,2	66	0,4	1,0	- III stepen
			22,6	41	0,3	0,8	zaštite.
5,2			52,4	1			Sastojina za
			59,8				redovno
9,3			48,6				gazdovanje.
			23,9				
			48,7				
14,5	0,3		296,7	831	6,9	19,3	
0,5	0,2	0,1	15,9	932	3,7	17,8	Osnovna namena:
	1,0		8,5	469	2,7	12,8	nacionalni park
	1,4		12,3	45	0,2	1,0	- III stepen
			32,2	24	0,1	0,6	zaštite.
			32,8	13	0,1	0,4	Sastojina za
			65,0	1			redovno
4,5			114,3				gazdovanje.
			28,1				
5,0	2,7	0,1	309,1	1484	6,8	32,6	
			4,2	92	3,2	2,0	Osnovna namena:
2,0			5,3	9	0,5	0,3	nacionalni park
			7,0	7	0,3	0,2	- III stepen

ОПИС СТАНИШТА И САСТОЈИНА

hektaru				zaprem.	tekuci prirast		Primedba
eta			svega	na celoj	na	na cel	
4	5	6		povrsini	ha	pov.	
25	26	27	28	29	30	31	32
			38,3	1	0,1		zaštite.
			56,9				Sastojina za
			15,7				redovno
			49,0				gazdovanje.
2,0			176,5	109	4,0	2,5	

ОПИС СТАНИШТА И САСТОЈИНА

hektaru eta				zaprem. na celoj	tekuci prirast na	 na cel	Primedba
4	5	6	svega	povrsini	ha	pov.	
25	26	27	28	29	30	31	32
1,4	0,1	0,5	17,6	568	3,0	11,3	Osnovna namena:
1,8			17,4	202	1,6	6,0	nacionalni park
	1,2	1,6	26,9	93	0,5	2,0	- III stepen
7,2			28,2	50	0,3	1,2	zaštite.
2,7	3,4		40,1	18	0,2	0,6	Sastojina za
			24,5	8	0,1	0,3	redovno
			14,5				gazdovanje.
			17,1				
			23,7				
			39,8				
13,2	4,7	2,1	249,7	939	5,7	21,3	
							Osnovna namena:
							nacionalni park
							- III stepen
							zaštite.
1,1	0,3	0,3	6,4	462	3,8	9,3	Osnovna namena:
			2,6	371	2,8	6,9	nacionalni park
			6,3	22	0,2	0,6	- III stepen
			5,7	3		0,1	zaštite.
			44,4	1			Sastojina za
			101,6	1			redovno
			84,6				gazdovanje.
			65,7				Uzg.pot.
			21,7				obnavljanje.
			11,8				Seca: oplodna
1,1	0,3	0,3	350,7	859	6,9	17,0	seca kratkog
							perioda za
							obnavljanje
							oplodna seca
							(pripremni sek)
							kratkog perioda
							za obnavljanje.
	0,3	0,6	2,1	81	1,7	1,3	Osnovna namena:
	1,9	0,5	3,9	25	0,9	0,7	nacionalni park
0,7			2,8	12	0,5	0,4	- III stepen
			13,6	11	0,2	0,2	zaštite.
			11,1	7	0,3	0,2	Sastojina za
	5,8		16,4	1	0,1	0,1	redovno
			25,1				gazdovanje.

ОПИС СТАНИШТА И САСТОЈИНА

hektaru				zaprem.	tekuci prirast		
eta				na celoj	na	na cel	Primedba
4	5	6	svega	povrsini	ha	pov.	
25	26	27	28	29	30	31	32
			8,1				
			22,6				
13,3			42,2				
			21,1				
14,0	8,0	1,1	169,1	137	3,5	2,9	

hektaru				zaprem.	tekuci prirast		Primedba
eta				na celoj	na	na cel	
4	5	6	svega	povrsini	ha	pov.	
25	26	27	28	29	30	31	32
0,7	0,3	0,2	4,6	216	1,4	3,9	Osnovna namena:
0,4			1,0	306	2,2	6,4	nacionalni park
1,5			2,5	365	1,9	5,3	- III stepen
3,6			3,6	34	0,3	0,8	zaštite.
1,2			10,1	59	0,6	1,6	Sastojina za
4,4	7,1		52,6	1			redovno
			41,6				gazdovanje.
	13,1		42,1				
			93,8				
			45,6				
			45,3				
11,8	20,5	0,2	342,7	980	6,3	18,0	
0,9	1,1	1,0	12,5	3086	3,8	49,4	Osnovna namena:
	0,3		6,6	612	1,5	19,2	nacionalni park
			6,1	226	0,6	7,7	- III stepen
			5,5	88	0,2	2,5	zaštite.
			2,7	18		0,4	Sastojina za
			13,0	13		0,5	redovno
5,8			67,2				gazdovanje.
			94,4				
			58,0				
			42,5				
6,7	1,4	1,0	308,4	4044	6,1	79,7	
0,4		0,5	8,9	966	3,4	17,1	Osnovna namena:
			4,4	386	2,1	10,5	nacionalni park

ОПИС СТАНИШТА И САСТОЈИНА

hektaru eta				zaprem. na celoj	tekuci prirast		Primedba
			svega	povrsini	na ha	na cel pov.	
4	5	6	28	29	30	31	32
25	26	27					
	0,9		4,7	158	1,0	5,0	- III stepen
	1,6		10,3	38	0,2	1,2	zaštite.
1,3	2,0		11,5	31	0,1	0,7	Sastojina za
	1,6	4,5	32,7	26	0,1	0,7	redovno
2,6			61,4				gazdovanje.
3,3			69,2				
			35,0				
			40,6				
			16,1				
			22,5				
7,5	6,1	5,0	317,1	1604	7,0	35,2	

hektaru				zaprem.	tekuci prirast		Primedba
eta				na celoj	na	na cel	
4	5	6	svega	povrsini	ha	pov.	
25	26	27	28	29	30	31	32
0,6	0,5	0,2	6,8	313	3,2	4,2	Osnovna namena:
			4,4	52	0,9	1,1	nacionalni park
			4,4	15	0,4	0,5	- III stepen
			2,5	12	0,3	0,4	zaštite.
8,3			8,3	1			Sastojina za
			12,8	0			redovno
			6,5				gazdovanje.
			10,5				
			66,1				
			59,3				
			51,9				
			68,1				
8,9	0,5	0,2	301,5	392	4,8	6,3	
0,1	0,6		4,4	108	2,0	2,0	Osnovna namena:
			7,4	38	1,2	1,2	nacionalni park
			12,9	8	0,3	0,3	- III stepen
			17,6	8	0,1	0,1	zaštite.
			24,8	1			Sastojina za
8,2			25,5				redovno
			36,0				gazdovanje.
			36,1				Uzg.pot.
8,3	0,6		164,6	163	3,6	3,6	proreda. Seca:
							proredna seca
							selektivna proreda.
1,4			9,9	24	2,2	0,6	Osnovna namena:
1,3	1,2		6,4	5	0,6	0,2	nacionalni park
			8,5	2	0,4	0,1	- III stepen
			37,3	1	0,1		zaštite.
			27,0	0	0,1		Sastojina za
			36,1				redovno
2,7	1,2		125,2	31	3,4	0,9	gazdovanje.
							Uzg.pot.

hektaru eta				zaprem. na celoj	tekuci prirast na	 na cel	Primedba
4	5	6	svega	povrsini	ha	pov.	
25	26	27	28	29	30	31	32
							proreda. Seca:
							proredna seca
							selektivna proreda.
	0,3		12,7	2483	10,9	117,4	Osnovna namena:
1,5			50,9	76	0,2	1,9	nacionalni park
			98,6	46	0,1	0,8	- III stepen
			58,7	16	0,1	0,5	zaštite.
			21,6	4		0,2	Sastojina za
1,5	0,3		242,6	2625	11,2	120,9	redovno
							gazdovanje.
							Uzg.pot.
							proreda. Seca:
							proredna seca
							selektivna proreda.

ОПИС СТАНИШТА И САСТОЈИНА

hektaru eta				zaprem. na celoj povrsini	tekuci prirast na ha	 na cel pov.	Primedba
4	5	6	svega				
25	26	27	28	29	30	31	32
1,3	2,6		21,4	51	1,5	1,0	Osnovna namena:
			82,6	78	6,4	4,3	nacionalni park
			54,8	7	0,3	0,2	- III stepen
			48,6	1	0,1		zaštite.
				2	0,1	0,1	Sastojina za
1,3	2,6		207,4	139	8,4	5,7	redovno
							gazdovanje.
							Uzg.pot.
							proreda. Seca:
							proredna seca
							selektivna proreda.
			0,1	1435	9,8	60,6	Osnovna namena:
0,3			3,2	5		0,2	nacionalni park
			23,8	1			- III stepen
			66,8	2		0,1	zaštite.
			79,2				Sastojina za
			52,3				redovno
			3,1				gazdovanje.
			4,2				Uzg.pot.
0,3			232,6	1442	9,8	60,9	proreda. Seca:
							proredna seca
							selektivna proreda.
							Osnovna namena:
							Osnovna namena:
							nacionalni park
							- III stepen
							zaštite.
0,7	0,8	0,2	6,0	478	3,8	10,0	Osnovna namena:
1,4			5,0	293	2,3	5,9	nacionalni park
			2,2	51	0,5	1,2	- III stepen
			23,3	20	0,2	0,4	zaštite.
5,5			36,9	2		0,1	Sastojina za
			46,9	1			redovno
			143,4				gazdovanje.
			39,8				
			22,1				
7,6	0,8	0,2	325,5	843	6,8	17,6	

ОПИС СТАНИШТА И САСТОЈИНА

hektaru eta				zaprem. na celoj povrsini	tekuci prirast na ha	 na cel pov.	Primedba
4	5	6	svega				
25	26	27	28	29	30	31	32

ОПИС СТАНИШТА И САСТОЈИНА

hektaru eta				zaprem. na celoj povrsini	tekuci prirast na ha	 na cel pov.	Primedba
4	5	6	svega				
25	26	27	28	29	30	31	32
0,5	0,4	0,4	5,2	625	2,6	12,8	Osnovna namena:
	0,5		1,6	437	1,5	7,7	nacionalni park
2,0			4,8	94	0,5	2,6	- III stepen
1,8			3,6	28	0,1	0,7	zaštite.
1,3	3,2		17,3	21	0,1	0,3	Sastojina za
			25,1	2		0,1	redovno
			58,4				gazdovanje.
			35,0				
			47,1				
			19,5				
			10,4				
			14,9				
5,7	4,1	0,4	242,9	1207	4,9	24,2	
0,3			5,6	150	3,1	2,9	Osnovna namena:
			3,5	77	1,9	1,8	nacionalni park
			4,1	48	1,0	1,0	- III stepen
			6,0	0			zaštite.
			87,6				Sastojina za
			125,3				redovno
			59,9				gazdovanje.
0,3			292,0	275	6,1	5,7	
0,5	0,5	0,2	7,2	983	3,2	21,2	Osnovna namena:
			5,3	625	2,0	12,9	nacionalni park

ОПИС СТАНИШТА И САСТОЈИНА

hektaru				zaprem.	tekuci prirast		Primedba
eta			svega	na celoj	na	na cel	
4	5	6		povrsini	ha	pov.	
25	26	27	28	29	30	31	32
			2,6	44	0,1	0,8	- III stepen
			19,8	4		0,2	zaštite.
			42,3	3		0,1	Sastojina za
			64,0	2			redovno
			55,3				gazdovanje.
			35,1				Uzg.pot.
			22,5				obnavljanje.
0,5	0,5	0,2	254,0	1661	5,4	35,3	Seca: oplodna
							seca kratkog
							perioda za
							obnavljanje
							oplodna seca
							(pripremni sek)
							kratkog perioda
							za obnavljanje.

ОПИС СТАНИШТА И САСТОЈИНА

hektaru eta				zaprem. na celoj povrsini	tekuci prirast		Primedba
			svega		na ha	na cel pov.	
4	5	6	28	29	30	31	32
							Osnovna namena:
							nacionalni park
							- III stepen
							zaštite.
0,8	0,4	0,4	8,8	1167	3,2	22,2	Osnovna namena:
0,9	0,6	0,3	13,7	722	2,5	17,6	nacionalni park
0,7			7,4	23	0,1	1,0	- II stepen
			6,5	16	0,1	0,8	zaštite.
			27,8	6		0,2	Sastojina za
			60,5	5		0,1	redovno
			66,6				gazdovanje.
			57,6				
			31,5				
2,3	0,9	0,7	280,2	1939	6,1	41,9	
0,4	0,8	0,3	5,8	77	2,3	1,5	Osnovna namena:
1,3			13,3	33	1,4	0,9	nacionalni park
			2,4	1			- II stepen
			24,4	1			zaštite.
			38,7	1			Sastojina za
			79,2	0			redovno
			15,4				gazdovanje.
1,7	0,8	0,3	179,1	113	3,8	2,4	
							Osnovna namena:

ОПИС СТАНИШТА И САСТОЈИНА

hektaru eta				zaprem. na celoj povrsini	tekuci prirast na ha	 na cel pov.	Primedba
4	5	6	svega				
25	26	27	28	29	30	31	32
							nacionalni park
							- II stepen
							zaštite.

hektaru				zaprem.	tekuci prirast		Primedba
eta				na celoj	na	na cel	
4	5	6	svega	povrsini	ha	pov.	
25	26	27	28	29	30	31	32
1,1	0,7	0,3	8,1	1412	3,5	30,3	Osnovna namena:
			6,6	1122	2,2	18,8	nacionalni park
			4,0	34	0,1	1,0	- III stepen
			2,2	9		0,4	zaštite.
			8,0	6		0,4	Sastojina za
			20,3	3		0,1	redovno
			87,1				gazdovanje.
			45,7				Uzg.pot.
			53,4				obnavljanje.
			39,7				Seca: oplodna
			15,0				seca kratkog
			7,2				perioda za
1,1	0,7	0,3	297,3	2587	5,9	50,9	obnavljanje
							oplodna seca
							(pripremni sek)
							kratkog perioda
							za obnavljanje.
1,0	0,2	0,6	6,3	1953	4,4	36,2	Osnovna namena:
0,2		0,4	2,2	456	1,0	7,9	nacionalni park
0,7			3,1	132	0,5	4,0	- II stepen
	1,8		7,6	15	0,1	0,8	zaštite.
			7,7	16	0,1	0,4	Sastojina za
			36,9	8		0,2	redovno
			49,8				gazdovanje.
			74,7				
			51,2				
			69,3				
			5,8				
1,8	2,0	1,0	314,6	2579	6,0	49,5	
0,4	0,4	0,4	3,8	239	2,0	4,0	Osnovna namena:
0,8			3,2	232	2,2	4,5	nacionalni park
			6,2	15	0,2	0,4	- II stepen

ОПИС СТАНИШТА И САСТОЈИНА

hektaru eta				zaprem. na celoj povrsini	tekuci prirast na ha	 na cel pov.	Primedba
4	5	6	svega				
25	26	27	28	29	30	31	32
			6,7	23	0,4	0,8	zaštite.
			19,4	1			Sastojina za
10,2			22,3	1			redovno
			66,9				gazdovanje.
			73,7				
			19,3				
			28,0				
11,4	0,4	0,4	249,5	511	4,8	9,8	

hektaru				zaprem.	tekuci prirast		Primedba
eta			svega	na celoj	na	na cel	
4	5	6		povrsini	ha	pov.	
25	26	27	28	29	30	31	32
							Osnovna namena:
							nacionalni park
							- III stepen
							zaštite.
							Osnovna namena:
							nacionalni park
							- III stepen
							zaštite.
							Osnovna namena:
							nacionalni park
							- II stepen
							zaštite.
0,8	0,9	0,1	4,6	1550	3,7	26,3	Osnovna namena:
0,3	0,5	0,2	5,3	466	1,6	11,2	nacionalni park
0,3			3,3	85	0,4	2,6	- III stepen
			4,7	32	0,1	0,9	zaštite.
3,1			8,3	10		0,3	Sastojina za
			27,1	2		0,1	redovno
			68,8				gazdovanje.
			58,7				Uzg.pot.
			49,8				obnavljanje.
			45,5				Seca: oplodna
			20,9				seca kratkog
			7,9				perioda za
4,5	1,4	0,3	304,5	2144	5,9	41,3	obnavljanje
							oplodna seca
							(oplodni sek)
							kratkog perioda
							za obnavljanje.
0,5			4,4	1074	5,9	22,9	Osnovna namena:
			2,6	347	1,7	6,5	nacionalni park
			2,1	189	1,0	3,8	- II stepen
	1,1		17,1	20	0,1	0,5	zaštite.
			18,1	5		0,1	Sastojina za
			18,4				redovno
4,6			61,6				gazdovanje.
			92,8				Uzg.pot.
			59,1				obnavljanje.
			46,6				Seca: oplodna
			55,8				seca kratkog
			19,2				perioda za
			20,1				obnavljanje
5,0	1,1		417,9	1634	8,6	33,8	oplodna seca
							(završni sek)
							kratkog perioda

ОПИС СТАНИШТА И САСТОЈИНА

hektaru				zaprem.	tekuci prirast		
eta				na celoj	na	na cel	Primedba
4	5	6	svega	povrsini	ha	pov.	
25	26	27	28	29	30	31	32
							za obnavljanje.

ОПИС СТАНИШТА И САСТОЈИНА

hektaru eta				zaprem. na celoj povrsini	tekuci prirast na ha	 na cel pov.	Primedba
4	5	6	svega				
25	26	27	28	29	30	31	32
6,0	0,7	0,2	9,2	152	1,3	3,6	Osnovna namena:
3,0	3,7		8,5	285	1,6	4,4	nacionalni park
2,0		0,6	6,9	48	0,5	1,4	- II stepen
			10,0	31	0,2	0,6	zaštite.
			33,3	12	0,2	0,4	Sastojina za
			40,9	2		0,1	redovno
			40,8				gazdovanje.
			40,7				
11,0	4,4	0,8	190,4	529	3,8	10,6	
1,0	0,6	0,1	9,0	583	3,5	10,7	Osnovna namena:
0,6			11,9	394	3,2	10,0	nacionalni park
			3,3	6	0,1	0,2	- II stepen
			3,1	5		0,1	zaštite.
			11,8	2		0,1	Sastojina za
			41,3	0			redovno
			48,6				gazdovanje.
			68,6				
			99,9				
			22,7				
1,5	0,6	0,1	320,2	990	6,8	21,1	
							Osnovna namena:
							nacionalni park

ОПИС СТАНИШТА И САСТОЈИНА

hektaru eta				zaprem. na celoj povrsini	tekuci prirast na ha	 na cel pov.	Primedba
4	5	6	svega				
25	26	27	28	29	30	31	32
							- III stepen
							zaštite.
0,4	0,2	0,3	1,1	690	3,0	9,2	Osnovna namena:
0,3	0,5	0,2	1,0	439	2,4	7,1	nacionalni park
2,2			3,5	28	0,2	0,7	- II stepen
1,3			4,0	18	0,1	0,4	zaštite.
1,7			13,9	2		0,1	Sastojina za
			34,3	2		0,1	redovno
			26,7				gazdovanje.
			83,7				Uzg.pot.
			74,6				obnavljanje.
			91,1				Seca: oplodna
			42,1				seca kratkog
			13,1				perioda za
5,8	0,7	0,5	389,1	1179	5,8	17,6	obnavljanje
							oplodna seca
							(oplodni i
							završni sek)
							kratkog perioda
							za obnavljanje.

ОПИС СТАНИШТА И САСТОЈИНА

hektaru eta				zaprem. na celoj povrsini	tekuci prirast		Primedba
			svega		na ha	na cel pov.	
4	5	6	28	29	30	31	32
1,3	0,9	0,8	9,2	1348	4,4	23,3	Osnovna namena:
0,8	1,1	0,4	11,8	404	2,0	10,7	nacionalni park
		2,5	12,1	33	0,2	0,9	- II stepen
	0,7		10,5	44	0,4	1,9	zaštite.
6,2			28,6	15	0,1	0,6	Sastojina za
			39,8	20	0,1	0,3	redovno
			105,1				gazdovanje.
			81,1				
			50,7				
8,2	2,7	3,7	348,9	1863	7,1	37,7	
1,4	0,8	1,4	17,2	367	2,6	7,7	Osnovna namena:
1,6	1,2		13,3	94	0,9	2,6	nacionalni park
			7,0	74	0,5	1,4	- II stepen
			23,1	9	0,1	0,4	zaštite.
			43,0	6	0,1	0,3	Sastojina za
			40,9	4		0,1	redovno
			40,4				gazdovanje.
3,0	2,1	1,4	184,9	553	4,2	12,6	
							Osnovna namena:
							nacionalni park
							- II stepen
							zaštite.
			15,5	28	2,8	0,7	Osnovna namena:
			28,1	33	1,7	0,5	nacionalni park

ОПИС СТАНИШТА И САСТОЈИНА

hektaru				zaprem.	tekuci prirast		
eta			svega	na celoj	na	na cel	Primedba
4	5	6		povrsini	ha	pov.	
25	26	27	28	29	30	31	32
			22,1	21	3,5	0,9	- III stepen
			52,3				zaštite.
			71,7				Sastojina za
			128,6				redovno
			318,4	83	8,0	2,1	gazdovanje.

ОПИС СТАНИШТА И САСТОЈИНА

hektaru eta				zaprem. na celoj povrsini	tekuci prirast na ha	tekuci prirast na cel pov.	Primedba
4	5	6	svega				
25	26	27	28	29	30	31	32
1,2	0,2		8,5	1162	4,2	21,4	Osnovna namena:
1,3	0,7	0,6	13,3	313	1,7	8,5	nacionalni park
1,3		1,0	10,1	31	0,2	1,2	- II stepen
0,7			9,8	23	0,1	0,4	zaštite.
	1,1		5,0	10	0,1	0,5	Sastojina za
			47,1	9		0,2	redovno
			113,1				gazdovanje.
			86,4				
			10,1				
4,4	2,0	1,7	303,5	1548	6,3	32,2	
			4,2	56	2,7	1,1	Osnovna namena:
			6,7	12	0,8	0,3	nacionalni park
			20,2	2	0,1		- II stepen
			6,8				zaštite.
			52,0				Sastojina za
			13,8				redovno
			22,7				gazdovanje.
			54,6				
			181,2	71	3,6	1,4	
2,0	0,9		10,7	122	2,8	2,9	Osnovna namena:
2,6	1,9		13,3	48	1,1	1,2	nacionalni park
2,1			18,3	28	0,5	0,5	- II stepen
			20,9	7	0,1	0,1	zaštite.
			19,5	3	0,1	0,1	Sastojina za

ОПИС СТАНИШТА И САСТОЈИНА

hektaru				zaprem.	tekuci prirast		
eta			svega	na celoj	na	na cel	Primedba
4	5	6		povrsini	ha	pov.	
25	26	27	28	29	30	31	32
			49,4				redovno
			19,7				gazdovanje.
			46,8				
6,7	2,8		198,6	209	4,7	4,9	

hektaru				zaprem.	tekuci prirast		Primedba
eta			svega	na celoj povrsini	na ha	na cel pov.	
4	5	6	28	29	30	31	32
6,3	0,3	0,2	8,8	324	1,8	6,8	Osnovna namena:
5,6	0,7	0,5	9,3	147	0,8	2,8	nacionalni park
1,9	1,1	0,9	8,4	85	0,6	2,3	- II stepen
			19,5	51	0,3	1,1	zaštite.
			32,7	8	0,1	0,3	Sastojina za
			38,5	6	0,1	0,2	redovno
			15,2				gazdovanje.
			9,4				
			24,9				
13,8	2,1	1,6	166,6	622	3,7	13,6	
0,4	0,1	0,1	6,0	329	3,2	6,9	Osnovna namena:
0,7			6,3	285	2,6	5,6	nacionalni park
			23,8	23	0,3	0,6	- III stepen
			24,9	3		0,1	zaštite.
			39,4	0			Sastojina za
			68,3	0			redovno
			65,6				gazdovanje.
			28,4				
			20,0				
			12,5				
1,2	0,1	0,1	295,2	641	6,1	13,3	
0,5	0,1	0,1	7,0	699	3,3	15,4	Osnovna namena:
			5,6	457	2,1	9,7	nacionalni park
			14,7	3		0,1	- III stepen
			33,1	2		0,1	zaštite.

ОПИС СТАНИШТА И САСТОЈИНА

hektaru				zaprem.	tekuci prirast		Primedba
eta			svega	na celoj	na	na cel	
4	5	6		povrsini	ha	pov.	
25	26	27	28	29	30	31	32
			47,8	1			Sastojina za
			58,5	0			redovno
			47,7				gazdovanje.
			36,0				
0,5	0,1	0,1	250,3	1162	5,5	25,3	

ОПИС СТАНИШТА И САСТОЈИНА

hektaru eta				zaprem. na celoj povrsini	tekuci prirast		Primedba
			svega		na ha	na cel pov.	
4	5	6	28	29	30	31	32
6,1	0,5	0,7	37,1	412	2,4	13,4	Osnovna namena:
4,7	2,5		31,1	275	2,1	12,0	nacionalni park
			17,2	160	0,9	5,1	- III stepen
	2,4		20,8	60	0,6	3,5	zaštite.
			18,2	31	0,2	1,3	Sastojina za
			18,7	4		0,2	redovno
			25,0				gazdovanje.
10,8	5,5	0,7	168,0	943	6,3	35,5	
							Osnovna namena:
							nacionalni park
							- III stepen
							zaštite.
							Osnovna namena:
							nacionalni park
							- III stepen
							zaštite.
							Osnovna namena:
							nacionalni park
							- III stepen
							zaštite.
							Osnovna namena:
							nacionalni park
							- III stepen
							zaštite.
0,1	0,8	1,6	2,9	439	3,7	8,3	Osnovna namena:
		1,3	2,4	267	1,8	4,1	nacionalni park
1,6			2,2	108	0,9	2,0	- II stepen
4,6			10,1	76	0,4	0,9	zaštite.
5,9			14,1	17	0,3	0,7	Sastojina za
5,2			63,0	6	0,2	0,4	redovno
11,8			75,5				gazdovanje.

ОПИС СТАНИШТА И САСТОЈИНА

hektaru				zaprem.	tekuci prirast		Primedba
eta				na celoj	na	na cel	
4	5	6	svega	povrsini	ha	pov.	
25	26	27	28	29	30	31	32
4,7			91,3				Uzg.pot.
	6,9		43,4				obnavljanje.
			68,3				Seca: oplodna
			23,2				seca kratkog
			12,9				perioda za
34,0	7,6	2,9	409,3	913	7,4	16,5	obnavljanje
							oplodna seca
							(oplodni sek)
							kratkog perioda
							za obnavljanje.

hektaru				zaprem.	tekuci prirast		Primedba
eta			svega	na celoj povrsini	na ha	na cel pov.	
4	5	6	28	29	30	31	32
5,0	0,9	0,3	11,7	806	3,3	19,4	Osnovna namena:
2,2	0,5	1,0	10,0	282	0,9	5,4	nacionalni park
1,8	0,9		12,6	182	1,0	5,6	- II stepen
			23,5	53	0,2	1,2	zaštite.
			51,3	40	0,3	1,7	Sastojina za
	4,4		84,0	8		0,3	redovno
			31,3				gazdovanje.
			8,3				
9,0	6,7	1,3	232,7	1370	5,7	33,5	
	6,2	1,4	20,9	79	1,3	1,8	Osnovna namena:
	6,3		12,5	47	1,0	1,4	nacionalni park
10,8			10,8	25	0,4	0,6	- II stepen
7,2			7,2	26	0,5	0,7	zaštite.
			54,7	18	0,6	0,8	Sastojina za
			30,1	2	0,1	0,1	redovno
18,0	12,5	1,4	136,2	197	3,8	5,4	gazdovanje.
			13,1	18	4,1	0,8	Osnovna namena:
			53,5	3	0,6	0,1	nacionalni park
			14,2				- II stepen
			27,9				zaštite.

ОПИС СТАНИШТА И САСТОЈИНА

hektaru eta				zaprem. na celoj povrsini	tekuci prirast na ha	 na cel pov.	Primedba
4	5	6	svega				
25	26	27	28	29	30	31	32
			108,7	22	4,7	0,9	Sastojina za
							redovno
							gazdovanje.

hektaru eta				zaprem. na celoj	tekuci prirast		Primedba
			svega	povrsini	na ha	na cel pov.	
4	5	6					
25	26	27	28	29	30	31	32
0,5	0,3	1,3	3,8	444	1,9	9,2	Osnovna namena:
1,2	2,3	1,4	8,6	435	2,0	9,8	nacionalni park
1,8	4,5	1,6	17,0	357	1,6	7,8	- II stepen
2,7			26,9	71	0,5	2,5	zaštite.
			48,9	34	0,3	1,2	Sastojina za
			61,3	20	0,1	0,6	redovno
			47,3				gazdovanje.
8,6			22,3				Uzg.pot.
			20,2				obnavljanje.
			15,8				Seca: oplodna
			13,0				seca kratkog
14,8	7,1	4,2	285,1	1360	6,5	31,0	perioda za
							obnavljanje
							oplodna seca
							(pripremni sek)
							kratkog perioda
							za obnavljanje.
0,8	0,4	0,3	7,3	575	3,2	10,1	Osnovna namena:
		0,4	9,1	298	2,3	7,4	nacionalni park
1,5			7,3	54	0,4	1,4	- III stepen
	3,0		20,6	7	0,1	0,2	zaštite.
			21,1	11	0,1	0,4	Sastojina za
			45,1	2			redovno
			43,2				gazdovanje.
			61,3				
			57,8				
			7,5				
			19,3				
2,3	3,4	0,7	299,7	947	6,2	19,6	
	0,4		4,1	115	3,3	2,4	Osnovna namena:
	1,4	1,6	10,1	25	0,5	0,3	nacionalni park
2,5			9,0	3	0,1	0,1	- III stepen
			24,7	2	0,1	0,1	zaštite.

ОПИС СТАНИШТА И САСТОЈИНА

hektaru eta				zaprem. na celoj povrsini	tekuci prirast na ha	 na cel pov.	Primedba
4	5	6	svega				
25	26	27	28	29	30	31	32
			34,3	1	0,1	0,1	Sastojina za
			28,9	1	0,1		redovno
			7,4				gazdovanje.
			33,3				
			35,8				
			20,7				
2,5	1,9	1,6	208,3	148	4,1	2,9	
							Osnovna namena:
							nacionalni park
							- III stepen
							zaštite.
							Osnovna namena:
							nacionalni park
							- III stepen
							zaštite.

hektaru eta				zaprem. na celoj povrsini	tekuci prirast na ha	 na cel pov.	Primedba
4	5	6	svega				
25	26	27	28	29	30	31	32
3,0	1,0		9,6	82	2,4	2,1	Osnovna namena:
0,6			5,5	70	1,4	1,2	nacionalni park
			16,3	28	0,5	0,4	- II stepen
			46,4	3	0,2	0,2	zaštite.
			33,2	1			Sastojina za
			47,4				redovno
			13,6				gazdovanje.
			38,6				
3,6	1,0		210,7	183	4,5	3,9	
	2,1		12,5	134	1,3	2,3	Osnovna namena:
1,0	0,6		18,2	43	1,2	2,2	nacionalni park
			6,1	24	0,2	0,4	- II stepen
			9,2	18	0,3	0,5	zaštite.
			7,5	5	0,1	0,2	Sastojina za
8,7			55,2				redovno
			14,8				gazdovanje.
9,8	2,7		123,5	222	3,1	5,7	
0,4	2,0	1,2	11,1	566	3,0	13,0	Osnovna namena:

ОПИС СТАНИШТА И САСТОЈИНА

hektaru				zaprem.	tekuci prirast		
eta			svega	na celoj	na	na cel	Primedba
4	5	6		povrsini	ha	pov.	
25	26	27	28	29	30	31	32
2,0	2,5	0,3	13,6	367	2,0	8,4	nacionalni park
4,4	1,1		11,0	307	2,0	8,4	- II stepen
	4,5		29,0	29	0,2	1,0	zaštite.
		2,8	46,1	43	0,2	0,8	Sastojina za
			81,0	19	0,2	0,7	redovno
			55,1				gazdovanje.
			30,6				
			30,9				
			4,7				
6,8	10,1	4,4	313,1	1331	7,6	32,2	

ОПИС СТАНИШТА И САСТОЈИНА

hektaru eta				zaprem. na celoj	tekuci prirast		Primedba
			svega	povrsini	na ha	na cel pov.	
4	5	6	28	29	30	31	32
25	26	27					
			1,8	56	2,6	1,2	Osnovna namena:
			3,5	21	1,0	0,5	nacionalni park
			11,8	21	1,1	0,5	- II stepen
			25,8	17	0,4	0,2	zaštite.
			24,2				Sastojina za
			51,8				redovno
			59,5				gazdovanje.
			15,5				
			23,5				
38,4			38,4				
38,4			255,7	115	5,2	2,3	
0,5	0,1		4,9	130	3,0	2,8	Osnovna namena:
			1,2	89	2,3	2,1	nacionalni park
			8,3	0			- II stepen
			15,6	0			zaštite.
			18,7	0			Sastojina za
			75,0				redovno
			88,6				gazdovanje.
			10,0				
			16,6				
0,5	0,1		238,8	220	5,4	4,9	
			0,4	105	1,8	1,9	Osnovna namena:

ОПИС СТАНИШТА И САСТОЈИНА

hektaru				zaprem.	tekuci prirast		Primedba
eta			svega	na celoj	na	na cel	
4	5	6		povrsini	ha	pov.	
25	26	27	28	29	30	31	32
	2,8		4,9	139	2,7	2,9	nacionalni park
	3,0		10,7	21	0,2	0,2	- II stepen
	4,9		17,7	17	0,2	0,2	zaštite.
	9,6		58,1	22	0,3	0,4	Sastojina za
			50,1	8	0,1	0,1	redovno
		7,1	74,7				gazdovanje.
			40,7				
16,2			16,2				
			19,9				
16,2	20,3	7,1	293,3	311	5,4	5,7	

hektaru				zaprem.	tekuci prirast		Primedba
eta			svega	na celoj	na	na cel	
4	5	6		povrsini	ha	pov.	
25	26	27	28	29	30	31	32
1,1	0,3	1,6	6,8	3195	4,6	57,2	Osnovna namena:
4,1	0,8	1,0	9,1	1528	2,3	28,0	nacionalni park
2,0	0,9	1,2	7,0	455	1,1	13,3	- II stepen
2,1	2,2		14,7	115	0,4	4,7	zaštite.
	3,6		20,4	96	0,2	1,9	Sastojina za
			32,4	47	0,1	1,8	redovno
			50,2				gazdovanje.
			86,1				
			89,9				
			55,4				
			33,1				
			8,5				
			23,6				
9,3	7,7	3,8	437,3	5436	8,6	106,9	
0,4	0,2		7,7	536	6,8	17,0	Osnovna namena:
			12,8	202	2,0	5,1	nacionalni park
3,3	1,1		57,1	21	0,3	0,7	- III stepen
			56,2	9	0,1	0,2	zaštite.
			74,0	3		0,1	Sastojina za
			55,9				redovno
			31,0				gazdovanje.
			13,6				
3,7	1,4		308,5	771	9,3	23,2	
0,1	0,1	0,2	3,8	190	3,7	3,7	Osnovna namena:
			0,3	128	1,7	1,7	nacionalni park
			1,2	18	0,2	0,2	- III stepen

hektaru eta				zaprem. na celoj povrsini	tekuci prirast na ha	 na cel pov.	Primedba
4	5	6	svega				
25	26	27	28	29	30	31	32
			10,6	0			zaštite.
			3,0	0			Sastojina za
			18,7	0			redovno
			24,4				gazdovanje.
			46,3				Uzg.pot.
			70,8				obnavljanje.
			48,3				Seca: oplodna
			18,3				seca kratkog
			26,5				perioda za
			33,8				obnavljanje
			31,3				oplodna seca
0,1	0,1	0,2	337,3	337	5,6	5,6	(oplodni sek)
							kratkog perioda
							za obnavljanje.

ОПИС СТАНИШТА И САСТОЈИНА

hektaru eta				zaprem. na celoj	tekuci prirast		Primedba
			svega	povrsini	na ha	na cel pov.	
4	5	6	28	29	30	31	32
0,1			5,0	59	2,2	0,8	Osnovna namena:
			5,4	18	1,3	0,5	nacionalni park
			6,7	3	0,2	0,1	- III stepen
			8,7				zaštite.
			30,1				Sastojina za
			18,6				redovno
			72,6				gazdovanje.
			68,8				Uzg.pot.
0,1			216,1	80	3,7	1,4	obnavljanje.
							Seca: oplodna
							seca kratkog
							perioda za
							obnavljanje
							oplodna seca
							(završni sek)
							kratkog perioda
							za obnavljanje.
1,3	0,1	0,1	5,2	2147	4,2	38,4	Osnovna namena:
1,6			5,3	981	2,2	20,4	nacionalni park
5,5			7,9	597	1,6	14,9	- III stepen
5,3			13,9	220	0,5	4,6	zaštite.
4,2			23,5	59	0,1	1,0	Sastojina za
3,7			60,8	1			redovno
2,7	6,5		80,3				gazdovanje.
			71,6				Uzg.pot.
			62,9				obnavljanje.
			43,9				Seca: oplodna
			40,1				seca kratkog
			25,7				perioda za
24,2	6,5	0,1	441,1	4005	8,7	79,4	obnavljanje
							oplodna seca
							(pripremni sek)
							kratkog perioda
							za obnavljanje.

ОПИС СТАНИШТА И САСТОЈИНА

hektaru eta				zaprem. na celoj povrsini	tekuci prirast na ha	 na cel pov.	Primedba
4	5	6	svega				
25	26	27	28	29	30	31	32

ОПИС СТАНИШТА И САСТОЈИНА

hektaru eta				zaprem. na celoj povrsini	tekuci prirast na ha	tekuci prirast na cel pov.	Primedba
4	5	6	svega				
25	26	27	28	29	30	31	32
2,8	0,6	1,1	7,8	1453	3,5	23,2	Osnovna namena:
6,6		0,3	8,9	348	0,7	4,7	nacionalni park
0,8		0,8	3,9	252	0,9	5,7	- III stepen
1,6			6,0	127	0,6	4,1	zaštite.
2,4			5,4	45	0,3	2,0	Sastojina za
			20,0	15	0,1	0,6	redovno
5,1			54,1				gazdovanje.
			64,4				
			44,4				
	6,2		82,1				
			24,5				
			17,9				
19,2	6,8	2,2	339,3	2240	6,1	40,3	
							Osnovna namena:
							nacionalni park
							- III stepen
							zaštite.
							Osnovna namena:
							nacionalni park
							- III stepen
							zaštite.
							Osnovna namena:
							nacionalni park
							- III stepen
							zaštite.
							Osnovna namena:
							nacionalni park
							- III stepen
							zaštite.
							Osnovna namena:
							nacionalni park
							- III stepen
							zaštite.
0,2	1,0	0,5	9,5	226	4,3	4,8	Osnovna namena:

ОПИС СТАНИШТА И САСТОЈИНА

hektaru				zaprem.	tekuci prirast		Primedba
eta				na celoj	na	na cel	
4	5	6	svega	povrsini	ha	pov.	
25	26	27	28	29	30	31	32
			16,2	137	3,0	3,4	nacionalni park
2,3			13,0	3	0,1	0,1	- II stepen
			52,6	3			zaštite.
			36,8	1			Sastojina za
			125,0	1			redovno
			43,5				gazdovanje.
			33,4				
2,5	1,0	0,5	329,9	370	7,5	8,4	

hektaru eta				zaprem. na celoj povrsini	tekuci prirast na ha	tekuci prirast na cel pov.	Primedba
4	5	6	svega				
25	26	27	28	29	30	31	32
	0,3		2,4	439	4,3	7,4	Osnovna namena:
0,5			2,9	72	0,8	1,4	nacionalni park
1,1			8,1	28	0,4	0,6	- II stepen
2,4			9,7	21	0,2	0,3	zaštite.
8,1			19,4	1			Sastojina za
			51,5				redovno
			59,2				gazdovanje.
			23,0				
			77,3				
			47,3				
			21,1				
12,2	0,3		322,0	560	5,6	9,7	
0,1	0,3	0,6	4,9	1700	3,5	28,4	Osnovna namena:
0,2		0,2	4,8	838	2,4	19,0	nacionalni park
	0,4		4,7	261	0,6	4,7	- II stepen
			9,9	99	0,3	2,1	zaštite.
			13,2	5		0,1	Sastojina za
			44,8	6		0,4	redovno
			66,4				gazdovanje.
			92,1				Uzg.pot.
			68,9				obnavljanje.
12,1			26,2				Seca: oplodna
			21,6				seca kratkog
			5,9				perioda za
12,3	0,7	0,7	363,4	2907	6,8	54,6	obnavljanje
							oplodna seca
							(pripremni sek)
							kratkog perioda
							za obnavljanje.
3,7			14,1	38	3,9	1,5	Osnovna namena:
			31,1	40	2,0	0,8	nacionalni park
3,6	4,3		17,9	3	0,4	0,1	- III stepen
			41,4	3	0,2	0,1	zaštite.
			40,1	2	0,1		Sastojina za

ОПИС СТАНИШТА И САСТОЈИНА

hektaru				zaprem.	tekuci prirast		Primedba
eta			svega	na celoj	na	na cel	
4	5	6		povrsini	ha	pov.	
25	26	27	28	29	30	31	32
			77,5				redovno
7,3	4,3		222,0	87	6,7	2,6	gazdovanje.

ОПИС СТАНИШТА И САСТОЈИНА

hektaru				zaprem.	tekuci prirast		Primedba
eta			svega	na celoj povrsini	na ha	na cel pov.	
4	5	6					
25	26	27	28	29	30	31	32
1,0	0,9	0,8	3,7	460	2,7	7,8	Osnovna namena:
0,6	1,2	2,0	6,7	515	3,2	9,1	nacionalni park
0,5	11,6	4,4	20,0	37	0,5	1,3	- III stepen
	2,3		5,7	45	0,4	1,2	zaštite.
		9,7	24,4	46	0,6	1,7	Sastojina za
			63,5	49	0,3	1,0	redovno
3,2			69,3				gazdovanje.
10,3			144,1				Uzg.pot.
			20,2				obnavljanje.
			31,6				Seca: oplodna
			13,0				seca kratkog
15,6	16,0	17,0	402,3	1151	7,7	22,0	perioda za
							obnavljanje
							oplodna seca
							(oplodni sek)
							kratkog perioda
							za obnavljanje.
0,1	0,4	0,4	3,2	255	2,1	4,5	Osnovna namena:
	0,6	1,6	3,0	200	1,9	4,1	nacionalni park
1,2	5,2		14,4	126	0,7	1,6	- III stepen
	7,1		11,9	74	0,7	1,4	zaštite.
		2,2	10,9	46	0,6	1,4	Sastojina za
5,5	7,7		32,0	9	0,2	0,4	redovno
4,8			73,5				gazdovanje.
6,0			108,9				
7,3			30,1				
8,8			36,2				
33,7	21,0	4,1	324,2	710	6,2	13,5	
1,7		0,3	8,1	845	4,0	12,9	Osnovna namena:
1,6		0,7	10,1	170	1,4	4,6	nacionalni park
	0,5	1,3	16,5	86	0,6	2,1	- III stepen
1,2	1,7		8,6	15	0,2	0,6	zaštite.

ОПИС СТАНИШТА И САСТОЈИНА

hektaru				zaprem.	tekuci prirast		Primedba
eta				na celoj	na	na cel	
4	5	6	svega	povrsini	ha	pov.	
25	26	27	28	29	30	31	32
			12,6	7	0,1	0,2	Sastojina za
			28,5	8	0,1	0,3	redovno
			19,5				gazdovanje.
			34,4				
			80,6				
			63,5				
			33,9				
			35,6				
4,5	2,3	2,3	352,0	1130	6,5	20,7	

ОПИС СТАНИШТА И САСТОЈИНА

hektaru eta				zaprem. na celoj	tekuci prirast		Primedba
			svega	povrsini	na ha	na cel pov.	
4	5	6	28	29	30	31	32
0,3	0,7		4,5	42	1,5	1,5	Osnovna namena:
1,7	1,9		11,2	63	1,0	1,0	nacionalni park
			14,3	20	0,6	0,6	- III stepen
5,5			23,1	14	0,2	0,2	zaštite.
6,7			27,9	3	0,1	0,1	Sastojina za
			16,1				redovno
			43,8				gazdovanje.
14,2	2,7		141,0	141	3,4	3,4	
							Osnovna namena:
							nacionalni park
							- III stepen
							zaštite.
							Osnovna namena:
							nacionalni park
							- III stepen
							zaštite.
							Osnovna namena:
							nacionalni park
							- III stepen
							zaštite.
0,3	1,5	0,4	5,3	302	2,8	5,0	Osnovna namena:
0,6	1,4	0,6	7,2	115	1,5	2,6	nacionalni park
1,8			7,8	66	1,0	1,7	- II stepen
		3,1	8,8	9	0,2	0,3	zaštite.
2,2			9,0	5	0,1	0,2	Sastojina za
			10,2	7	0,1	0,2	redovno
			25,0				gazdovanje.
			30,7				Uzg.pot.
			16,7				obnavljanje.
			22,4				Seca: oplodna
			76,0				seca kratkog
			15,1				perioda za
			48,8				obnavljanje
4,9	2,9	4,1	283,1	504	5,6	10,1	oplodna seca
							(oplodni sek)
							kratkog perioda
							za obnavljanje.

ОПИС СТАНИШТА И САСТОЈИНА

hektaru				zaprem.	tekuci prirast		
eta				na celoj	na	na cel	Primedba
4	5	6	svega	povrsini	ha	pov.	
25	26	27	28	29	30	31	32
							Osnovna namena:
							nacionalni park
							- II stepen
							zaštite.
							Sastojina za
							redovno
							gazdovanje.

hektaru				zaprem.	tekuci prirast		
eta				na celoj	na	na cel	Primedba
4	5	6	svega	povrsini	ha	pov.	
25	26	27	28	29	30	31	32
			2,6	175	3,1	3,4	Osnovna namena:
			9,7	107	2,1	2,3	nacionalni park
			12,0	2	0,1	0,1	- III stepen
			13,3				zaštite.
			44,6				Sastojina za
			14,8				redovno
			50,3				gazdovanje.
			9,7				
			105,8				
			262,8	284	5,3	5,7	
1,7	0,8	0,9	10,0	225	2,5	5,0	Osnovna namena:
2,8	1,7	0,6	9,6	188	2,3	4,5	nacionalni park
			6,4	96	1,0	2,1	- III stepen
			21,1	9	0,1	0,2	zaštite.
			30,2	5	0,1	0,2	Sastojina za
			76,2	3	0,1	0,1	redovno
			26,0				gazdovanje.
			47,8				
			37,1				
4,5	2,5	1,6	264,3	526	6,1	12,1	

ОПИС СТАНИШТА И САСТОЈИНА

hektaru				zaprem.	tekuci prirast		
eta			svega	na celoj	na	na cel	Primedba
4	5	6		povrsini	ha	pov.	
25	26	27	28	29	30	31	32
							Osnovna namena:
							nacionalni park
							- II stepen
							zaštite.

ОПИС СТАНИШТА И САСТОЈИНА

hektaru eta				zaprem. na celoj povrsini	tekuci prirast na ha	tekuci prirast na cel pov.	Primedba
4	5	6	svega				
25	26	27	28	29	30	31	32
	0,1	0,1	2,1	992	2,8	16,2	Osnovna namena:
			1,3	568	2,0	11,4	nacionalni park
			1,6	407	1,2	6,9	- III stepen
0,9			3,4	61	0,1	0,6	zaštite.
1,8			11,7	58	0,3	1,6	Sastojina za
			18,8	20	0,1	0,6	redovno
3,2		3,3	44,8				gazdovanje.
			51,0				Uzg.pot.
4,6			66,3				obnavljanje.
			90,0				Seca: oplodna
	10,0		35,3				seca kratkog
			29,4				perioda za
			10,5				obnavljanje
10,5	10,1	3,5	366,2	2105	6,5	37,2	oplodna seca
							(oplodni sek)
							kratkog perioda
							za obnavljanje.
0,4	0,3	0,4	4,6	263	2,3	5,4	Osnovna namena:
2,0			5,1	69	0,6	1,5	nacionalni park
2,0	1,0		9,5	50	0,2	0,5	- III stepen
2,1	3,4		20,4	39	0,2	0,4	zaštite.
6,4			33,5	37	0,4	0,9	Sastojina za
4,2	3,9	5,4	60,7	13	0,2	0,5	redovno
			12,0				gazdovanje.
	7,3		14,8				
			11,4				
			15,7				
			18,3				
17,1	16,0	5,8	205,7	471	4,0	9,1	

ОПИС СТАНИШТА И САСТОЈИНА

hektaru eta				zaprem. na celoj povrsini	tekuci prirast na ha	 na cel pov.	Primedba
4	5	6	svega				
25	26	27	28	29	30	31	32

hektaru				zaprem.	tekuci prirast		Primedba
eta			svega	na celoj povrsini	na ha	na cel pov.	
4	5	6	28	29	30	31	32
4,2	1,7	1,7	17,5	51	0,6	0,7	Osnovna namena:
0,8			11,6	54	2,3	2,6	nacionalni park
			13,3	11	0,3	0,3	- III stepen
			20,1	6	0,2	0,2	zaštite.
			2,6	2			Sastojina za
			43,1	2	0,1	0,1	redovno
5,0	1,7	1,7	108,3	126	3,5	4,0	gazdovanje.
							Uzg.pot.
							proreda. Seca:
							proredna seca
							selektivna proreda.
			4,7	755	5,3	13,4	Osnovna namena:
			8,2	20	0,3	0,8	nacionalni park
			13,2	28	0,2	0,4	- III stepen
			44,1				zaštite.
			49,5				Sastojina za
			77,0				redovno
			61,2				gazdovanje.
			27,7				
			32,7				
			318,4	802	5,8	14,6	
	0,1		2,2	222	3,6	3,3	Osnovna namena:
			0,8	90	1,5	1,4	nacionalni park
2,3			3,1	20	0,7	0,6	- III stepen
			1,7	2			zaštite.

ОПИС СТАНИШТА И САСТОЈИНА

hektaru				zaprem.	tekuci prirast		Primedba
eta			svega	na celoj	na	na cel	
4	5	6		povrsini	ha	pov.	
25	26	27	28	29	30	31	32
			5,4	0			Sastojina za
			23,2				redovno
			91,2				gazdovanje.
			29,8				Uzg.pot.
			72,4				obnavljanje.
			51,8				Seca: oplodna
			89,6				seca kratkog
2,3	0,1		371,2	334	5,9	5,3	perioda za
							obnavljanje
							oplodna seca
							(završni sek)
							kratkog perioda
							za obnavljanje.

ОПИС СТАНИШТА И САСТОЈИНА

hektaru eta				zaprem. na celoj povrsini	tekuci prirast na ha	tekuci prirast na cel pov.	Primedba
4	5	6	svega				
25	26	27	28	29	30	31	32
	0,8	1,6	3,1	110	1,4	1,9	Osnovna namena:
		2,9	6,1	56	1,1	1,6	nacionalni park
4,7		2,8	12,1	57	0,9	1,2	- III stepen
10,5	5,5	6,7	38,5	55	0,5	0,7	zaštite.
7,8		11,0	49,5	54	0,9	1,3	Sastojina za
	12,9		48,0	35	1,0	1,4	redovno
16,6	19,8		73,0				gazdovanje.
			33,8				
39,6	39,0	24,9	264,1	367	5,8	8,1	
4,2	1,5		9,7	128	9,9	9,0	Osnovna namena:
4,1			23,9	41	0,9	0,8	nacionalni park
			69,6	43	0,7	0,6	- III stepen
			92,4	8	0,1	0,1	zaštite.
			47,2	1	0,1	0,1	Sastojina za
8,3	1,5		242,9	221	11,7	10,7	redovno
							gazdovanje.
							Uzg.pot.
							proreda. Seca:
							proredna seca
							selektivna proreda.
1,2	0,4	0,6	14,9	320	5,3	13,6	Osnovna namena:
1,0			30,0	51	0,5	1,3	nacionalni park
			40,1	45	0,5	1,3	- III stepen
			40,1	24	0,2	0,5	zaštite.
7,1			40,6	1			Sastojina za
			8,5	2			redovno
9,2	0,4	0,6	174,2	442	6,6	16,8	gazdovanje.
							Uzg.pot.

ОПИС СТАНИШТА И САСТОЈИНА

hektaru				zaprem.	tekuci prirast		
eta				na celoj	na	na cel	Primedba
4	5	6	svega	povrsini	ha	pov.	
25	26	27	28	29	30	31	32
							proreda. Seca:
							proredna seca
							selektivna proreda.

ОПИС СТАНИШТА И САСТОЈИНА

hektaru eta				zaprem. na celoj	tekuci prirast na	 na cel	Primedba
4	5	6	svega	povrsini	ha	pov.	
25	26	27	28	29	30	31	32
			14,7	17	3,5	0,6	Osnovna namena:
8,9			37,1	4	0,7	0,1	nacionalni park
			9,2	2	0,6	0,1	- III stepen
			93,9	1	0,3		zaštite.
8,9			154,9	25	5,1	0,8	Sastojina za
							redovno
							gazdovanje.
							Uzg.pot.
							proreda. Seca:
							proredna seca
							selektivna proreda.
			5,7	337	7,4	15,4	Osnovna namena:
			22,6	2		0,1	nacionalni park
			47,0	1			- III stepen
			39,4				zaštite.
			5,2				Sastojina za
			12,7				redovno
			4,7				gazdovanje.
			27,1				Uzg.pot.
			164,4	340	7,5	15,5	proreda. Seca:
							proredna seca
							selektivna proreda.
			1,8	44	3,3	0,7	Osnovna namena:
			2,6	6	0,4	0,1	nacionalni park
			3,1	1	0,1		- III stepen
			13,7				zaštite.
			30,9				Sastojina za
			18,6				redovno
			126,8				gazdovanje.
			32,5				Uzg.pot.
			230,0	51	3,8	0,8	proreda. Seca:
							proredna seca
							selektivna proreda.

ОПИС СТАНИШТА И САСТОЈИНА

hektaru eta				zaprem. na celoj	tekuci prirast na	 na cel	Primedba
4	5	6	svega	povrsini	ha	pov.	
25	26	27	28	29	30	31	32
			10,3	9	4,2	0,4	Osnovna namena:
			19,8	2	0,4		nacionalni park
			34,4	0			- III stepen
			15,4				zaštite.
			16,5				Sastojina za
			9,7				redovno
			106,2	11	4,6	0,5	gazdovanje.

hektaru				zaprem.	tekuci prirast		Primedba
eta			svega	na celoj	na	na cel	
4	5	6		povrsini	ha	pov.	
25	26	27	28	29	30	31	32
			1,7	44	5,8	2,6	Osnovna namena:
			47,9	47	3,2	1,4	nacionalni park
			79,3	15	1,5	0,7	- III stepen
			78,6				zaštite.
			29,7				Sastojina za
			237,3	107	10,5	4,7	redovno
							gazdovanje.
							Osnovna namena:
							nacionalni park
							- III stepen
							zaštite.
							Osnovna namena:
							nacionalni park
							- III stepen
							zaštite.
							Osnovna namena:
							nacionalni park
							- III stepen
							zaštite.
							Osnovna namena:
							nacionalni park
							- III stepen
							zaštite.
							Osnovna namena:
							nacionalni park
							- III stepen
							zaštite.
							Osnovna namena:
							nacionalni park
							- III stepen

hektaru eta				zaprem. na celoj povrsini	tekuci prirast na ha	tekuci prirast na cel pov.	Primedba
4	5	6	svega				
25	26	27	28	29	30	31	32
							zaštite.
		0,1	0,3	161	1,3	1,7	Osnovna namena:
			1,0	48	0,4	0,6	nacionalni park
		0,9	3,9	49	0,7	0,9	- III stepen
	1,3		7,2	18	0,2	0,3	zaštite.
4,9			21,1	14	0,2	0,3	Sastojina za
	4,1		26,5	1			redovno
	5,1		35,8				gazdovanje.
7,9			54,9				Uzg.pot.
			32,7				obnavljanje.
			13,7				Seca: oplodna
			14,9				seca kratkog
12,8	10,4	1,0	212,0	291	2,9	3,9	perioda za
							obnavljanje
							oplodna seca
							(završni sek)
							kratkog perioda
							za obnavljanje.

ОПИС СТАНИШТА И САСТОЈИНА

hektaru eta				zaprem. na celoj	tekuci prirast na	 na cel	Primedba
4	5	6	svega	povrsini	ha	pov.	
25	26	27	28	29	30	31	32
1,0	1,9	1,0	19,8	213	3,3	11,0	Osnovna namena:
3,6			29,3	208	1,7	5,8	nacionalni park
4,6			27,2	43	0,5	1,5	- III stepen
2,7			13,2	40	0,5	1,7	zaštite.
			3,0	6	0,1	0,2	Sastojina za
			20,3	3		0,1	redovno
			40,7				gazdovanje.
11,9	1,9	1,0	153,5	513	6,1	20,4	
0,1	0,3	0,6	3,4	81	2,9	1,7	Osnovna namena:
			12,3	64	2,4	1,4	nacionalni park
4,0	1,2		19,7	14	0,4	0,2	- III stepen
			9,0	2	0,1	0,1	zaštite.
			20,6	1	0,1		Sastojina za
			51,2	0			redovno
			31,8				gazdovanje.
			29,2				
			42,1				
			60,5				
4,1	1,6	0,6	279,7	162	5,9	3,4	
			0,6	109	4,8	1,8	Osnovna namena:
			4,4	5	0,2	0,1	nacionalni park
			12,2	1	0,1		- III stepen
			61,5				zaštite.
			101,1				Sastojina za
			95,6				redovno
			28,4				gazdovanje.
			303,8	116	5,1	1,9	Uzg.pot.
							proreda. Seca:

ОПИС СТАНИШТА И САСТОЈИНА

hektaru				zaprem.	tekuci prirast		
eta				na celoj	na	na cel	Primedba
4	5	6	svega	povrsini	ha	pov.	
25	26	27	28	29	30	31	32
							proredna seca
							selektivna proreda.

ОПИС СТАНИШТА И САСТОЈИНА

hektaru eta				zaprem. na celoj	tekuci prirast		Primedba
			svega	povrsini	na ha	na cel pov.	
4	5	6	28	29	30	31	32
	0,1	0,2	0,8	325	1,9	5,4	Osnovna namena:
	0,2		0,4	207	1,2	3,3	nacionalni park
			1,3	182	0,7	1,9	- III stepen
			4,7	97	0,6	1,6	zaštite.
1,2	4,5		21,7	13	0,1	0,4	Sastojina za
3,1			45,3	1			redovno
6,5			67,5				gazdovanje.
			58,6				Uzg.pot.
8,8			77,3				obnavljanje.
9,0			9,0				Seca: oplodna
6,0			6,0				seca kratkog
34,5	4,7	0,2	292,6	825	4,4	12,5	perioda za
							obnavljanje
							oplodna seca
							(oplodni sek)
							kratkog perioda
							za obnavljanje.
5,1		0,2	12,6	1042	2,5	24,5	Osnovna namena:
2,3	0,4	0,7	8,2	832	1,8	17,3	nacionalni park
2,8	0,5		10,4	397	0,7	6,8	- III stepen
1,9			23,6	133	0,3	2,6	zaštite.
1,8	3,8	1,6	42,3	79	0,2	2,0	Sastojina za
	3,6	2,5	77,5	48	0,1	1,3	redovno
			29,5				gazdovanje.
			25,7				
			13,5				
			19,4				
13,8	8,2	5,0	262,7	2530	5,7	54,4	
	3,4	2,9	26,6	124	1,9	3,2	Osnovna namena:

ОПИС СТАНИШТА И САСТОЈИНА

hektaru				zaprem.	tekuci prirast		Primedba
eta			svega	na celoj	na	na cel	
4	5	6		povrsini	ha	pov.	
25	26	27	28	29	30	31	32
1,8	4,7	3,8	30,3	55	1,2	2,1	nacionalni park
			42,8	18	0,3	0,4	- III stepen
			33,2	25	0,6	1,1	zaštite.
12,7			12,7	14	0,2	0,4	Sastojina za
				11	0,3	0,6	redovno
14,5	8,2	6,7	145,6	248	4,6	7,8	gazdovanje.
							Uzg.pot.
							proreda. Seca:
							proredna seca
							selektivna proreda.

ОПИС СТАНИШТА И САСТОЈИНА

hektaru eta				zaprem. na celoj povrsini	tekuci prirast		Primedba
			svega		na ha	na cel pov.	
4	5	6	28	29	30	31	32
0,3	0,6	0,4	12,5	355	1,8	9,2	Osnovna namena:
			16,8	301	1,7	8,5	nacionalni park
			8,3	52	0,2	0,9	- III stepen
			14,1	42	0,2	1,2	zaštite.
			12,2	3		0,1	Sastojina za
			29,8	2		0,1	redovno
			40,2				gazdovanje.
8,0			14,4				
8,3	0,6	0,4	148,4	755	3,9	20,0	
			17,4	86	3,4	4,0	Osnovna namena:
	1,7		55,4	58	2,1	2,5	nacionalni park
4,3			45,5	38	0,5	0,6	- III stepen
			8,9	5	0,1	0,1	zaštite.
			31,9	2		0,1	Sastojina za
4,3	1,7		159,1	189	6,2	7,3	redovno
							gazdovanje.
8,6			39,2	22	2,6	1,3	Osnovna namena:
	3,8		24,3	16	1,1	0,5	nacionalni park
			13,6	12	1,2	0,6	- III stepen
			20,7	4	0,2	0,1	zaštite.
			17,6	2	0,1	0,1	Sastojina za
8,6	3,8		115,4	57	5,2	2,6	redovno
							gazdovanje.

ОПИС СТАНИШТА И САСТОЈИНА

hektaru				zaprem.	tekuci prirast		
eta			svega	na celoj	na	na cel	Primedba
4	5	6		povrsini	ha	pov.	
25	26	27	28	29	30	31	32

hektaru				zaprem.	tekuci prirast		Primedba
eta			svega	na celoj povrsini	na ha	na cel pov.	
4	5	6	28	29	30	31	32
0,4	3,6		17,1	198	2,6	7,3	Osnovna namena:
1,7	2,0	1,3	29,0	172	1,8	5,1	nacionalni park
7,0			47,0	51	0,9	2,5	- III stepen
7,5			32,8	46	0,5	1,5	zaštite.
			34,1	16	0,1	0,4	Sastojina za
			13,5	4		0,1	redovno
16,6	5,6	1,3	173,6	486	6,0	16,8	gazdovanje.
							Uzg.pot.
							proreda. Seca:
							proredna seca
							selektivna proreda.
	5,0		15,7	16	1,4	0,5	Osnovna namena:
			21,0	23	2,1	0,8	nacionalni park
			78,5	16	1,2	0,4	- III stepen
8,4			39,9	3	0,2	0,1	zaštite.
			10,7	2	0,1		Sastojina za
8,4	5,0		165,9	60	5,0	1,8	redovno
							gazdovanje.
0,9	1,1	0,3	11,6	184	5,0	4,8	Osnovna namena:
			1,6	40	1,3	1,2	nacionalni park
			46,6	21	0,6	0,5	- III stepen
			81,5	1			zaštite.
			70,9	1			Sastojina za

ОПИС СТАНИШТА И САСТОЈИНА

hektaru				zaprem.	tekuci prirast		
eta			svega	na celoj	na	na cel	Primedba
4	5	6		povrsini	ha	pov.	
25	26	27	28	29	30	31	32
			48,0	0			redovno
0,9	1,1	0,3	260,2	247	6,9	6,6	gazdovanje.

ОПИС СТАНИШТА И САСТОЈИНА

hektaru				zaprem.	tekuci prirast		Primedba
eta			svega	na celoj	na	na cel	
4	5	6		povrsini	ha	pov.	
25	26	27	28	29	30	31	32
			0,4	28	4,0	1,4	Osnovna namena:
			5,8				nacionalni park
			20,7				- III stepen
			35,1				zaštite.
			5,9				Sastojina za
			10,7				redovno
			78,7	28	4,0	1,4	gazdovanje.
			12,6	122	8,7	5,7	Osnovna namena:
			46,2	6	0,3	0,2	nacionalni park
			84,3	5	0,1		- III stepen
			30,1				zaštite.
			28,2				Sastojina za
			201,4	133	9,1	6,0	redovno
							gazdovanje.
0,3	0,2	2,5	7,9	94	1,1	1,2	Osnovna namena:
0,9			4,1	29	0,6	0,7	nacionalni park
	1,1		4,6	40	1,0	1,1	- III stepen
			4,7	88	1,6	1,8	zaštite.
			12,8	2		0,1	Sastojina za
			4,0	3	0,1	0,2	redovno
			36,7				gazdovanje.
			38,4				
			21,4				
			12,1				
75,6			75,6				
76,8	1,3	2,5	222,3	256	4,4	5,1	

ОПИС СТАНИШТА И САСТОЈИНА

hektaru				zaprem.	tekuci prirast		
eta			svega	na celoj	na	na cel	Primedba
4	5	6		povrsini	ha	pov.	
25	26	27	28	29	30	31	32

ОПИС СТАНИШТА И САСТОЈИНА

hektaru eta				zaprem. na celoj	tekuci prirast		Primedba
			svega	povrsini	na ha	na cel pov.	
4	5	6	28	29	30	31	32
			11,5	275	6,1	8,6	Osnovna namena:
			21,5	57	1,0	1,4	nacionalni park
			28,7				- III stepen
			75,4				zaštite.
			37,4				Sastojina za
			47,5				redovno
			14,5				gazdovanje.
			236,5	331	7,1	10,0	Uzg.pot.
							proreda. Seca:
							proredna seca
							selektivna proreda.
	1,3		2,3	204	5,0	6,0	Osnovna namena:
1,6			14,7	24	0,5	0,5	nacionalni park
			33,1	3	0,1	0,1	- III stepen
			47,6	2		0,1	zaštite.
			37,1	2			Sastojina za
			36,5				redovno
			23,6				gazdovanje.
1,6	1,3		194,9	234	5,6	6,7	Uzg.pot.
							proreda. Seca:
							proredna seca
							selektivna proreda.
			1,3	101	5,4	3,6	Osnovna namena:
			3,1	43	1,4	0,9	nacionalni park
			38,2				- III stepen
			46,0				zaštite.
			78,9				Sastojina za
			20,3				redovno
			12,4				gazdovanje.
			17,2				
			217,3	143	6,9	4,5	

ОПИС СТАНИШТА И САСТОЈИНА

hektaru				zaprem.	tekuci prirast		
eta			svega	na celoj	na	na cel	Primedba
4	5	6		povrsini	ha	pov.	
25	26	27	28	29	30	31	32

ОПИС СТАНИШТА И САСТОЈИНА

hektaru				zaprem.	tekuci prirast		
eta			svega	na celoj	na	na cel	Primedba
4	5	6		povrsini	ha	pov.	
25	26	27	28	29	30	31	32
0,5		2,0	3,4	148	2,4	3,4	Osnovna namena:
13,0	1,8	0,8	15,6	70	0,9	1,3	nacionalni park
2,0			2,0	34	0,6	0,9	- III stepen
	2,7		38,8	22	0,5	0,6	zaštite.
			68,6	6	0,1	0,1	Sastojina za
			74,0	4	0,1	0,1	redovno
15,5	4,5	2,8	202,4	283	4,6	6,4	gazdovanje.
							Osnovna namena:
							nacionalni park
							- III stepen
							zaštite.
							Osnovna namena:
							nacionalni park
							- III stepen
							zaštite.
							Osnovna namena:
							nacionalni park
							- III stepen
							zaštite.
							Osnovna namena:
							nacionalni park
							- III stepen
							zaštite.
							Osnovna namena:
							nacionalni park

hektaru eta				zaprem. na celoj povrsini	tekuci prirast na ha	 na cel pov.	Primedba
4	5	6	svega				
25	26	27	28	29	30	31	32
							- III stepen
							zaštite.
							Osnovna namena:
							nacionalni park
							- III stepen
							zaštite.

ОПИС СТАНИШТА И САСТОЈИНА

hektaru eta				zaprem. na celoj povrsini	tekuci prirast		Primedba
			svega		na ha	na cel pov.	
4	5	6	28	29	30	31	32
1,9		0,7	7,7	3124	4,1	55,2	Osnovna namena:
2,9	0,4		10,4	310	0,6	8,6	nacionalni park
3,8	0,9	1,3	16,6	209	0,4	6,0	- II stepen
	4,6		16,4	115	0,2	2,3	zaštite.
			12,0	156	0,3	3,7	Sastojina za
	5,7		44,1	27	0,1	1,5	redovno
			67,8				gazdovanje.
			104,1				
			13,9				
8,5	11,6	2,0	293,0	3941	5,7	77,3	
2,3	0,1	0,2	5,8	506	3,5	8,6	Osnovna namena:
1,4			6,3	176	1,7	4,2	nacionalni park
			7,1	33	0,4	0,9	- II stepen
			14,1	9	0,1	0,3	zaštite.
			24,7	0			Sastojina za
			13,1	1			redovno
			60,4				gazdovanje.
			89,7				Uzg.pot.
			36,3				obnavljanje.
			34,6				Seca: oplodna
3,7	0,1	0,2	292,1	725	5,7	14,1	seca kratkog
							perioda za
							obnavljanje
							oplodna seca
							(završni sek)
							kratkog perioda
							za obnavljanje.
4,2	2,4	1,9	11,4	74	2,5	1,5	Osnovna namena:
			5,6	26	1,0	0,6	nacionalni park
6,2			18,5	9	0,5	0,3	- II stepen
			14,9	6	0,3	0,2	zaštite.
			11,0	2	0,1		Sastojina za

ОПИС СТАНИШТА И САСТОЈИНА

hektaru				zaprem.	tekuci prirast		Primedba
eta				na celoj	na	na cel	
4	5	6	svega	povrsini	ha	pov.	
25	26	27	28	29	30	31	32
			53,5	1	0,1	0,1	redovno
			32,6				gazdovanje.
			43,1				
10,4	2,4	1,9	190,6	118	4,5	2,8	

ОПИС СТАНИШТА И САСТОЈИНА

hektaru				zaprem.	tekuci prirast		Primedba
eta			svega	na celoj	na	na cel	
4	5	6		povrsini	ha	pov.	
25	26	27	28	29	30	31	32
2,5	1,3	2,2	42,3	849	1,8	27,3	Osnovna namena:
4,0	1,9	1,6	30,7	320	0,6	9,7	nacionalni park
5,4		1,2	21,1	164	0,3	4,2	- II stepen
			3,2	179	0,6	9,0	zaštite.
	5,5		17,0	130	0,3	4,3	Sastojina za
				75	0,2	2,3	redovno
11,9	8,6	5,0	114,3	1716	3,8	56,8	gazdovanje.
0,9	1,2	0,4	7,8				Osnovna namena:
	1,0		1,0	78			nacionalni park
			3,3	7			- I stepen
3,7			8,4	6			zaštite.
			7,1	3			Sastojina za
			12,9	1			redovno
			29,8				gazdovanje.
4,5	2,2	0,4	70,3	94			
	2,5		23,0	244	3,0	4,2	Osnovna namena:
		2,3	27,6	99	2,0	2,9	nacionalni park
7,2			25,5	9	0,2	0,2	- III stepen
			12,4	10	0,1	0,2	zaštite.
			47,3	4	0,1	0,1	Sastojina za
			54,3	3	0,1	0,1	redovno

ОПИС СТАНИШТА И САСТОЈИНА

hektaru				zaprem.	tekuci prirast		Primedba
eta			svega	na celoj	na	na cel	
4	5	6		povrsini	ha	pov.	
25	26	27	28	29	30	31	32
			70,0				gazdovanje.
7,2	2,5	2,3	260,1	369	5,5	7,8	

hektaru				zaprem.	tekuci prirast		Primedba
eta				na celoj	na	na cel	
4	5	6	svega	povrsini	ha	pov.	
25	26	27	28	29	30	31	32
			0,5	79	2,4	1,7	Osnovna namena:
			3,2	36	0,8	0,5	nacionalni park
			6,8	9	0,3	0,2	- III stepen
			10,7				zaštite.
			26,6				Sastojina za
			52,7				redovno
			47,7				gazdovanje.
			28,0				
			176,1	123	3,4	2,4	
			2,3	323	5,2	12,3	Osnovna namena:
			16,2				nacionalni park
			24,9				- III stepen
			47,2				zaštite.
			46,2				Sastojina za
			136,8	323	5,2	12,3	redovno
							gazdovanje.
			2,5	246	5,0	9,9	Osnovna namena:
			21,4				nacionalni park
			35,6				- III stepen
			36,4				zaštite.
			27,6				Sastojina za
			123,4	246	5,0	9,9	redovno
							gazdovanje.
			1,4	54	2,7	1,5	Osnovna namena:
			25,0	17	0,8	0,4	nacionalni park
			15,3	21	1,1	0,6	- III stepen
			70,8				zaštite.

ОПИС СТАНИШТА И САСТОЈИНА

hektaru				zaprem.	tekuci prirast		
eta			svega	na celoj	na	na cel	Primedba
4	5	6		povrsini	ha	pov.	
25	26	27	28	29	30	31	32
			54,8				Sastojina za
			167,1	92	4,6	2,5	redovno
							gazdovanje.

hektaru				zaprem.	tekuci prirast		
eta			svega	na celoj	na	na cel	Primedba
4	5	6		povrsini	ha	pov.	
25	26	27	28	29	30	31	32
			18,7	265	7,2	13,1	Osnovna namena:
			38,7				nacionalni park
			88,1				- III stepen
			145,5	265	7,2	13,1	zaštite.
							Sastojina za
							redovno
							gazdovanje.
			15,6	131	7,5	7,0	Osnovna namena:
			29,4				nacionalni park
			47,4				- III stepen
			48,2				zaštite.
			140,5	131	7,5	7,0	Sastojina za
							redovno
							gazdovanje.
			16,0	76	7,1	4,2	Osnovna namena:
			33,8				nacionalni park
			32,7				- III stepen
			47,1				zaštite.
			129,5	76	7,1	4,2	Sastojina za
							redovno
							gazdovanje.
							Osnovna namena:
							nacionalni park
							- III stepen
							zaštite.

hektaru eta				zaprem. na celoj	tekuci prirast		Primedba
			svega	povrsini	na ha	na cel pov.	
4	5	6	28	29	30	31	32
							Osnovna namena:
							nacionalni park
							- III stepen
							zaštite.
							Osnovna namena:
							nacionalni park
							- III stepen
							zaštite.
							Osnovna namena:
							nacionalni park
							- III stepen
							zaštite.
							Osnovna namena:
							nacionalni park
							- III stepen
							zaštite.
							Osnovna namena:
							nacionalni park
							- III stepen
							zaštite.

hektaru				zaprem.	tekuci prirast		Primedba
eta				na celoj	na	na cel	
4	5	6	svega	povrsini	ha	pov.	
25	26	27	28	29	30	31	32
							Osnovna namena:
							nacionalni park
							- II stepen
							zaštite.
							Osnovna namena:
							nacionalni park
							- II stepen
							zaštite.
							Osnovna namena:
							nacionalni park
							- III stepen
							zaštite.
0,5	0,8	0,6	10,0	1849	4,7	30,6	Osnovna namena:
0,7			3,1	189	1,0	6,6	nacionalni park
			1,0	79	0,4	2,4	- II stepen
			3,2	8		0,2	zaštite.
			53,8	6	0,1	0,3	Sastojina za
			41,4	4		0,1	redovno
			59,0				gazdovanje.
			88,8				
			69,1				
1,2	0,8	0,6	329,4	2135	6,2	40,4	

ОПИС СТАНИШТА И САСТОЈИНА

hektaru				zaprem.	tekuci prirast		
eta				na celoj	na	na cel	Primedba
4	5	6	svega	povrsini	ha	pov.	
25	26	27	28	29	30	31	32
							(oplodni i
							završni sek)
							kratkog perioda
							za obnavljanje.

ОПИС СТАНИШТА И САСТОЈИНА

hektaru eta				zaprem. na celoj povrsini	tekuci prirast na ha	tekuci prirast na cel pov.	Primedba
4	5	6	svega				
25	26	27	28	29	30	31	32
1,0			3,1	114	1,8	2,4	Osnovna namena:
			14,1	72	1,0	1,4	nacionalni park
2,4		2,5	30,4	90	1,2	1,6	- II stepen
3,9	5,0		17,1	55	0,9	1,2	zaštite.
6,4			29,1	33	0,5	0,7	Sastojina za
9,8			49,4	3			redovno
17,2	19,6		54,6				gazdovanje.
			73,3				
40,7	24,6	2,5	271,1	369	5,5	7,4	
2,0	1,3	1,6	8,9	762	3,0	17,9	Osnovna namena:
4,5	3,1		11,7	427	1,4	8,4	nacionalni park
			8,0	205	1,0	5,7	- II stepen
			32,0	39	0,1	0,8	zaštite.
			30,3	26	0,1	0,8	Sastojina za
			90,5	10	0,1	0,4	redovno
			47,5				gazdovanje.
			16,7				
6,5	4,4	1,6	245,6	1468	5,7	33,9	
4,7		0,4	6,6	161	3,2	5,2	Osnovna namena:
3,9	1,4	0,6	10,4	58	0,4	0,6	nacionalni park
1,3			21,5	71	0,7	1,2	- II stepen
2,6			16,0	71	1,6	2,6	zaštite.
21,9			55,1	29	0,4	0,7	Sastojina za
			33,0	2		0,1	redovno
9,5			32,3				gazdovanje.
	16,8		30,8				Uzg.pot.

ОПИС СТАНИШТА И САСТОЈИНА

hektaru				zaprem.	tekuci prirast		
eta				na celoj	na	na cel	Primedba
4	5	6	svega	povrsini	ha	pov.	
25	26	27	28	29	30	31	32
			36,8				obnavljanje.
43,9	18,2	1,0	242,5	393	6,4	10,4	Seca: cista seca
							obnova bagrema kotlicenjem.
							Osnovna namena:
							nacionalni park
							- II stepen
							zaštite.
							Sastojina za
							redovno
							gazdovanje.

ОПИС СТАНИШТА И САСТОЈИНА

hektaru eta				zaprem. na celoj povrsini	tekuci prirast na ha	tekuci prirast na cel pov.	Primedba
4	5	6	svega				
25	26	27	28	29	30	31	32
							Osnovna namena:
							nacionalni park
							- II stepen
							zaštite.
							Sastojina za
							redovno
							gazdovanje.
							Osnovna namena:
							nacionalni park
							- III stepen
							zaštite.
0,4	0,3	0,6	7,8	5620	5,0	102,0	Osnovna namena:
0,4	1,4	0,3	8,7	768	1,2	24,1	nacionalni park
0,5	0,3		4,3	179	0,2	3,3	- II stepen
1,3			13,5	129	0,2	5,0	zaštite.
			11,6	41	0,1	1,6	Sastojina za
			42,5	18		0,7	redovno
3,8			73,0				gazdovanje.
			93,7				
			41,9				
			21,4				
			10,9				
6,3	2,0	0,9	329,4	6755	6,7	136,7	
3,0	0,5		3,7	629	4,5	11,1	Osnovna namena:
0,3			5,2	102	0,7	1,8	nacionalni park
			2,1	14	0,1	0,3	- II stepen
			16,4	8	0,1	0,3	zaštite.
			10,0	1		0,1	Sastojina za
			14,5				redovno
			46,4				gazdovanje.
			42,4				Uzg.pot.
			58,3				obnavljanje.
			66,5				Seca: oplodna
			38,8				seca kratkog

ОПИС СТАНИШТА И САСТОЈИНА

hektaru				zaprem.	tekuci prirast		Primedba
eta			svega	na celoj	na	na cel	
4	5	6		povrsini	ha	pov.	
25	26	27	28	29	30	31	32
3,3	0,5		304,1	754	5,5	13,5	perioda za
							obnavljanje
							oplodna seca
							(oplodni i
							završni sek)
							kratkog perioda
							za obnavljanje.

ОПИС СТАНИШТА И САСТОЈИНА

hektaru eta				zaprem. na celoj povrsini	tekuci prirast na ha	 na cel pov.	Primedba
4	5	6	svega				
25	26	27	28	29	30	31	32
0,3	0,1	0,6	13,2	360	2,0	8,4	Osnovna namena:
0,9		1,0	18,6	58	0,4	1,7	nacionalni park
1,2			13,3	22	0,2	1,0	- II stepen
3,1		2,5	14,2	23	0,2	0,7	zaštite.
			34,2	31	0,2	0,9	Sastojina za
	7,4		30,4	17	0,1	0,3	redovno
5,6	7,5	4,1	123,9	510	3,2	13,0	gazdovanje.
1,0		0,2	6,6	510	3,6	10,4	Osnovna namena:
7,5			16,7	241	1,9	5,5	nacionalni park
7,5			17,4	109	1,1	3,2	- II stepen
			14,8	46	0,6	1,8	zaštite.
			22,8	28	0,2	0,6	Sastojina za
	9,5		50,1	1			redovno
			114,4				gazdovanje.
			41,5				Uzg.pot.
			37,8				obnavljanje.
16,0	9,5	0,2	322,2	934	7,4	21,5	Seca: oplodna
							seca kratkog
							perioda za
							obnavljanje
							oplodna seca
							(pripremni sek)
							kratkog perioda
							za obnavljanje.
			0,2	35	0,7	0,7	Osnovna namena:

ОПИС СТАНИШТА И САСТОЈИНА

hektaru				zaprem.	tekuci prirast		
eta			svega	na celoj	na	na cel	Primedba
4	5	6		povrsini	ha	pov.	
25	26	27	28	29	30	31	32
			0,8	3	0,1	0,1	nacionalni park
			5,1				- II stepen
			7,6				zaštite.
			5,9				Sastojina za
			7,9				prelazno
			10,9				gazdovanje.
			38,5	38	0,8	0,8	

ОПИС СТАНИШТА И САСТОЈИНА

hektaru eta				zaprem. na celoj povrsini	tekuci prirast		Primedba
			svega		na ha	na cel pov.	
4	5	6	28	29	30	31	32
25	26	27					
2,4	0,1	0,5	8,7	359	2,8	6,5	Osnovna namena:
2,1			6,3	12	0,2	0,4	nacionalni park
2,8	0,7		5,1	15	0,2	0,5	- II stepen
	2,2	2,0	8,0	17	0,3	0,6	zaštite.
			8,7	7	0,1	0,2	Sastojina za
			8,8	6		0,1	redovno
			34,7				gazdovanje.
			27,2				
			55,6				
			14,6				
7,3	2,9	2,5	177,6	416	3,5	8,3	
0,9	0,6	0,4	22,0	219	1,5	6,5	Osnovna namena:
0,8	1,1		26,9	149	1,3	5,3	nacionalni park
			16,7	31	0,3	1,1	- II stepen
			24,0	7	0,1	0,3	zaštite.
			8,0	7		0,1	Sastojina za
				2		0,1	redovno
1,7	1,6	0,4	97,7	415	3,2	13,4	gazdovanje.
0,1	1,0	0,9	13,5	41	0,9	2,0	Osnovna namena:
2,9		0,7	12,2	15	0,2	0,4	nacionalni park
	3,2		10,9	14	0,2	0,4	- II stepen
2,3			4,7	12	0,2	0,4	zaštite.
				10	0,1	0,3	Sastojina za
				4	0,1	0,2	redovno
5,3	4,2	1,6	41,2	95	1,6	3,7	gazdovanje.

ОПИС СТАНИШТА И САСТОЈИНА

hektaru				zaprem.	tekuci prirast		
eta				na celoj	na	na cel	Primedba
4	5	6	svega	povrsini	ha	pov.	
25	26	27	28	29	30	31	32
			0,2	219	0,9	4,7	Osnovna namena:
			1,6	15	0,1	0,5	nacionalni park
			2,5				- II stepen
			6,3				zaštite.
			12,1				Sastojina za
			13,6				prelazno
			8,4				gazdovanje.
			44,6	234	1,0	5,2	

hektaru eta				zaprem. na celoj	tekuci prirast		Primedba
			svega	povrsini	na ha	na cel pov.	
4	5	6	28	29	30	31	32
25	26	27	0,2	161	0,9	3,2	Osnovna namena:
			1,3	8	0,1	0,3	nacionalni park
			2,0				- II stepen
			2,0				zaštite.
			6,9				Sastojina za
			10,8				redovno
			24,3				gazdovanje.
			47,4	169	1,0	3,5	Uzg.pot.
							rekonstrukcija.
							Seca: cista seca
							cista seca.
							Osnovna namena:
							nacionalni park
							- II stepen
							zaštite.
0,4	0,1	0,1	3,3	813	2,2	15,7	Osnovna namena:
3,4	0,2	0,1	6,1	618	1,6	11,1	nacionalni park
5,7			7,7	339	1,1	7,5	- II stepen
17,2			19,6	413	0,9	6,2	zaštite.
14,0			23,6	2		0,1	Sastojina za
			27,2	1			redovno
17,4			58,5				gazdovanje.
			37,0				Uzg.pot.
			22,3				obnavljanje.
			65,7				Seca: oplodna
			11,5				seca kratkog
			24,5				perioda za
58,0	0,3	0,2	306,9	2185	5,7	40,7	obnavljanje
							oplodna seca
							(oplodni sek)
							kratkog perioda
							za obnavljanje.
	0,1	0,4	8,2	2207	4,8	45,5	Osnovna namena:
1,7	0,9		9,0	513	1,5	14,4	nacionalni park
0,7			8,8	60	0,1	1,1	- II stepen

ОПИС СТАНИШТА И САСТОЈИНА

hektaru eta				zaprem. na celoj	tekuci prirast na	 na cel	Primedba
4	5	6	svega	povrsini	ha	pov.	
25	26	27	28	29	30	31	32
			10,8	23	0,1	0,5	zaštite.
			30,8	10		0,5	Sastojina za
			64,9	4		0,2	redovno
			62,4				gazdovanje.
			48,2				
			52,4				
2,4	1,0	0,4	295,5	2816	6,5	62,2	

hektaru				zaprem.	tekuci prirast		
eta				na celoj	na	na cel	Primedba
4	5	6	svega	povrsini	ha	pov.	
25	26	27	28	29	30	31	32
1,1	1,9	0,6	6,7	1414	3,7	27,8	Osnovna namena:
	1,2	0,9	4,1	342	1,3	9,4	nacionalni park
	2,6		4,8	186	0,7	5,2	- II stepen
		1,9	14,1	123	0,6	4,4	zaštite.
1,2		2,6	26,8	43	0,2	1,3	Sastojina za
1,6			30,1	45	0,1	0,7	redovno
2,4			94,8				gazdovanje.
			74,8				
			16,8				
			6,4				
10,3			10,3				
16,5	5,7	6,0	289,7	2152	6,6	48,8	
							Osnovna namena:
							nacionalni park
							- II stepen
							zaštite.
0,6	0,6	0,8	5,5	1193	2,8	27,1	Osnovna namena:
1,5	1,8	0,7	11,2	667	1,6	15,6	nacionalni park
	2,6	1,7	23,4	435	0,5	4,9	- II stepen
1,3			31,2	336	0,9	9,1	zaštite.
			39,0	155	0,5	5,1	Sastojina za
4,9			34,5	30	0,1	0,8	redovno
12,3	11,2		61,0				gazdovanje.
			50,3				
			10,6				
14,3			25,3				
34,8	16,1	3,1	292,1	2816	6,5	62,7	
			25,8	149	5,6	8,1	Osnovna namena:

ОПИС СТАНИШТА И САСТОЈИНА

hektaru				zaprem.	tekuci prirast		Primedba
eta				na celoj	na	na cel	
4	5	6	svega	povrsini	ha	pov.	
25	26	27	28	29	30	31	32
			42,1	1		0,1	nacionalni park
			36,1				- II stepen
			104,1	150	5,6	8,1	zaštite.
							Sastojina za
							redovno
							gazdovanje.

ОПИС СТАНИШТА И САСТОЈИНА

hektaru eta				zaprem. na celoj povrsini	tekuci prirast		Primedba
			svega		na ha	na cel pov.	
4	5	6	28	29	30	31	32
0,3	0,9	0,6	3,3	117	1,2	2,3	Osnovna namena:
1,0	2,5		12,5	83	0,8	1,4	nacionalni park
6,5	3,0	2,1	27,5	83	1,1	2,0	- II stepen
21,4	3,2	2,8	38,2	65	0,4	0,7	zaštite.
5,1	4,9		36,1	60	1,0	1,9	Sastojina za
	17,4		17,4	10	0,2	0,3	redovno
			21,3				gazdovanje.
			15,7				Uzg.pot.
			23,7				proreda. Seca:
			25,4				proredna seca
34,3	31,7	5,5	221,1	418	4,6	8,6	selektivna proreda.
0,6	0,4	0,1	2,6	445	4,7	9,3	Osnovna namena:
1,7	0,8	0,9	8,6	72	0,8	1,7	nacionalni park
			4,3	36	0,4	0,9	- II stepen
			24,5	5		0,1	zaštite.
			54,1	2		0,1	Sastojina za
			83,4	2		0,1	redovno
			76,1				gazdovanje.
			29,2				
2,4	1,2	1,0	282,8	563	6,1	12,1	

hektaru				zaprem.	tekuci prirast		
eta				na celoj	na	na cel	Primedba
4	5	6	svega	povrsini	ha	pov.	
25	26	27	28	29	30	31	32
			4,6	239	2,4	4,1	Osnovna namena:
			2,9	159	2,0	3,4	nacionalni park
			8,1	44	0,5	0,8	- II stepen
3,5			19,6	48	0,6	1,0	zaštite.
			11,1				Sastojina za
			53,5				redovno
24,6			56,6				gazdovanje.
			57,9				
			28,6				
			44,8				
28,0			287,8	489	5,5	9,3	
							Osnovna namena:
							nacionalni park
							- II stepen
							zaštite.
	0,6	0,6	3,3	1297	3,1	28,5	Osnovna namena:
	0,5	0,2	8,6	418	0,9	8,6	nacionalni park
	0,9	0,7	11,1	239	0,5	5,0	- II stepen
1,7	1,8		26,8	205	0,4	3,7	zaštite.
	5,1	2,7	43,1	82	0,3	3,0	Sastojina za
11,2			50,6	39	0,2	1,5	redovno
2,9			60,2				gazdovanje.
6,5			34,6				
			9,4				
22,2	8,9	4,3	247,7	2281	5,5	50,2	

ОПИС СТАНИШТА И САСТОЈИНА

hektaru eta				zaprem. na celoj povrsini	tekuci prirast na ha	 na cel pov.	Primedba
4	5	6	svega				
25	26	27	28	29	30	31	32

hektaru				zaprem.	tekuci prirast		Primedba
eta				na celoj	na	na cel	
4	5	6	svega	povrsini	ha	pov.	
25	26	27	28	29	30	31	32
			3,0	89	1,6	1,5	Osnovna namena:
0,6			10,0	26	0,4	0,4	nacionalni park
			8,9	54	1,6	1,4	- II stepen
			54,8	12	0,3	0,2	zaštite.
3,0			21,9				Sastojina za
			50,4				redovno
8,9			25,5				gazdovanje.
			18,7				
12,5			193,2	180	3,8	3,6	
							Osnovna namena:
							nacionalni park
							- II stepen
							zaštite.
0,4	0,1	0,4	3,7	1119	2,2	21,2	Osnovna namena:
0,8	0,6	0,9	7,9	818	1,8	17,1	nacionalni park
1,4		1,5	5,6	77	0,2	1,7	- II stepen
1,3	0,6		9,9	38	0,1	0,6	zaštite.
	0,9		33,4	36	0,1	1,2	Sastojina za
	1,5		67,0	27	0,1	1,1	redovno
			32,7				gazdovanje.
			34,3				
			14,2				
			5,0				
			5,9				
4,0	3,7	2,8	219,6	2115	4,5	42,9	

ОПИС СТАНИШТА И САСТОЈИНА

hektaru eta				zaprem. na celoj povrsini	tekuci prirast na ha	 na cel pov.	Primedba
4	5	6	svega				
25	26	27	28	29	30	31	32
			3,1	161	2,9	3,8	Osnovna namena:
			11,5	62	1,2	1,6	nacionalni park
			10,2	24	0,4	0,5	- II stepen
			10,7				zaštite.
			67,2				Sastojina za
			41,1				redovno
			35,9				gazdovanje.
			10,7				
			190,5	248	4,6	5,9	

hektaru eta				zaprem. na celoj povrsini	tekuci prirast na ha	tekuci prirast na cel pov.	Primedba
4	5	6	svega				
25	26	27	28	29	30	31	32
		0,2	4,6	411	3,4	6,1	Osnovna namena:
			1,0	140	1,9	3,4	nacionalni park
1,1			2,4	30	0,2	0,4	- II stepen
1,9			3,9	13	0,1	0,2	zaštite.
			2,6				Sastojina za
4,3			14,9	0			redovno
			36,1				gazdovanje.
			38,6				Uzg.pot.
			76,0				obnavljanje.
			68,2				Seca: oplodna
			59,0				seca kratkog
			30,2				perioda za
7,3		0,2	337,5	594	5,7	10,0	obnavljanje
							oplodna seca
							(završni sek)
							kratkog perioda
							za obnavljanje.
							Osnovna namena:
							nacionalni park
							- II stepen
							zaštite.
			1,7	206	3,7	3,3	Osnovna namena:
			0,9	68	1,4	1,3	nacionalni park
1,2			2,7	5	0,1	0,1	- II stepen
			13,9	1			zaštite.
			20,8				Sastojina za
			15,6				redovno
			22,2				gazdovanje.
			38,5				Uzg.pot.
			104,4				obnavljanje.
			28,7				Seca: oplodna
			44,3				seca kratkog
			20,3				perioda za
1,2			314,2	280	5,3	4,7	obnavljanje
							oplodna seca
							(završni sek)
							kratkog perioda
							za obnavljanje.

ОПИС СТАНИШТА И САСТОЈИНА

hektaru				zaprem.	tekuci prirast		Primedba
eta			svega	na celoj	na	na cel	
4	5	6		povrsini	ha	pov.	
25	26	27	28	29	30	31	32
0,4	0,8	0,2	11,0	809	2,6	15,1	Osnovna namena:
1,3	0,6		8,6	194	1,1	6,2	nacionalni park
		0,9	5,4	23	0,1	0,6	- II stepen
1,8			13,6	20	0,2	0,9	zaštite.
			15,9	8	0,1	0,3	Sastojina za
			33,2	7		0,2	redovno
			35,2				gazdovanje.
			39,8				
			22,6				
3,5	1,4	1,2	185,3	1062	4,0	23,2	

ОПИС СТАНИШТА И САСТОЈИНА

hektaru				zaprem.	tekuci prirast		Primedba
eta				na celoj	na	na cel	
4	5	6	svega	povrsini	ha	pov.	
25	26	27	28	29	30	31	32
							Osnovna namena:
							nacionalni park
							- II stepen
							zaštite.
							Sastojina za
							redovno
							gazdovanje.
							Osnovna namena:
							nacionalni park
							- II stepen
							zaštite.
							Sastojina za
							redovno
							gazdovanje.
0,1	0,1	0,1	6,1	328	3,3	6,8	Osnovna namena:
0,6			6,2	121	1,1	2,4	nacionalni park
0,6			7,2	37	0,6	1,2	- II stepen
3,5	2,9		39,5	23	0,3	0,6	zaštite.
			37,2	6		0,1	Sastojina za
			8,7	0			redovno
			43,7				gazdovanje.
6,2			58,8				
			38,5				
11,0	3,0	0,1	246,0	517	5,3	11,1	

ОПИС СТАНИШТА И САСТОЈИНА

hektaru				zaprem.	tekuci prirast		
eta				na celoj	na	na cel	Primedba
4	5	6	svega	povrsini	ha	pov.	
25	26	27	28	29	30	31	32
							Osnovna namena:
							nacionalni park
							- II stepen
							zaštite.
							Sastojina za
							redovno
							gazdovanje.

ОПИС СТАНИШТА И САСТОЈИНА

hektaru eta				zaprem. na celoj povrsini	tekuci prirast na ha	 na cel pov.	Primedba
4	5	6	svega				
25	26	27	28	29	30	31	32
1,3	0,9	0,4	11,3	113	2,1	2,0	Osnovna namena:
			4,1	38	1,2	1,2	nacionalni park
			2,3	18	0,3	0,3	- II stepen
5,8			5,8	7	0,2	0,2	zaštite.
			14,6	1			Sastojina za
			12,1	0			redovno
			70,0				gazdovanje.
			38,5				
			29,6				
7,2	0,9	0,4	188,3	177	3,9	3,7	
2,7	0,8	1,5	15,3	30	0,6	0,9	Osnovna namena:
3,0	1,8	1,8	20,4	27	0,5	0,8	nacionalni park
	2,1		5,2	10	0,2	0,3	- II stepen
			9,1	9	0,3	0,4	zaštite.
			9,0	7	0,1	0,1	Sastojina za
				5	0,2	0,2	redovno
5,8	4,8	3,3	59,0	87	1,8	2,7	gazdovanje.
							Osnovna namena:
							nacionalni park
							- II stepen
							zaštite.

ОПИС СТАНИШТА И САСТОЈИНА

hektaru eta				zaprem. na celoj povrsini	tekuci prirast na ha	 na cel pov.	Primedba
4	5	6	svega				
25	26	27	28	29	30	31	32
			1,7	69	2,3	2,3	Osnovna namena:
	1,4	1,3	7,8	36	0,6	0,6	nacionalni park
			15,6	44	0,7	0,7	- II stepen
			28,8	29	0,4	0,4	zaštite.
			45,7	18	0,5	0,5	Sastojina za
			18,8	1	0,1	0,1	redovno
	16,7		16,7				gazdovanje.
29,3			63,7				
29,3	18,1	1,3	198,8	197	4,6	4,5	

ОПИС СТАНИШТА И САСТОЈИНА

hektaru eta				zaprem. na celoj povrsini	tekuci prirast na ha	tekuci prirast na cel pov.	Primedba
4	5	6	svega				
25	26	27	28	29	30	31	32
		0,1	1,8	123	2,3	2,3	Osnovna namena:
	0,4		5,9	48	1,2	1,1	nacionalni park
			3,5	40	1,0	0,9	- II stepen
			5,4	12	0,2	0,2	zaštite.
	2,5		29,4	3			Sastojina za
			66,6	0			redovno
			30,1				gazdovanje.
			35,2				
			31,9				
12,2			25,0				
12,2	2,9	0,1	234,6	225	4,7	4,5	
2,5	0,3	0,5	7,9	312	3,3	6,1	Osnovna namena:
4,7	1,5	0,9	9,6	134	1,6	2,9	nacionalni park
2,2	6,7	1,6	15,4	46	0,2	0,4	- II stepen
		3,9	10,6	17	0,4	0,8	zaštite.
			20,2	16	0,2	0,4	Sastojina za
			50,6	13	0,2	0,4	redovno
			79,0				gazdovanje.
			37,6				Uzg.pot.
			27,5				obnavljanje.
			31,8				Seca: oplodna
9,3	8,5	6,9	290,2	537	5,9	11,0	seca kratkog
							perioda za
							obnavljanje
							oplodna seca
							(pripremni sek)
							kratkog perioda
							za obnavljanje.
			1,8	550	2,6	9,3	Osnovna namena:
	0,4		3,3	204	1,2	4,4	nacionalni park
			6,2	153	0,6	2,2	- II stepen
	2,1		11,4	53	0,2	0,8	zaštite.
			17,9	9		0,1	Sastojina za
2,5			37,8				redovno
			32,6				gazdovanje.
4,4			45,5				Uzg.pot.
			26,6				obnavljanje.
			41,6				Seca: oplodna

ОПИС СТАНИШТА И САСТОЈИНА

hektaru				zaprem.	tekuci prirast		
eta			svega	na celoj	na	na cel	Primedba
4	5	6		povrsini	ha	pov.	
25	26	27	28	29	30	31	32
8,0			22,4				seca kratkog
			10,6				perioda za
			16,7				obnavljanje
14,9	2,5		274,3	968	4,7	16,8	oplodna seca
							(oplodni sek)
							kratkog perioda
							za obnavljanje.

ОПИС СТАНИШТА И САСТОЈИНА

hektaru eta				zaprem. na celoj povrsini	tekuci prirast		Primedba
			svega		na ha	na cel pov.	
4	5	6	28	29	30	31	32
	0,3	0,2	2,5	99	1,2	2,0	Osnovna namena:
	0,4		6,6	33	0,7	1,1	nacionalni park
	1,4	1,0	7,0	22	0,4	0,7	- II stepen
			11,6	28	0,3	0,5	zaštite.
	2,9		2,9	8	0,1	0,1	Sastojina za
			15,9	2		0,1	redovno
7,4			22,2				gazdovanje.
9,6			27,4				
			22,5				
17,0	5,0	1,2	118,6	192	2,8	4,5	
1,4	1,3	0,9	8,9	334	3,1	7,0	Osnovna namena:
1,1	0,4		9,1	125	1,5	3,2	nacionalni park
			7,5	51	0,5	1,1	- II stepen
			16,0	6		0,1	zaštite.
			33,1	4	0,1	0,2	Sastojina za
			49,2	2		0,1	redovno
			42,7				gazdovanje.
			29,5				
			37,8				
2,5	1,7	0,9	233,8	521	5,2	11,6	
0,1			0,9	436	2,6	6,0	Osnovna namena:
			9,7	88	0,6	1,4	nacionalni park
			13,3	5		0,1	- II stepen
			29,1	14	0,2	0,4	zaštite.
6,2	4,9		70,7	11	0,1	0,2	Sastojina za

ОПИС СТАНИШТА И САСТОЈИНА

hektaru				zaprem.	tekuci prirast		Primedba
eta				na celoj	na	na cel	
4	5	6	svega	povrsini	ha	pov.	
25	26	27	28	29	30	31	32
			36,3				redovno
			8,3				gazdovanje.
			35,6				
			7,6				
			30,7				
6,3	4,9		242,3	555	3,5	8,1	
							Osnovna namena:
							nacionalni park
							- II stepen
							zaštite.

ОПИС СТАНИШТА И САСТОЈИНА

hektaru eta				zaprem. na celoj	tekuci prirast		Primedba
			svega	povrsini	na ha	na cel pov.	
4	5	6	28	29	30	31	32
25	26	27					
0,2	0,1		2,1	636	3,6	10,3	Osnovna namena:
			2,0	144	1,2	3,5	nacionalni park
1,4			8,3	83	0,5	1,5	- II stepen
2,5			23,4	19	0,1	0,3	zaštite.
2,7			13,0	0			Sastojina za
			24,9				redovno
			88,8				gazdovanje.
			81,2				
			34,1				
			29,4				
6,7	0,1		307,3	882	5,4	15,5	
		0,1	2,8	2124	3,3	42,4	Osnovna namena:
0,3	0,2	0,2	2,6	1892	2,6	34,0	nacionalni park
	0,7		2,9	163	0,2	2,2	- II stepen
			7,0	62	0,1	1,9	zaštite.
			17,8	12		0,2	Sastojina za
			52,3	3		0,1	redovno
			76,1				gazdovanje.
			66,2				Uzg.pot.
4,5			61,2				obnavljanje.
			33,9				Seca: oplodna
			7,1				seca kratkog
4,8	0,9	0,2	330,0	4256	6,3	80,8	perioda za
							obnavljanje
							oplodna seca
							(oplodni sek)
							kratkog perioda
							za obnavljanje.

ОПИС СТАНИШТА И САСТОЈИНА

hektaru				zaprem.	tekuci prirast		
eta			svega	na celoj	na	na cel	Primedba
4	5	6		povrsini	ha	pov.	
25	26	27	28	29	30	31	32

hektaru				zaprem.	tekuci prirast		Primedba
eta				na celoj	na	na cel	
4	5	6	svega	povrsini	ha	pov.	
25	26	27	28	29	30	31	32
0,1	1,0	0,2	6,5	821	3,4	17,6	Osnovna namena:
		0,6	3,1	857	3,3	17,0	nacionalni park
1,2			6,6	7		0,3	- II stepen
			18,4	7		0,2	zaštite.
			54,1	5		0,1	Sastojina za
			68,6	4		0,1	redovno
			88,9				gazdovanje.
			31,2				Uzg.pot.
			33,2				obnavljanje.
			14,6				Seca: oplodna
1,2	1,0	0,8	325,2	1701	6,8	35,4	seca kratkog
							perioda za
							obnavljanje
							oplodna seca
							(pripremni sek)
							kratkog perioda
							za obnavljanje.
							Osnovna namena:
							nacionalni park
							- II stepen
							zaštite.
			1,0	215	2,7	3,9	Osnovna namena:
			1,1	131	1,3	1,9	nacionalni park
			3,4	88	1,0	1,5	- II stepen
1,6			1,6	11	0,1	0,1	zaštite.
			10,0				Sastojina za
5,6			79,2				redovno
			74,4				gazdovanje.
			25,6				Uzg.pot.
			13,8				obnavljanje.
			67,7				Seca: oplodna
			22,2				seca kratkog
7,1			300,0	444	5,0	7,5	perioda za
							obnavljanje
							oplodna seca
							(oplodni i
							završni sek)
							kratkog perioda
							za obnavljanje.

ОПИС СТАНИШТА И САСТОЈИНА

hektaru eta				zaprem. na celoj povrsini	tekuci prirast na ha	 na cel pov.	Primedba
4	5	6	svega				
25	26	27	28	29	30	31	32

ОПИС СТАНИШТА И САСТОЈИНА

hektaru eta				zaprem. na celoj	tekuci prirast		Primedba
			svega	povrsini	na ha	na cel pov.	
4	5	6	28	29	30	31	32
1,1	0,1	0,2	3,6	917	3,6	15,6	Osnovna namena:
1,1		0,3	2,7	161	0,9	4,0	nacionalni park
2,2	0,3		4,9	174	1,0	4,1	- II stepen
6,3			9,3	56	0,3	1,3	zaštite.
0,9			9,0	52	0,3	1,3	Sastojina za
1,3			32,8	2		0,1	redovno
			80,4				gazdovanje.
			59,8				Uzg.pot.
			71,6				obnavljanje.
	5,3		29,3				Seca: oplodna
	6,4		6,4				seca kratkog
			7,5				perioda za
13,0	12,1	0,5	317,3	1361	6,1	26,4	obnavljanje
							oplodna seca
							(oplodni sek)
							kratkog perioda
							za obnavljanje.
0,4	0,2	2,6	4,1	507	1,7	9,2	Osnovna namena:
0,3	0,1	5,2	8,8	427	1,1	5,7	nacionalni park
0,4		4,4	19,3	211	1,2	6,6	- II stepen
			35,0	264	0,9	4,9	zaštite.
1,4			33,6	51	0,3	1,4	Sastojina za
9,5			55,6	67	0,5	2,9	redovno
7,2	3,1		23,7				gazdovanje.
8,5			33,2				Uzg.pot.
11,4			35,4				obnavljanje.
	5,9		5,9				Seca: oplodna
			7,6				seca kratkog
			8,5				perioda za
9,4			9,4				obnavljanje
48,4	9,3	12,3	280,2	1527	5,6	30,7	oplodna seca
							(pripremni sek)
							kratkog perioda
							za obnavljanje.

ОПИС СТАНИШТА И САСТОЈИНА

hektaru eta				zaprem. na celoj povrsini	tekuci prirast na ha	 na cel pov.	Primedba
4	5	6	svega				
25	26	27	28	29	30	31	32

hektaru				zaprem.	tekuci prirast		Primedba
eta			svega	na celoj	na	na cel	
4	5	6		povrsini	ha	pov.	
25	26	27	28	29	30	31	32
		0,2	0,2	36	1,9	0,7	Osnovna namena:
	0,2		0,2	18	0,9	0,3	nacionalni park
	1,0		9,2	14	0,7	0,3	- II stepen
3,7	2,1		11,7	9	0,4	0,2	zaštite.
			22,4	1	0,1		Sastojina za
			105,5	0			redovno
8,6			45,7				gazdovanje.
12,3			12,3				
24,6	3,3	0,2	207,2	79	4,0	1,5	
							Osnovna namena:
							nacionalni park
							- II stepen
							zaštite.
							Sastojina za
							redovno
							gazdovanje.
		0,6	1,3	24	1,5	0,5	Osnovna namena:
2,2	1,3		11,5	17	1,3	0,4	nacionalni park
2,9	2,0	4,2	34,8	3	0,3	0,1	- II stepen
			52,4	2	0,1		zaštite.
			33,1	1	0,1		Sastojina za
			16,1	2	0,2	0,1	redovno
5,0	3,3	4,8	149,2	48	3,5	1,1	gazdovanje.
							Uzg.pot.

hektaru eta				zaprem. na celoj	tekuci prirast na	 na cel	Primedba
4	5	6	svega	povrsini	ha	pov.	
25	26	27	28	29	30	31	32
							proreda. Seca:
							proredna seca
							selektivna proreda.
							Osnovna namena:
							nacionalni park
							- III stepen
							zaštite.
							Osnovna namena:
							nacionalni park
							- II stepen
							zaštite.

hektaru eta				zaprem. na celoj	tekuci prirast na		Primedba
			svega	povrsini	ha	na cel pov.	
4	5	6	28	29	30	31	32
							Osnovna namena:
							nacionalni park
							- II stepen
							zaštite.
0,3	0,1		1,7	40	1,8	1,0	Osnovna namena:
		0,4	0,4	35	0,7	0,4	nacionalni park
			3,6	36	1,1	0,6	- II stepen
		4,2	23,1	28	0,8	0,5	zaštite.
13,8			48,2	6	0,2	0,1	Sastojina za
7,9	9,9		94,5	3	0,1	0,1	redovno
			26,3				gazdovanje.
			40,3				
28,6			28,6				
50,6	10,1	4,6	266,7	147	4,8	2,6	
3,3	0,3		7,4	172	2,6	3,0	Osnovna namena:
3,3	1,4		8,0	33	0,5	0,6	nacionalni park
	6,4	2,0	15,8	12	0,4	0,5	- II stepen
			13,9	8	0,3	0,4	zaštite.
			8,0	9	0,2	0,2	Sastojina za
			37,0	2			redovno
			33,7				gazdovanje.
			22,5				Uzg.pot.
			59,4				proreda. Seca:
6,6	8,1	2,0	205,7	237	4,0	4,7	proredna seca
							selektivna proreda.

ОПИС СТАНИШТА И САСТОЈИНА

hektaru eta				zaprem. na celoj	tekuci prirast na	 na cel	Primedba
4	5	6	svega	povrsini	ha	pov.	
25	26	27	28	29	30	31	32
0,9		0,2	2,6	184	4,0	2,8	Osnovna namena:
		0,5	3,4	17	0,4	0,3	nacionalni park
	1,6		6,7	17	0,5	0,3	- II stepen
2,4			22,6	16	0,7	0,5	zaštite.
3,3	4,8		16,5	5	0,1		Sastojina za
			30,7	1			redovno
			40,9				gazdovanje.
			83,4				
16,0			58,4				
			52,1				
			19,7				
22,5	6,5	0,7	337,0	239	5,6	4,0	

ОПИС СТАНИШТА И САСТОЈИНА

hektaru eta				zaprem. na celoj povrsini	tekuci prirast na ha	 na cel pov.	Primedba
4	5	6	svega				
25	26	27	28	29	30	31	32
		0,4	2,2	126	2,9	2,1	Osnovna namena:
0,6			3,6	20	0,4	0,3	nacionalni park
4,9	1,3		13,3	5	0,2	0,1	- II stepen
			16,8	4	0,2	0,1	zaštite.
			11,0	1			Sastojina za
			31,7	0			redovno
			61,1				gazdovanje.
			19,2				
			25,9				
			29,2				
5,5	1,3	0,4	214,1	156	3,7	2,7	
			1,3	666	4,4	10,6	Osnovna namena:
			0,7	114	0,7	1,8	nacionalni park
0,9			0,9	48	0,4	0,9	- II stepen
3,2			3,2	31	0,2	0,4	zaštite.
2,3			4,1				Sastojina za
6,5			16,6				redovno
			22,8				gazdovanje.
			59,9				Uzg.pot.
			60,7				obnavljanje.
			48,5				Seca: oplodna
			29,9				seca kratkog
			62,8				perioda za
			49,7				obnavljanje
12,9			361,1	860	5,7	13,7	oplodna seca
							(oplodni i
							završni sek)
							kratkog perioda
							za obnavljanje.
							Osnovna namena:

ОПИС СТАНИШТА И САСТОЈИНА

hektaru				zaprem.	tekuci prirast		
eta				na celoj	na	na cel	Primedba
4	5	6	svega	povrsini	ha	pov.	
25	26	27	28	29	30	31	32
							nacionalni park
							- II stepen
							zaštite.
							Sastojina za
							redovno
							gazdovanje.
							Osnovna namena:
							nacionalni park
							- II stepen
							zaštite.
							Sastojina za
							redovno
							gazdovanje.

hektaru eta				zaprem. na celoj	tekuci prirast na	 na cel	Primedba
4	5	6	svega	povrsini	ha	pov.	
25	26	27	28	29	30	31	32
							Osnovna namena:
							nacionalni park
							- II stepen
							zaštite.
							Sastojina za
							redovno
							gazdovanje.
0,8			3,1	31	2,2	0,7	Osnovna namena:
1,1		0,6	4,7	31	1,2	0,4	nacionalni park
	3,0		11,5	23	1,1	0,3	- II stepen
			6,1	1	0,1		zaštite.
			11,3	1	0,1		Sastojina za
			35,9	0			redovno
			62,1				gazdovanje.
			40,2				
			53,8				
			23,2				
			27,7				
1,9	3,0	0,6	279,8	87	4,7	1,4	
			0,4	319	0,5	6,7	Osnovna namena:
			0,8	11		0,2	nacionalni park
			6,7	6		0,2	- II stepen
			4,2				zaštite.
			7,2				Sastojina za
			5,4				prelazno
			24,8	335	0,5	7,1	gazdovanje.

ОПИС СТАНИШТА И САСТОЈИНА

hektaru				zaprem.	tekuci prirast		Primedba
eta				na celoj	na	na cel	
4	5	6	svega	povrsini	ha	pov.	
25	26	27	28	29	30	31	32
			0,5	499	0,4	8,9	Osnovna namena:
			1,9	41	0,1	1,4	nacionalni park
			4,6	18		0,5	- II stepen
			2,2				zaštite.
			6,6				Sastojina za
			6,4				prelazno
			22,3	557	0,4	10,8	gazdovanje.

ОПИС СТАНИШТА И САСТОЈИНА

hektaru eta				zaprem. na celoj	tekuci prirast		Primedba
			svega	povrsini	na ha	na cel pov.	
4	5	6	28	29	30	31	32
25	26	27					
	0,3	0,3	18,2	1922	13,2	80,4	Osnovna namena:
0,9			32,2	26	0,1	0,9	nacionalni park
			80,6	5		0,1	- II stepen
			94,6	6		0,1	zaštite.
			42,7	2			Sastojina za
			54,9	2			redovno
0,9	0,3	0,3	323,3	1962	13,4	81,6	gazdovanje.
							Uzg.pot.
							proreda. Seca:
							proredna seca
							selektivna proreda.
0,5		0,5	8,6	48	1,8	1,2	Osnovna namena:
	0,7		25,6	19	1,1	0,8	nacionalni park
2,7			23,6	9	0,3	0,2	- II stepen
			46,3	2	0,2	0,1	zaštite.
			8,8	1			Sastojina za
				0			redovno
3,2	0,7	0,5	112,9	79	3,4	2,4	gazdovanje.
			5,0	129	11,1	5,3	Osnovna namena:
			14,3	1			nacionalni park
			90,6				- II stepen
			84,0				zaštite.
			76,3				Sastojina za
			270,3	130	11,1	5,3	redovno
							gazdovanje.

ОПИС СТАНИШТА И САСТОЈИНА

hektaru eta				zaprem. na celoj povrsini	tekuci prirast na ha	 na cel pov.	Primedba
4	5	6	svega				
25	26	27	28	29	30	31	32

ОПИС СТАНИШТА И САСТОЈИНА

hektaru				zaprem.	tekuci prirast		Primedba
eta				na celoj	na	na cel	
4	5	6	svega	povrsini	ha	pov.	
25	26	27	28	29	30	31	32
			5,8	665	13,3	26,7	Osnovna namena:
			35,7	23	0,3	0,5	nacionalni park
			68,5	1			- II stepen
			131,5				zaštite.
			75,0				Sastojina za
			10,7				redovno
			15,7				gazdovanje.
			342,8	689	13,6	27,3	Uzg.pot.
							proreda. Seca:
							proredna seca
							selektivna proreda.
			9,2	58	11,0	2,4	Osnovna namena:
			27,9	2	0,2	0,1	nacionalni park
			61,6	0			- II stepen
			84,0				zaštite.
			65,8				Sastojina za
			10,9				redovno
			16,1				gazdovanje.
			275,5	61	11,2	2,5	
							Osnovna namena:
							nacionalni park
							- III stepen
							zaštite.
							Osnovna namena:
							nacionalni park
							- III stepen
							zaštite.
							Osnovna namena:
							nacionalni park

ОПИС СТАНИШТА И САСТОЈИНА

hektaru eta				zaprem. na celoj povrsini	tekuci prirast na ha	 na cel pov.	Primedba
4	5	6	svega				
25	26	27	28	29	30	31	32
							- III stepen
							zaštite.
							Osnovna namena:
							nacionalni park
							- II stepen
							zaštite.

ОПИС СТАНИШТА И САСТОЈИНА

hektaru eta				zaprem. na celoj povrsini	tekuci prirast		Primedba
			svega		na ha	na cel pov.	
4	5	6	28	29	30	31	32
0,2	0,3		1,5	433	2,4	8,4	Osnovna namena:
0,8	0,5		7,7	273	1,3	4,3	nacionalni park
2,7			9,0	127	0,8	2,8	- III stepen
	7,0		34,8	123	0,7	2,4	zaštite.
3,9			64,6	36	0,1	0,4	Sastojina za
		2,3	51,2	24	0,1	0,4	redovno
13,8	2,7		68,4				gazdovanje.
		4,5	8,4				
			10,3				
14,2			14,2				
			24,1				
35,6	10,5	6,8	294,2	1015	5,4	18,7	
			0,6	179	2,1	3,9	Osnovna namena:
0,5			4,7	102	0,8	1,6	nacionalni park
1,0	0,9		5,8	64	0,6	1,1	- III stepen
			24,5	33	0,4	0,7	zaštite.
3,1	6,0		36,2	13	0,2	0,3	Sastojina za
5,2			69,4				redovno
7,7			44,5				gazdovanje.
			24,2				Uzg.pot.
17,6	6,9		209,8	390	4,1	7,6	obnavljanje.
							Seca: oplodna
							seca kratkog
							perioda za
							obnavljanje
							oplodna seca
							(pripremni sek)
							kratkog perioda
							za obnavljanje.

ОПИС СТАНИШТА И САСТОЈИНА

hektaru eta				zaprem. na celoj povrsini	tekuci prirast na ha	 na cel pov.	Primedba
4	5	6	svega				
25	26	27	28	29	30	31	32

ОПИС СТАНИШТА И САСТОЈИНА

hektaru				zaprem.	tekuci prirast		Primedba
eta				na celoj	na	na cel	
4	5	6	svega	povrsini	ha	pov.	
25	26	27	28	29	30	31	32
1,2		0,1	3,1	383	1,5	6,2	Osnovna namena:
2,0		0,3	4,0	425	2,0	8,6	nacionalni park
1,6			5,8	181	1,2	4,9	- III stepen
9,6			22,6	99	0,5	1,9	zaštite.
5,4		2,5	44,2	40	0,2	0,7	Sastojina za
3,7			44,8	12	0,1	0,4	redovno
	9,5		67,2				gazdovanje.
			58,5				Uzg.pot.
			4,2				obnavljanje.
			14,3				Seca: oplodna
23,4	9,5	2,8	268,6	1139	5,4	22,7	seca kratkog
							perioda za
							obnavljanje
							oplodna seca
							(pripremni sek)
							kratkog perioda
							za obnavljanje.
	0,8		3,2	203	3,2	3,9	Osnovna namena:
			9,1	95	1,4	1,8	nacionalni park
			3,3	34	0,6	0,8	- III stepen
			15,8	15	0,1	0,2	zaštite.
			13,9	1			Sastojina za
			79,7				redovno
			43,1				gazdovanje.
			51,7				
11,8			43,5				
			19,6				
11,8	0,8		282,9	348	5,4	6,7	

ОПИС СТАНИШТА И САСТОЈИНА

hektaru eta				zaprem. na celoj povrsini	tekuci prirast na ha	 na cel pov.	Primedba
4	5	6	svega				
25	26	27	28	29	30	31	32

ОПИС СТАНИШТА И САСТОЈИНА

hektaru eta				zaprem. na celoj povrsini	tekuci prirast na ha	tekuci prirast na cel pov.	Primedba
4	5	6	svega				
25	26	27	28	29	30	31	32
3,3	0,2	0,8	6,1	626	2,3	10,5	Osnovna namena:
1,1	0,4	2,0	5,2	423	1,8	8,2	nacionalni park
0,7	1,8	2,0	6,3	35	0,2	1,0	- II stepen
2,2	2,2		13,3	44	0,4	1,8	zaštite.
2,4			20,8	21	0,1	0,3	Sastojina za
			34,1	22	0,2	1,0	redovno
			60,8				gazdovanje.
			46,6				
			36,4				
			9,4				
			18,2				
9,6	4,6	4,8	257,2	1171	5,0	22,8	
0,1	0,1		3,0	1856	4,9	33,6	Osnovna namena:
	0,5		4,8	662	1,7	11,9	nacionalni park
0,6		1,1	3,6	73	0,2	1,5	- II stepen
	0,7	0,5	18,1	31	0,1	0,7	zaštite.
			40,8	9	0,1	0,4	Sastojina za
3,8			56,4	12		0,2	redovno
			104,6				gazdovanje.
			80,7				Uzg.pot.
			52,5				obnavljanje.
			19,0				Seca: oplodna
4,5	1,3	1,7	383,4	2642	7,0	48,3	seca kratkog
							perioda za
							obnavljanje
							oplodna seca
							(pripremni sek)
							kratkog perioda
							za obnavljanje.

ОПИС СТАНИШТА И САСТОЈИНА

hektaru eta				zaprem. na celoj	tekuci prirast		Primedba
			svega	povrsini	na ha	na cel pov.	
4	5	6	28	29	30	31	32
25	26	27					
	0,1	0,2	2,2	791	2,2	13,9	Osnovna namena:
0,6	1,0	0,6	4,8	698	2,0	12,6	nacionalni park
	0,7	0,9	8,0	252	1,1	6,8	- II stepen
	1,3		15,8	116	0,4	2,4	zaštite.
			39,8	19	0,1	0,4	Sastojina za
			48,7	11		0,2	redovno
2,0			90,0				gazdovanje.
11,6			42,6				Uzg.pot.
4,3			34,8				obnavljanje.
			9,0				Seca: oplodna
			7,1				seca kratkog
18,5	3,0	1,8	302,7	1886	5,8	36,4	perioda za
							obnavljanje
							oplodna seca
							(oplodni sek)
							kratkog perioda
							za obnavljanje.
0,6	0,6	0,2	8,1	464	4,7	9,2	Osnovna namena:
			3,5	26	0,4	0,9	nacionalni park
			16,3	13	0,1	0,3	- II stepen
			45,3	1			zaštite.
			36,9	1			Sastojina za
			110,4	0			redovno
			36,5				gazdovanje.
0,6	0,6	0,2	257,0	506	5,3	10,4	Uzg.pot.
							obnavljanje.
							Seca: oplodna
							seca kratkog
							perioda za
							obnavljanje
							oplodna seca
							(pripremni sek)
							kratkog perioda
							za obnavljanje.

ОПИС СТАНИШТА И САСТОЈИНА

hektaru				zaprem.	tekuci prirast		
eta				na celoj	na	na cel	Primedba
4	5	6	svega	povrsini	ha	pov.	
25	26	27	28	29	30	31	32
							Osnovna namena:
							nacionalni park
							- III stepen
							zaštite.
							Sastojina za
							redovno
							gazdovanje.
							Osnovna namena:
							nacionalni park
							- III stepen
							zaštite.
							Osnovna namena:
							nacionalni park
							- III stepen
							zaštite.

hektaru				zaprem.	tekuci prirast		
eta			svega	na celoj	na	na cel	Primedba
4	5	6		povrsini	ha	pov.	
25	26	27	28	29	30	31	32
							Osnovna namena:
							nacionalni park
							- III stepen
							zaštite.
							Sastojina za
							redovno
							gazdovanje.
1,3			15,2	108	1,4	1,6	Osnovna namena:
1,7			19,2	39	0,8	0,8	nacionalni park
			4,7	17	0,4	0,4	- II stepen
			15,7	3	0,1	0,1	zaštite.
			28,2				Sastojina za
			21,7				redovno
			49,6				gazdovanje.
3,0			154,4	167	2,7	2,9	Uzg.pot.
							obnavljanje.
							Seca: oplodna
							seca kratkog
							perioda za
							obnavljanje
							oplodna seca
							(pripremni sek)
							kratkog perioda
							za obnavljanje.
			0,7	44	1,3	0,8	Osnovna namena:
			2,3	42	1,3	0,8	nacionalni park
			3,6	35	0,6	0,4	- II stepen
			58,8	7	0,2	0,1	zaštite.
			35,9				Sastojina za
10,4			42,1				redovno
			14,2				gazdovanje.
			22,7				
			25,3				
10,4			205,7	128	3,5	2,2	

ОПИС СТАНИШТА И САСТОЈИНА

hektaru eta				zaprem. na celoj povrsini	tekuci prirast na ha	 na cel pov.	Primedba
4	5	6	svega				
25	26	27	28	29	30	31	32

ОПИС СТАНИШТА И САСТОЈИНА

hektaru eta				zaprem. na celoj povrsini	tekuci prirast na ha	 na cel pov.	Primedba
4	5	6	svega				
25	26	27	28	29	30	31	32
0,5	0,4	0,2	19,7	191	4,4	9,6	Osnovna namena:
			45,6	110	2,0	4,3	nacionalni park
			28,9	2		0,1	- II stepen
			25,0	1			zaštite.
			21,4	1			Sastojina za
				1			redovno
0,5	0,4	0,2	140,6	305	6,5	14,1	gazdovanje.
			16,9	668	10,8	32,0	Osnovna namena:
			46,9	5	0,1	0,2	nacionalni park
			59,1	2			- III stepen
			70,0				zaštite.
			33,5				Sastojina za
			226,4	675	10,8	32,2	redovno
							gazdovanje.
							Uzg.pot.
							proreda. Seca:
							proredna seca
							selektivna proreda.
3,7	0,3		30,3	64	4,6	3,6	Osnovna namena:
			35,1	13	0,7	0,5	nacionalni park
			35,7				- III stepen
				3			zaštite.
				0			Sastojina za
3,7	0,3		101,1	80	5,2	4,1	redovno
							gazdovanje.

ОПИС СТАНИШТА И САСТОЈИНА

hektaru eta				zaprem. na celoj povrsini	tekuci prirast na ha	 na cel pov.	Primedba
4	5	6	svega				
25	26	27	28	29	30	31	32

hektaru				zaprem.	tekuci prirast		Primedba
eta				na celoj	na	na cel	
4	5	6	svega	povrsini	ha	pov.	
25	26	27	28	29	30	31	32
0,2			1,5	21	2,6	0,6	Osnovna namena:
			29,8	24	2,2	0,5	nacionalni park
			62,5	3	0,3	0,1	- III stepen
			45,1	0			zaštite.
			50,1				Sastojina za
			18,9				redovno
0,2			207,9	48	5,0	1,2	gazdovanje.
			0,5	488	12,1	21,5	Osnovna namena:
			10,7				nacionalni park
			46,7				- III stepen
			80,9				zaštite.
			110,9				Sastojina za
			9,6				redovno
			14,6				gazdovanje.
			273,9	488	12,1	21,5	Uzg.pot.
							proreda. Seca:
							proredna seca
							selektivna proreda.
	0,2		10,4	103	2,0	5,5	Osnovna namena:
			19,3	65	0,9	2,5	nacionalni park
1,4			13,7	6	0,1	0,2	- III stepen
			9,6	4		0,1	zaštite.

ОПИС СТАНИШТА И САСТОЈИНА

hektaru				zaprem.	tekuci prirast		Primedba
eta			svega	na celoj	na	na cel	
4	5	6		povrsini	ha	pov.	
25	26	27	28	29	30	31	32
			11,4	1			Sastojina za
1,4	0,2		64,5	178	3,0	8,3	redovno
							gazdovanje.

ОПИС СТАНИШТА И САСТОЈИНА

hektaru				zaprem.	tekuci prirast		Primedba
eta				na celoj	na	na cel	
4	5	6	svega	povrsini	ha	pov.	
25	26	27	28	29	30	31	32
			6,5	169	12,2	6,9	Osnovna namena:
			25,9				nacionalni park
			41,3				- III stepen
			165,6				zaštite.
			57,1				Sastojina za
			296,3	169	12,2	6,9	redovno
							gazdovanje.
1,9	0,3	1,8	23,6	75	2,7	3,9	Osnovna namena:
	1,6		54,3	48	1,6	2,2	nacionalni park
			15,9	39	0,8	1,1	- III stepen
			25,9	3		0,1	zaštite.
				3	0,1	0,1	Sastojina za
				3	0,1	0,1	redovno
1,9	1,9	1,8	119,6	170	5,3	7,5	gazdovanje.
			27,7	98	4,5	5,5	Osnovna namena:
			53,1	18	0,7	0,8	nacionalni park
			4,8				- III stepen
			9,4				zaštite.
			95,0	116	5,2	6,3	Sastojina za
							redovno
							gazdovanje.

ОПИС СТАНИШТА И САСТОЈИНА

hektaru				zaprem.	tekuci prirast		
eta				na celoj	na	na cel	Primedba
4	5	6	svega	povrsini	ha	pov.	
25	26	27	28	29	30	31	32
			21,0	147	5,7	7,9	Osnovna namena:
			46,2	15	0,1	0,2	nacionalni park
			42,9	2	0,1	0,1	- III stepen
			8,0				zaštite.
			118,1	164	5,8	8,1	Sastojina za
							redovno
							gazdovanje.

hektaru				zaprem.	tekuci prirast		Primedba
eta				na celoj	na	na cel	
4	5	6	svega	povrsini	ha	pov.	
25	26	27	28	29	30	31	32
			20,7	52	8,3	2,7	Osnovna namena:
			49,3	1	0,1		nacionalni park
			52,5				- III stepen
			30,5				zaštite.
			13,6				Sastojina za
			166,6	53	8,5	2,7	redovno
							gazdovanje.
			33,6	39	3,9	2,4	Osnovna namena:
			37,3	19	1,0	0,6	nacionalni park
			8,5				- III stepen
			15,6				zaštite.
			94,9	58	4,9	3,0	Sastojina za
							redovno
							gazdovanje.
	0,9		19,6	12	2,1	0,5	Osnovna namena:
	3,1		32,9	13	2,7	0,7	nacionalni park
			8,5	5	0,7	0,2	- III stepen
14,8			28,9	4	0,3	0,1	zaštite.
			51,5	1	0,1		Sastojina za
14,8	4,1		141,4	34	5,9	1,4	redovno
							gazdovanje.

ОПИС СТАНИШТА И САСТОЈИНА

hektaru eta				zaprem. na celoj povrsini	tekuci prirast na ha	 na cel pov.	Primedba
4	5	6	svega				
25	26	27	28	29	30	31	32
			38,2	71	9,8	4,0	Osnovna namena:
			64,9	1			nacionalni park
			43,2				- III stepen
			29,0				zaštite.
			175,3	72	9,8	4,0	Sastojina za
							redovno
							gazdovanje.

ОПИС СТАНИШТА И САСТОЈИНА

hektaru eta				zaprem. na celoj povrsini	tekuci prirast na ha	 na cel pov.	Primedba
4	5	6	svega				
25	26	27	28	29	30	31	32
0,7	0,7		12,9	33	1,5	0,8	Osnovna namena:
2,5	3,4		25,9	28	1,1	0,5	nacionalni park
5,1		6,2	28,9	10	0,3	0,1	- III stepen
			23,0	4	0,3	0,1	zaštite.
			41,3	2	0,2	0,1	Sastojina za
			26,6	3	0,2	0,1	redovno
8,2	4,1	6,2	158,6	81	3,4	1,7	gazdovanje.
			53,8	127	15,4	7,1	Osnovna namena:
			96,8				nacionalni park
			67,3				- III stepen
			58,0				zaštite.
			276,0	127	15,4	7,1	Sastojina za
							redovno
							gazdovanje.
							Osnovna namena:
							nacionalni park
							- III stepen
							zaštite.
							Osnovna namena:
							nacionalni park
							- III stepen
							zaštite.
							Osnovna namena:
							nacionalni park

ОПИС СТАНИШТА И САСТОЈИНА

hektaru				zaprem.	tekuci prirast		Primedba
eta			svega	na celoj	na	na cel	
4	5	6		povrsini	ha	pov.	
25	26	27	28	29	30	31	32
							- III stepen
							zaštite.
							Osnovna namena:
							nacionalni park
							- III stepen
							zaštite.
							Osnovna namena:
							nacionalni park
							- III stepen
							zaštite.
							Osnovna namena:
							nacionalni park
							- III stepen
							zaštite.
							Osnovna namena:
							nacionalni park
							- III stepen
							zaštite.
							Osnovna namena:
							nacionalni park
							- III stepen
							zaštite.

ОПИС СТАНИШТА И САСТОЈИНА

hektaru				zaprem.	tekuci prirast		
eta				na celoj	na	na cel	Primedba
4	5	6	svega	povrsini	ha	pov.	
25	26	27	28	29	30	31	32
							Osnovna namena:
							nacionalni park
							- III stepen
							zaštite.
							Osnovna namena:
							nacionalni park
							- III stepen
							zaštite.
							Osnovna namena:
							nacionalni park
							- III stepen
							zaštite.